

DANUSZA
SKAŁSKIEGO

1. / Von Lindern Tournefortii
Alfations

2. / Krimayer Cyf und voss
Indisfel Karikaten Cabinet

3. / Beschreibung der Dornen
mos so in Galland in den
Pflanzen gezogen



*) . (*

TRIGÆ

Celeberrimorum in Academia Re-
gia Argentorat. Medicorum,

VIRIS

Nobilissimis, Amplissimis, Excel-
lentissimis atq; Experientissimis,

DN. JOH. VALENTINO
SCHEIDIO, Serenissimi Prin-
cipis Palatino Birckenfeldensis,
ut & Illustrissimi Comitis Hanoi-
ci Consiliario & Archiatro, Med.
Doct. & Profess. Publico Ordin.
Seniori, Capituli Thomani præ-
posuo venerando, Civitatis Re-
giæ Argentoratensis Physico &
Collegii Medici DECANO Per-
petuo, Botanices Pbiliatro Sum-
mo.

) : (2

DN.

DN. JOH. BOECLERO,
*Med. & Philos. Doct. Botanic.
Chimicæ atq; reliquæ Mariæ
Medicæ Profess. Ordin. celeberrimo,
Pharmacopœorum Visitatori atq; Examinatori perpetuo,
ut & Ordin. Capitul. Roman. Canonico meritissimo.*

DN. MARCO MAPPO,
*Med. Doctor. atq; Patriæ Practico experientissimo, felcissimo,
simulq; in Botanica Scientia versatissimo.*

Ut Et

Celeberrimis atq; Spectatissimis,
*in Arte Chimico Pharmaceutica aque
ac Botanica peritissimis,*

DN

VIRIS

DN. JOH. JACOB. SPIELMANN,
Pharmacopœo Argentor. exercitatissimo.

DN. JOH. HENRIC. KOENIG,
Buxovillano, Illustriss. ac Celsissimi Comitis Hanoici Pharmacopœo Primario, Affini meo honoratissimo.

DN. NICOL. STRUVIO,
diversorum Magnatum ac Principum ut & Universitatis Argentorat. Hortulano dexterrimo.

PRÆCEPTORIBVS, PATRONIS, FAUTORIBUS atq; AMICIS,

Libelli hujus Editionem, in Signum debitæ
Observantiæ, Veneratione
omni,

dicat ac offert

AUTOR.

):(3

J. N. J.



J. N. J.

PRAEFATIO

Benevole Lector,

Sisto Tibi libellum,
quem ex privatis lucubrationibus, in gratiam Botanophilorum, ut quibusvis sub Excursionibus Botanicis, Enchiri-
dii

dii loco, ejus Usus esse possit, conscripsi, eundemque in finem *Tournefortium Alsaticum* appellavi, cum Nomina, quæ in hoc opusculo continentur serieque alphabetica recensentur, maximam in partem ad ejus Mentem sint imposita, & quod Plantarum harum denominatarum nostris in Oris saltem sit familiaris Proventus; Neminem enim latet,

quanta prolixitate Studium Botanicum primis temporibus fuerit tractatum, & quâ cum confusione in faciendis Nominibus antequam Tournefortiano Lumine, Doctrina atq; Ordine Plantarum Progenies reficeretur, Pristina Aetas fuerit occupata. Impossibile enim erat, ad Eorum ductum, infinitorum sibi invicem non correspondentium à tot diversis Au-

tori-

toribus Synonimorum descriptorum Epitheta memoria complecti, multo minus sibi polliceri, ad quamnam generis Familiam, hæc vel illa plantula pertineat; nunc autem, *Norma Tournefortiana*, quam prolixè atque perspicue suis in Institutionibus Rei Herbariæ, nunquam satis laudandis delineavit, Via cuius patula est, modo paucis hac in re instru-

ctus sit confestim, quamvis (puta florentem) sibi obviam antehac minime cognitam ad suum genus atque speciem rite reducendi. Hanc ob causam, ne confusio Nominum in posterum amplius produceretur, Plantas singulis mensibus florentes, numero Alphabetico, simul & Idiomate gallico, latino ac germanico, annexo characterē atque loco natali,

anq;

anque sint perennes vel annuæ, præter titulum Casp. Bauhin. unicè Tournefortii nomine designavi, quo eo melior, facilior, ac delectabilior earum Impressio fieri possit, Doctrinam hancce cuivis Medico summe utilem addiscendi. Accipe itaque hoc meum Institutum atq; Laborem, eo quo Tibi offertur animo & si dignus videbitur ad Tuos usus impende, sic

vo-

volente DEO, successu
temporis, aliud Opusculum
de plantarum officinali-
um Viribus & Usu juris
sum facturum Vale dab.

Argyropol. é Museo


Calend. Decembr.

M DCC XXVII.



Tabula

Tabula generalis continens Florum differe-
ntias fundamentales.



Literarum designatarum Clavis.

- a Qui præter stamina s. capillamenta petala habet, vel majora vel minora, equalia aut inæqualia in involucrium seminum plane non desinentia, ut in bellide, faba, antirrhino &c.
- b Ubi nulla adsunt petala, sed totus vel ex staminibus aut capillamentis constat, ut in sparganio equiseti &c.
- c Qui flosculis & semiflosculis caret, sed vel unico aut pluribus petalis donatur, ut flos hyoscyami, Salvia, cerasi &c.
- d Qui componitur ex flosculis & semiflosculis, ut cyanus, dens leonis &c.
- e Qui unicum tantum habet petalum, ut campanula, belladonna, stramonium.
- f Qui pluribus gaudet petalis, ut ranunculus, geranium &c.
- g Qui ex plurimis flosculis, s. petalis fistulosis tenuibus dense positis, eodem calice prehensis compositus est, ut in Santolina, Cnicus &c.
- h Qui ex semiflosculis, dense in orbem positis & eodem calice comprehensis concinnatus est, ut in chondrilla Scorzoneræ &c.
- i Qui ex duabus partibus confectus disco flosculoso & circumferentia seu Corona semiflosculosa, ut in Jacobæa bellide &c.
- k Qui campanæ vulgaris formam obtinet ut campanula convolvulus.

- l Cujus inferior pars tubulata, superior vero in eorum inversum infundibuli instar diducta est ut in symphyto, Jalapa valeriana.
- m Ubi petala, rota in modum posita sunt, ut in anagallide, borragine veronica blattaria &c.
- n Qui faciem æmulam cujusdam personæ habet vel rostrum animalis, rictu & labiis representat. ut Linaria antirrh. Orobanth.
- o Cujus pars inferior fistulosa, superior vero labiata est, labio vel unico vel gemino & pistillum in fructum abire solet, ut in hormino salvia.
- p Qui ex 4. petalis cruciatim dispositis constat, & cujus calix pari petalorum numero donatur, pistillumque in fructum abit, ut brassica, leucospermum &c.
- q Cujus petala quaternum numerum vel non attingunt vel superant, & in orbem posita sunt, ut in chamænerio ranunculo, pyrola rana morfu.
- r Cujus petala ex ipso calice tanquam e tubulo emergunt, uti est Linum lychnis caryophyllus &c.
- s Qui ex 6. petalis raro tribus constat, aut in 6. partes, ad lilii formam accedens secatur & cujus pistillum in capsulam tripartitam abire solet.
- t Qui constat ex petalis dissimilibus, vexillo, alis atque carina cujusque pistillum transit in fructum siliquosum, uti patet in piso, lathyro vicia &c.



u Si os lateraque fundo magis pateant & acetabuli formam exhibent ut Malva.

vv Si fundus tubulatus est & latera angusta sint, ut videre est in polygonato, cerinthe.

x Si os augustius est ventre.


y Qui é cono in tubum coarctatur.

z Qui tubum non in conum inversum, sed in discum instar hypocrateræ explicatum habet ut primula veris, psyllium.

(Notandum in super, si Icones Tabernemontani sint evolvendi, B. L. illam evolvat Editionem, quæ ab Auctore Idiomate Germanico Basileæ conscripta ac divulgata est.)



PLANTA-



Corylus sativa, fructu rotundo maximo T. s. Avellana Lugdunensis major Camer. Hort. Römische oder Italianische Haselnuß. Strauch mit der größten Frucht / in verschiedenen Gärten der Stadt und des Landes. Avellanier.

Cornus hortensis mas T. sive domestica fructu rubro oblongo acerbo, flore simplici rosaceo luteo, foliis virgæ sanguineæ haud dissimilibus, zahmer Welsch, Kirschbaum Icon. Tab. p. 1459. Cornouiller mâle ou Cornier domestique, aller Orten in Gärten.

Cornus hortensis mas fructu ceræcolore T. gelber Welsch, Kirschbaum / cum præcedent.

Cornus hortensis mas, fructu albo T. weißer Welsch, Kirschbaum / in unterschiedlichen Gärten der Stadt.

Cornus sylvestris mas, T. s. spontanea, Eörnerbaum / wilder Welsch, Kirschbaum / Cornier Sauvage, in wilden Bergen und Hecken. Icon. Clus. hist. 13.

Helleborus niger fetidus, T. flore rosaceo herbaceo radice tenui nigra, foliis angustioribus profunde incisiss serratis, s. Helleboraster maximus flore & semine prægnans obs. & Icon. Lob. Lausstraut. Ellebore noir bastard ou puant. perenn.

Leucojum bulbosum, cum unico flore simplici liliaceo rarius bino pendulo, foliis oblongis splendentibus, s. Narcisso *Leucojum vulgare*, T. Hornungs, Blume in schattichten bergichten

A 2

Bergichten Orten / sonsten hin und wieder in Gärten.
Icon. 1. Tab. p. 1005. Perce-nege. perenn.

Leucojum bulbosum trifolium minus
præcox, tribus petalis albis minoribus cin-
gentibus, terna minora herbacei coloris,
foliis angustioribus pallide viridibus, s.
Narcisso leucojum minus trifolium T. Schnee-
Tröpflein / petite perce-nege. Icon. Clus. hist. p.
169. hin und wieder in Gärten.

MENSIS

MARTIVS & APRILIS.

B*ellis Sylvestris minor*, T. flore prorsus albo
composito radiato, foliis laciniatis, ra-
dice tenui, Pasquete ou petite marguerite. Kleine
wilde Maßlieben oder Zitter-Köpflein / hin und wieder
auf Wiesen. Icon. Tab. p. 708. perenn.
Eadem flore purpur.

Brassica campestris perfoliata flore albo T.
simplici cruciformi, foliis pallide viridibus,
corniculis longis quadrangulis. Durchwachs
mit Steckrüben-Blättern durchwachsender Feld-Kohl /
in denen Frucht-Feldern und andern sandigten Orten.
Icon. 2. Tab. p. 1140. ann. Chou sauvage.

Bursa pastoris capsula brevi cordata,
foliis sinuatis flosculis albis simplicibus cru-
ciformib. s. *Bursa pastoris major folio sinuato*.
T. Groß Täschel-Kraut / Tabouret ou Bourle à
berger, fast aller Orten. Icon. Tab. p. 512. ann.

Eadem

Eadem folio non sinuato T. atrovirente
ad radicem longis pediculis donatis capsulis
cordatis, groß Täschelkraut mit ungeferbten Blät-
tern / juxta vias aliisque in cultis & incultis
locis, ann.

Bursa pastoris media T. s. minor Tab.
klein Täschelkraut in sandigen und dürrem Erdreich.
Icon. Tab. p. 512. ann.

*Buxus arborescens foliis pictis per limbum au-
reis* T. floribus imperfectis apetalis luteis
gemahlter Buchs. Buis peinte in Gärten. perenn.

Buxus arborescens T. floribus luteis im-
perfectis apetalis foliis oblongo rotundis
atrovirentibus & splendentibus, Buchsbaum /
Buis aller Orten in Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1464.
perenn.

Buxus foliis rotundioribus, T. s. vulgarissi-
ma gemeiner Schnitt, oder Garten-Buchs / Buis
à parterre. Icon. 2. Tab. p. 1464. perenn.

*Chelidonium minus foliis inferiori-
bus subrotundis*, superioribus acuminatis
pinguibus, flore luteo simpl. rosaceo radice
tuberosa s. *Ranunculus vernalis rotundifolius mi-
nor*, T. Feigwarzen oder klein Schöllkraut / auf
feuchten Orten. Couillons des prestre ou petite
esclere. Icon. Tab. p. 1134. perenn.

Cupressus meta in fastigium convoluta, qua
femina Plinii, T. perpetua fronde virens flo-
ribus amentac. foliis sabinæ æmulis atrovi-
rentibus, Cypressen in denen Gärten / le Cyprés
femelle. Icon. Tab. p. 1353.

Cupressus

Cupressus ramos extra se spargens quæ Mas
Plin. T. Icon. Epit. Matth. p. 52. le Cypres
mâle. cum præcedent.

Equisetum arvense longioribus setis, T.
floribus amentaceis s. Hippuris arvensis ma-
jor, gemein Ragenwadel oder Rannentraut / in de-
nen Gersten- und Haber-Feldern. Icon. 3. Tab.
p. 568. queue de Cheval. perenn.

*Fumaria radice amara tuberosa & ca-
va major*, flore simpl. purpurascence poly-
petalo papilionaceo, foliis pallide viridibus
aquileg. similib. s. *Fumaria bulbosa radice cava
major*, flore rubro dilutior T. rothe grosse
Holwurzel in denen Hecken und Bergen / allhier in
Gärten. Icon. 1. Tab. p. 92. perenn. Racine creuse.
Eadem flore albo T. weisse Holwurzel.

Fumaria tuberosa major, radice non
cava, folio striato & calcari cristato, flore
purpureo simpl. polypetalo papilionaceo s.
Fumaria bulbosa radice non cava major, T. Hol-
wurzel mit gangen Wurzeln in bergichten Büschen.
Icon. 1. B. 3. 204.

*Gramen sylvaticum pilosum vel hir-
sutum latifolium majus* C. B. s. *Juncus
nemorosus latifolius major* T. haaricht Waldgras
in Wäldern und Büschen. Icon. 4. Tab. p. 537.

Helleborus niger hortensis, flore viridi, T.
simplici rosaceo, foliis atroviridibus digi-
tatis circumquaque serratis, schwarz Nies-
wurzel / hin und wieder in Gärten / perenn.
Icon.

Icon. 1. Tab. p. 1099. Elleboire noire à fleur
verd.

Helleborus niger tenuifolius, flore
buphthalmi luteo simpliei rosaceo, aliis hel-
leborus Hippocratis s. *Ranunculus fœniculaceis
foliis hellebori nigri radice* T. kleine Nieswurzel mit
Fenchelblättern / gelbe Schnee-Köpflein. Icon. Tab.
p. 1097. perenn. Hellebore noir d'Hippocrate.

Hyacinthus vernus dumetorum, stel-
laris germanicus bifolius, flore simpl. coe-
ruleo liliaceo radice bulbosa, s. *Ornithoga-
lum bifolium germanicum coeruleum*, T. blaue
Hecken-Sternblümlein / Bauren-Hyacinthen /
Icon. Tab. p. 1015. perenn.

Laureola folio deciduo, flore simpl.
monopetalo infundibuliformi purpureo
quadripartito, s. *Thymelæa lauri folio deciduo
flore fœmina*, T. Laureole, Seidelbast / Kellerhals /
Brennwurz perenn. Icon. Tab. p. 1482. in
Wäldern und Büschen.

Eadem flore albo.

Ornithogalum bulbosum flore simplici
luteo liliaceo foliis angustis linea lactea nota-
tis s. *Ornithogalum luteum* T. grose gelbe Feld-Zwie-
bel Icon. 1. Tab. p. 1020. peren.

*Ornithogalum bulbosum arvense lute-
um ramosum præcedentis est varietas*. Weede
auf Aeckern und in Weinbergen.

Ornithogalum bulbosum luteum minus T. an-
gustifolium, kleine gelbe Feld-Zwiebel. Icon.

*) : (*
Clus. hist. sub nomine Ornithogol. panon.
luteo flore p. 189. perenn.

Populus alba majoribus foliis T. s. foliis vir-
gineis inferne albicantibus ac lanuginosis
floribus amentaceis weisser Pappelbaum oder Pap-
pelweiden in denen Hecken und Zäunen an den Flü-
ßen. Peuplier blanc Ic. Tab. 1. p. 1392.

Populus alba minoribus foliis T. cum præ-
cedente.

Populus nigra T. s. officinar. foliis hæde-
raceis per ambitum ferratis, hyeme deciduis
florib. amentaceis, fructu racemoso, schwarz
Pappelbaum/an denen Wassergestaden. Peuplier noir.

Populus tremula T. s. sterilis, folio rotun-
diore angulosoque punctim albis notis con-
sperso, tenuique pediculo appenso continuo
fere se moyente, Aspen oder Zitter-Baum in
feuchten Wäldern. Niespe ou Tremble Ic. 3. Tab.
p. 1392.

Primula veris pratensis, flore simpl. mo-
nopetalo hypocrateriformi & multifido
luteo, folio viridi rugoso, radice tenui can-
dicante fibrosa s. *Primula veris odorata flore*
simplici T. Himmelschlüssel mit wohlriechenden Blü-
men auf den Wiesen Ic. Tab. p. 699. peren. Pri-
me vere.

Primula veris sylvatica major, floribus
ex singularibus pediculis majoribus simpli-
cibus pallide luteis monopetalis hypocra-
teriformibus, foliis latioribus rugosis & in
cacumini

*) 9 (*
cacumine rotundioribus, radice crassiore
fibrosa, s. *Primula veris pallido flore elatior*, T.
Wald-Himmelschlüssel ohne Geruch. Icon. 4. Tab.
p. 700. perenn. Primevere sauvage.

Ranunculus nemorosus baccifer Mu-
schatellina dictus s. *Moschatellina foliis fuma-
ria bulbosa*. T. odoratis flore herbido simpl.
monopetalo rotato & multifido, radícula
oblonga alba tuberosa, Bisam Hahnenfuß/
oder kleinste Holswurz. Icon. 11. Tab. p. 94.
perenn. Petite Musquée. in Wäldern.

Saxifraga rotundifolia aurea hirsuta,
flore monopetalo simplici rotato & multi-
fido, luteo calicis experte radice filamen-
tosa, s. *Chrysosplenium foliis amplioribus auricu-
latis*, T. Gulden Milchkraut. Icon. Tab. p. 1224.
in feuchten Orten/ allhier in Gärten. Herbe St.
Christoffe. perenn.

Solanum quadrifolium nigra bacea
flore herbaceo simplici cruciformi radice
tenui multifida, s. *Herba Paris*, T. Einbeer in
buschichten Hecken und Wäldern. Raisin de Renard.
Icon. Tab. p. 1095. perenn.

Symphytum maculosum latifolium
pulmonaria dictum, flore simplici mono-
petalo infundibuliformi ex rubro coeruleo,
folio integro oblongo maculoso. s. *Pulmo-
naria Italarum ad buglossum accedens*. T. Icon.
2. Tab. p. 948. Hirschmangold / gestreckt Lungen-
kraut. Pulmonaire maculée ou marbrée, in dunkeln
berghichten Wäldern. perenn. Sym-

Symphytum non maculosum foliis non asperis, flore simplici monopetalo infundibuli formi rubente coeruleo, s. *Pulmonaria folio non maculoso*, T. Icon. 2. Clus. hist. CLXIX. Hirschmangold ohne Flecken bey dem Vorhergehenden. Pulmonaire sans marque. perenn.

Trifolium hepaticum flore coeruleo simplici rosaceo radice nigra fibrosa, foliis trilobatis, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici coeruleo, T. Blau gulden oder Edel-Leberfraut in bergichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 911. Hepatique bleu. perenn.

Trifolium hepaticum flore simplici coeruleo, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici purpureo, T. roth gulden Leberfraut. Icon. 2. Tab. p. 911. Hepatique rouge. perenn.

Trifolium hepaticum, flore simplici albo rosaceo, s. *Ranunculus tridentatus vernus* flore simplici albo, T. weiß gulden Leberfraut. perenn.

Tussilago major Petasites dicta flore flosculoso subrubente, folio rotundiore altera parte incano, radice longa crassa amara s. *Petasites major & vulgaris*, T. Pestilenzwurz / Rosspapeln / an sumpfichten und feuchten Orten. Icon. Tab. 1316. perenn. Petasite ou herbe aux teigneux.

Tussilago vulgaris T. flore composito radiato luteo ante folia erumpente, foliis superne viridibus inferne subalbidis angulosis Hüsblattich / Rosshub / auf feuchten Frucht. Aeckern und

und andern wasserichten Orten. Icon. Tab. 1316. perenn. Tussilage ou Pas d'asne.

Viola rotundifol. martia flore odoro purpureo polypetalo, s. *Viola martia purpurea* flore simplici odoro, T. wohlriechende Werg, Viole in grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 680. Violette de mars.

Eadem flore albo.

Viola rotundif. martia inodora sylvestr. flore coeruleo in cacumine semina ferens, s. *Viola martia inodora sylvestr.* Hunds. Viole. Icon. 5. Tab. p. 681.

Eadem flore albo.

Viola Sylvestris inodora, T. foliis macronatis oblongis & strictioribus flore coeruleo polypetalo anomalo papilionacei floris æmulo. Wald. Viole mit ablangen Blättern und ohne Geruch / in Wäldern und Büschen. perenn. Icon. 5. Tab. p. 682. Violette de bois.

Ulmus campestris & Theophrasti. T. folio lato scabro leviter serrato atque oblongo, floribus monopetalis campaniformibus, Rossbaum in feuchten tiefen Wäldern / Orme. Ic. Tab. p. 1394.

Acer montanum candidum, T. foliis inferne candicantibus latifoliis pediculis rubentibus annexis floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu alato gemello. Ahorn in hohen Wäldern. Erable. Icon. Clus. hist. p. 10.

MENSIS
APRILIS & MAJVS.

Acer campestre & minus, T. foliis minoribus laevibus laciniatis seu angulosis floribus ex viridi flavescentibus rosaceis fructu gemino alato. Massholder. Plane. in Büschen. Icon. Tab. 2. p. 1386.

Acetosa vulgaris pratensis folio oblongo, floribus stamineis in spicam congestis, s. Acetosa pratensis. T. Wiesenampfer. Icon. 1. Tab. p. 826. perenn. Oseille ou sureille.

Acetosa pratensis, folio crispo oblongo, T. Wiesenampfer mit langen krausen Blättern. Icon. 4. Tab. p. 827. perenn. Oseille à feuilles frises.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis, T. floribus amentaceis, fructus quamoso, Erlenbaum / Aunée, an denen Bässern. Icon. Tab. p. 1395.

Alsine chamædryfolia serrata, flosculis monopetalis coeruleis multifidis rotatis longis pediculis insidentibus, s. Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus chamædryfolia. T. Ehrenpreß mit Gamenderlein Blättern / hin und wieder auf den Frucht-Äckern. Icon. 6. Tab. p. 1089. ann.

Eadem flore albo.

Alsine hæderulæ folio hirsuto, flosculis monopetalis coeruleis rotatis, s. Veronica cymbalaria folio verna, T. Acker-Hünerrdarm mit Eyheublättern. Icon. 5. Tab. p. 1088. ann.

Alsine

Alsine hirsuta magno flore simplici rosaceo polypetalo vasculo corniculato, Caryophyllus holosteus dictus, s. Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore, T. weiß Negeleingraß mit harichten Blättern / hin und wieder auf graslichten Hübeln und Necken. Icon. Tab. p. 543. perenn.

Alsine triphyllos, folio profunde secto flore violaceo monopetalo rotato, s. Veronica verna trifido vel quinquifido folio, T. Hünerrraute / Händleintraut / auf gebauten Frucht-Äckern. Icon. 4. Tab. p. 1088. ann.

Alsine verna glabro flosculis albis umbellatis. T. s. Caryophyllus arvensis umbellatus folio glabro simplici flore rosaceo albo, weiß Acker-Negeleingraß / in denen Frucht-Äckern. Icon. 2. Tab. p. 543. ann.

Alsine veronica foliis hirsutis flosculis monopetalis coeruleis rotatis cauliculis adherentibus, s. Veronica flosculis cauliculis adherentibus, T. kleine falsche Hünerrdarm / kleiner Acker-Ehrenpreß. Icon. 7. Tab. p. 1089. ann.

Alsine vulgaris flore albo, rosaceo foliis ex adverso binis, s. Alsine media. T. gemein Hünerrdarm oder Vogelkraut. Icon. 3. Tab. p. 1087. ann. Morgeline.

Amygdalus sativa, T. fructu majori dulci foliis persico similibus, flore simplici rosaceo suave rubente, süßer Mandelbaum / Aman-dier doux. Icon. Tab. p. 1410. perenn.

Idem

Idem fructu amaro, T. Amandier amer.
Asarum vulgare, T. flore apetalò folio subrotundo pingui atrovirente calice tripartito, Haselnurk / in schattichten Hölzern. Icon. Tab. p. 1129. perenn. Hard sauvage.

Caltha palustris flore aureo rosaceo polypetalò folio subrotundo radice alba subamara, s. *Populago flore majore*, T. Dotterblum / auf feuchten Wiesen und Rändern der Wasser. Icon. 1. Tab. p. 1128. perenn. Peuplier.

Caryophyllata flore parvo luteo rosaceo polypetalò, foliis pinnatis radice tenui subrufo bene spirant. s. *Caryophyllata*, T. Benediceten oder Merkwurzel. Icon. 1. Tab. p. 326. perenn. Benoite.

Caryophyllata aquatica flore nutante, T. purpuro pallescente rosaceo polypetalò radice minus fibrosa purpurascende amari uscula, Wasser. Benedicetenkraut mit hangenden Blumen / auf hohen grasichten Bergen. Icon. 2. Tab. p. 326. perenn. Benoite aquatique.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore albo simplici rosaceo, folio gramineo rigido, longiore pediculo gaudente, s. *Alfne pratensis* gramineo folio ampliore, T. weiß Nägelein oder Blumengras / in Hölzern und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 542. perenn.

Caryophyllus glaber arvensis, flore minore albo simpl. rosaceo, s. *Alfne pratensis* gramineo folio angustiore, T. klein Blumengras in denen Hecken. Icon. 2. Tab. perenn. Cera-

Cerasus major ac sylvestris fructu subdulci nigro coeruleo inficiente, T. flore albo simplici rosaceo, süßer wilder schwarzer Kirschbaum / in Hölzern und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 1400. Merisier ou Cerisier sauvage.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli, T. nigro minore, schwarze Vogelkirschen / in Wäldern. Icon. 11. Tab. p. 1401. Merisier noir, ou Bois ou Sainte Lucie.

Cerasus pumila, s. *Chamaecerasus Clusii* fructu rubro, kleine saure wilde Kirschen / Erdweisel / in hohen Wäldern und Gebirgen. Icon. 12. Tab. p. 1401. Cerisier nain ou precoce.

Chamaedrys spuria major pratensis angustifolia, flore spicato simplici monopetalò unilabiato coeruleo facie Teucrit, s. *Chamaedrys frutescens Teucrium vulgo*, T. groß braun Manderlin. Icon. 2. Tab. p. 771. ann.

Clematis daphnoides minor, flore coeruleo simplici monopetalò infundibuliformi & multifido, s. *Pervinca vulgaris angustifolia minor*, T. Sinngrün / Kränlein oder Todtenkraut / hin und wieder in Hecken und Gärten. Pervenche. Icon. 1. Tab. p. 1270. perenn.

Cyperoides nigro luteum vernum majus floribus apetalis stamineis, T. in spicam congestis, s. *Graminis nigro lutei verni* varietas major IB. 2. 494. auf durren rauhen Orten. perenn.

Cyperoides nigro luteum vernum minus, T. s. *Graminis nigro lutei verni* varietas minor, I. B. 2. 494. Dens

Dens Leonis folio latiore, T. flore com-
posito luteo semiflosculoso alias *Taraxacum*
officinar. Röhrlintraut / Löwenzahn / auf allen
grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 481. Pissen lit
ou dent de Lion. perenn.

Fragaria sterilis, T. s. *fragaria non fra-*
gifera flore simpl. albo rosaceo, fol. hirsut.
falsch Erdbeertraut in sonnenreichen Bergen. perenn.
Icon. Lob. 698.

Geranium columbinum malvaceum
minus, folio rotundo profunde sinuato &
crenato flore simplici purpureo rosaceo. s.
Geranium folio malve rotundo. T. Storchenschabel /
Zaubensfuß. Icon. 2. Tab. p. 123. Bec. de Grue. ann.

Gramen exile hirsutum cyperoides
floribus stamineis in spicam congestis, s.
Juncus villosus capitulis psyllii subflavescente, T.
Haricht Cypergras / auf durren grasichten Dertern.
Icon. 2. Tab. p. 532. perenn.

Gramen montanum caryophyllatum
spica varia, s. *Cyperoides spicis variis nemorense*.
T. Melckengras in Büschen und Wäldern. Icon.
C. B. prodr. 2. p. 9. perenn.

Grossularia vulgarissima, foliis hirsutis
& late virentibus floribus rosaceis subluteis,
s. *Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris*,
T. wilde Stachelbeern. Icon. Tab. p. 1491. Gro-
sille sauvage. perenn.

Hedera terrestris major repens, flore
simplici purpureo monopetalo labiato folio
subro-

subrotundo, s. *Calamintha humilior folio rotun-*
dior, T. Donnerreben / Sundarmann. Icon. 2.
Tab. p. 1280. Lierre terrestre. perenn.
Eadem minor. Icon. 2. Tab. p. 1280. perenn.
Eadem flore albo. Sed rarius.

Hesperis sepiaria allium redolens, T. flore
albo simplici cruciformi, folio lato & per
ambitum serrato, radice longiuscula, s. Al-
liaria. Knoblauchstrauch / hin und wieder in dunklen
Zäunen. Icon. Tab. 1144. Alliaire. ann.

Lamium alba linea notatum. T. flore pur-
pureo simplici monopetalo labiato, fo-
lio oblongo, radice fibrosa, todte Nesseln mit
bezeichneten Blättern / an den Zäunen. Icon. 1.
Tab. p. 923. Ortie morte. ann.

Idem flore albo.

Lamium foliis caulem ambientibus minus, T.
flore purpureo simplici monopetalo labiato,
todte Ackerneffeln / auf den Saamfeldern. Icon.
12. Tab. p. 1090. ann.

Idem flore albo.

Lamium folio oblongo non maculato, flore ru-
bro, T. simplici monopetalo labiato, non
foetens. Taube Nesseln mit ungesteckten Blättern /
an den Zäunen. Icon. 1. Tab. p. 923. perenn.

Lamium folio oblongo luteum, s.
Galeopsis vel Urtica iners flore luteo, T. gelbe
taube Nesseln / in Hölzern und an den Zäunen.
Ortie jaune. Icon. Tab. 923. perenn.

Lamium non foetens, flore albo mo-
nope-

nopetalo labiato, folio oblongo non maculato, s. *Lamium vulgare album*, T. weiße todte Messeln / an denen Wegen und Zäunen. Icon. 1. Tab. p. 923. ann.

Leucojum luteum vulgare, T. flore simplici cruciformi, folio viridi, s. Keiri officin. gelbe gemeine Negelblumen / hin und wieder in Gärten. Icon. 1. Tab. p. 688. Giroflier ou Violier jaune, perenn.

Leucojum sylvestre angustifolium, flore luteo minore inodoro simplici cruciformi, radice alba fibrosa, s. *Hesperis leucosi* folio non serrato, siliqua quadrangula, T. gelbe Waldbiol / hin und wieder in Gärten und auf den Mauren. Giroflier sauvage. ann. Ic. 4. Tab. p. 693.

Mercurialis montana testiculata T. s. repens mas, floribus apetalis. Waldbingeltraut / Männlein in Wäldern. Ic. Matth. Epit. p. 998. Mercuriale sauvage.

Mercurial. montan. spicata T. repens foemina. Waldbingeltraut Weiblein. Ic. Matth. Epit. p. 999.

Muscus squamo s. vulgaris repens clavatus T. s. Lycopod Tab. s. officin. Beerlapp / Wollstauken p. 1199.

Morus fructu nigro T. flore subluteo amentaceo conglomerato. Maulbeerbaum mit rother Frucht. Meurier, hin und wieder in Gärten. Icon. p. 1390.

Eadem fructu albo. Maulbeerbaum mit weißer Frucht.

Napus

Napus sativa T. flore perfecto simplici luteo cruciformi, radice rapacea alba Saatruben / Steckruben. Naveau Ic. Matth. Epit. p. 222. ann.

Napus sylvestris T. flore perfecto simplici luteo cruciformi Rubesaat. Icon. Fuchs. hist. plant. Naveau sauvage. ann.

Nasturtium, petraeum foliis bursae pastoris T. incis, flore perfecto simplici cruciformi, capsulis latis. Ic. Tab. p. 842. ann. Steinfresen.

Orob. sylvaticus vernus, flore purpureo perfecto simplici papilionaceo, siliquis erectis, foliis latioribus pinnatis s. *Orob. sylvaticus purpureus vernus* T. Ic. i. Clus hist. sub nomin. orob. pannon p. ccxxx. Orobe. perenn.

Perchepier anglorum, floribus apetalis subviridibus s. Alchimilla montana minima Col p. i. 146. Tab. Scandix minor est. Ic. 2. p. 288.

Persica molli carne, & vulgaris viridis & alba T. s. floribus rosaceis incarnatis, foliis oblongis serratis amaris, gemeiner Pfirsichbaum. Pécher de montagne. Ic. 1. Tab. p. 1408.

Prunus sylvestris T. s. Acacia germanica flore simplici rosaceo albo fructu nigro Schlehdorn Prunier sauvage. Icon. 1. Tab. p. 1405.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore T. purpureo simplici rosaceo, radice ob-

B 2

lon-

longa & fibrosa, gemeine blaue Kuchenschelle/ oder Osterblum / hin und wieder auf grasigten dürren Orten Ic. i. Tab. p. 80. Coquelurde perenn.

Eadem flore rubro obtuso T. Kuchenschelle mit röthlichen Blumen Ic. 2. Tab. p. 80. Coquelourde à fleur rouge.

Eadem flore albo T. potius cinereo weisse Kuchenschelle. Coquelourde à fleur blanchatre.

Quinquefolium majus repens T. s. vulgare floribus rosaceis, auri æmulis radice subrubra oblonga, fünff Finger Kraut. quinte feuille. Ic. 4. Tab. p. 351. perenn.

Quinquefolium minus repens lanuginosum lateum T. klein kriechend fünff Finger Kraut / hin und wieder an den Strassen und Hügelc. Ic. 13. Tab. p. 354. petite quinte feuille. perenn.

Ranunculus nemorosus; flore albo majore simplici rosaceo s. Ranunculus phragmites albus vernus T. wilder weisser Wald oder Hecken Hahnen-Fuß Ic. 8. Tab. p. 109. Renoncule des bois à fleur blanchatre. perenn.

Ranunculus nemorosus flore purpureo vernus s. Ranunculus phragmites purpureus vernus T. rother wilder Wald, oder Heck, Hahnen-Fuß/ Ic. 9. Tab. p. 109. perenn. Renoncule des bois à fleur purpurin.

Ranunculus nemorosus vel sylvaticus, foliis inferioribus rotundis, superioribus floribus proximis, valde angustis, laciniis dissectis luteis, radice subdulci s. Ranunculus nemorosus.

morosus folio rotundo T. Gold, gelber Wald, Hahnen-Fuß. Renoncule des bois à feuilles rondes. Ic. 2. Tab. 117. perenn.

Ranunculus nemorosus vernus, flore luteo minore, modo simplici modo gemello s. Ranunculus nemorosus flore luteo T. gelber wilder Hahnen-Fuß. Ic. 7. Tab. p. 108. perenn. Renoncule des bois jaune.

Ranunculus pratensis erectus non repens, flore luteo simplici, folio Napello simili, macula nigra notato, radice acris s. Ranunculus pratensis erectus acris T. brennender wiesen Hahnen-Fuß. Ic. 2. Tab. p. 107. Renoncule des prez piquant perenn.

Salix latifolia rotunda T. vel caprea rotundi folia foliis inferne hirsutis Palm, oder weiß Weiden. Ic. 3. Tab. p. 1452.

Rapa sylvestris s. Rapum sylvestre non bulbosum, flore simplici cruciformi luteo, Rebsamen. Icon. Matth. epit. p. 220. ann. copiose seritur nostris in agris ad exprimendum ejus oleum.

Sambucus racemosa rubra T. s. montana acinis rubris, floribus ex albedo flavescentibus monopetalis, rotatis multifidis Hirschholder in feuchsten duncklen Wäldern. Ic. 3. Tab. p. 1440. Sureau de cerf. perenn.

Saxifraga alba rotundifolia T. flore albo rosaceo polypetalo foliis subrotundis pinguibus radice granulosa. weißer Steinbrech auf tro.

rockenen Wiesen und aufgeworffenen Hügeln. Saxi-
frage blanc. perenn. Icon. 1. Tab. p. 1222.

Sedum tridactylites tectorum, flore
albo simplici rosaceo, folio rutaceo s. *Saxi-
fraga verna annua humilior* T. rothstein Vogeb-
traut / Fröschtaken auf Dächern und abgeworffenen
alten Mauren lc. 2. Tab. p. 1088. sub nomine
alines petreae rubr.

Sinapi eruce folio T. laciniato sylvestre,
flore simplici cruciformi siliquoso luteo
wilder Senf. Moutarde sauvage. lc. 1. Tab. p. 838.
ann.

Taxus T. floribus amentaceis lu-
teis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu
rubro glutinoso, Taxbaum / Jvenbaum. Icon.
Matth. Epit. 840. perenn. lf. in hohen Wäldern.

Thlaspi arvense perfoliatum majus T.
flosculis albis cruciformibus, grosser Bauren-
Senf mit Durchwachs. Blättern auf steinichten Ae-
dern und in Weinbergen. Thlaspi. lc. 9. Tab. p.
851. cujus nomen Thlaspi oleraceum. ann.

Thlaspi arvense perfoliatum minus T. flo-
sculis albis cruciformibus. kleinster Bauren-
Senf / mit Durchwachs. Blättern/beym vorherge-
henden. lc. 19. Tab. p. 854. ann.

Tithymalus cyparissias T. vel *Cupressinus*, s.
Esula officinar. foliis cupressi, floribus lu-
teis monopetalis campaniformibus. Cypres-
sen Wolffs, Wilsch / auf ungebauten Derttern. Icon.
Tab. 12. p. 990. Titimale usuell. perenn.

Tithy-

Tithymalus cyparissias, foliis punctis
croceis notatus s. *Esula scabiosa*. Wilsch /
mit punctirten Blättern / prioris est degenera-
tio, enim ex eadem radice, nasci solet. Bey der
vorhergehenden Titimale tacheté. perenn.

Trifolium acetosum aut *acetosella* of-
ficinarum, flore ex albo purpur ascente mo-
nopetalo campaniformi multifido s. *Oxys*
flore albo & purpur ascente T. Sautlee Buch-
ampfer / an feuchten schattichten Derttern / lc. 1.
Tab. p. 910. perenn. pain à Coucu.

Turritis vulgaris ramosa T. s. Bursa pa-
storis vel pilosella siliquosa, foliis majoribus
hin und wieder auf den Aeckern. lc. J. B. 2. 870.

Valeriana palustris major T. foliis latioribus
laciniatis floribus monopetalis infundibu-
liform. albicantibus divisis, radice crassa sub
flava, odoris gravis, groß wilder Baldrian oder
Ragenwurz in feuchten Orten. lc. 2. Tab. p. 454.
Valeriane perenn.

Valeriana palustris minor T. radice albi-
cante fibrosa. Kleiner Baldrian an feuchten Orten.
petite Valeriane. perenn. lc. 4. Tab. p. 455.

Valerianella arvensis præcox humilis semine
compresso T. flore simplici albo monopeta-
lo infundibuliformi, folio integro, aliis La-
tuca agnina. Lämmer Lattich auff den Reinen der
Acker. Icon. 1. Tab. p. 460. ann. Mache.

Valerianella arvensis præcox humilis foliis ser-

ratis T. s. *Lactuca agnina* s. *valerianella* foliis serratis Ray. hist. 392. cum præced.

Valerianella arvensis serotina altior, semine turgidiori T. flosculis albis monopetalis infundibuliform. multifidis parvis, später eämmer. Latich auf denen brachtlegenden Feldern. Moris. Umb. cum præced.

Viola bicolor arvensis T. flore candido & luteo simplici polypetalo anomalo papilionacei floris amulo wild. Acker Geynsamen. Kraut in denen Frucht. Feldern. Ic. 3. Tab. p. 690.

Eadem flore coeruleo & luteo. T.

Eadem flore coeruleo & candid. T.

M E N S I S

MAIJS. & JUNIVS.

Abies alba s. foemina quæ fragilis, floribus apetalis in julos congestis foliis planis mucronatis pungentibus, superne viridibus inferne cineraceis. Sapin. weiß Thannenbaum in hohen Wäldern. Ic. 1. Tab. p. 1347.

Abies mas conis sursum spectantibus foliis pectinatim dispositis utrinque virentibus s. *Abies Taxi folio*, fructu sursum spectante T. weiß Thanne Männlein. Sapin male / bey der vorhergehenden. Icon. Clus. hist. 34.

Abies picea rubra, foliis nigrioribus ac lævioribus mollioribusque ac minus acu-

aculeatis s. *Abies tenuiore folio fructu deorsum inflexo* T. roth Thannenbaum/wie die vorigen. Pesse. Ic. 2. Tab. p. 1347.

Acetosa arvensis lanceolata T. repens, foliis pingui usculis hamatis lævibus, flosculis apetalis rubentibus, fleiner Sauerampfer/auf durren grasigten Orten. petite Ozeille. Ic. 5. Tab. p. 827. perenn.

Aconitum racemosum bacciferum, flore simplici rosaceo s. folio dissecto s. *Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa* T. Christoffels. Kraut in Wäldern. Ic. Tab. p. 1163. herbe de Saint Christoffle. perenn.

Acorus verus s. *Calamus*, aromaticus, flosculis luteis cruciformibus, radice geniculata acri atque amaricante, foris ex flavo rufescente, intus alba fungosa, foliis gramineis. Ackerwurz. Callmus hin und wieder in Gräben und Fischpfudeln. Ic. Tab. p. 1031. perenn. *Acorus*.

Allium sylvestre, foliis binis latis splendentibus flore albo liliaceo s. *Allium sylvestre latifol.* T. Hecken Knoblauch. Ail sauvage ou Aulx d'ours. Ic. Tab. p. 875. perenn.

Alnus nigra baccifera, bacca nigra, foliis latis subrotundis, floribus rosaceis albis, s. *Frangula* T. Zapfen. Holz / Faulbaum in Hecken und Hölzern. Ic. Tab. p. 1461. Aune noir, perenn.

Alfne palustris uliginosis locis proveniens, folio oblongo, floribus albis rosaceis

faceis s. *Alfine aquatica media* T. Wasser, oder Brunn, Hünnerdarm / an denen Quell, Wassern. Ic. 8. Tab. p. 1089, perenn. Morgeline.

Alfine spargula dicta major T. flore albo simplici rosaceo Spuren in sandigen Feldern. ann. Icon. J. B. 13. 3. 722.

Alfine palustris portulacæ aquaticæ similis Raj. hist. 1035. potius serpillifolia. Icon. Bocc. rar. plant 48. T. an hellen Wasser, Wäpfelein.

Anagallis flore coeruleo T. simplici monopetalo multifido, foliis ex adverso binis vel ternis nascentibus, blauer Gauchheil in Gärten und auff den Aeckern. Ic. 2. Tab. p. 1092. Mouron, femelle. ann.

Anagallis flore phæniceo T. rother Gauchheil. Ic. 1. Tab. p. 1092. Mouron mâle ann.

Eadem flore carneo & albo.

Anagallis lutea nemorum, flore simplici monopetalo rotato & multifido s. *Lysimachia humifusa folio sub rotundo acuminato flore luteo* T. gelber Gauchheil in feuchten und finstern Wäldern. Icon. 3. Tab. 1092. Mouron à fleur de jaune, ann.

Anemone sylvestris major, flore albo simplici rosaceo s. *Anemone sylvestris alba major* T. grosse weisse wilde Anemonien Köpfelein. Ic. 1. Tab. p. 73. perenn. Anemone sauvage.

Anethum hortense T. s. vulgare, foliis foeniculaceis, floribus luteis rosaceis umbellatis

tis suaveolentibus, Dillen / Till. auf den Gärtners Feldern und in Gärten. Icon. Tab. p. 165. perenn. Anet.

Antirrhinum arvense majus T. foliis angustioribus, flosculis monopetalis anomalis tubulatis personatis, obsolete purpureis, Dorant auf ungebauten Feldern. Icon. 4. Tab. p. 1236. Musle de veau.

Aparine latifolia humilior montana T. s. matrisylva officinarum, flosculis albis campaniformibus multifidis foliis stellatis, Waldmeister. Icon. Tab. p. 1201. perenn. Muguet.

Aparine vulgatiore, foliis stellatis asperis, flosculis albis campaniformibus multifidis s. *Aparine vulgaris* T. groß Klebtraut an denen Zäunen. Icon. Matth. epit. p. 557. Grateron ou Reble.

Aquilegia sylvestris T. flore simplici coeruleo polypetalo pendulo, wilde blaue Agle in Hölzern. Icon. 1. Tab. p. 97. Ancolie sauvage perenn.

Eadem flore rubro.

Arum maculatum, maculis nigris T. flore monopetalo cucullato, baccis rubris, gesteckt Zehrwurz, Pfaffenpint in schattichten Hölzern. Ic. 1. Tab. p. 1124. perenn. pied de veau marqué.

Arum vulgare non maculatum T. Aron, oder Zehrwurzel in Hecken. Ic. Tab. p. 1123. perenn. pied de veau ou Vit de chien, sans marque.

Asclepias flore albo T. s. Hirundinaria vel Vin-

Vincetoxicum, flosculis albis monopetalis campanif. multifidis, Schwalben, Wurzel in Hölhern. Ic. 1. Tab. p. 1105. Dompthe venin. perenn.

Bellis coerulea caule folioso, flore composito flosculoso unilabiato s. *Globularia vulgaris* T. blau Maßlieb. Marguerite bleu. Icon. Tab. 6. p. 708. perenn.

Bellis sylvestris, caule folioso major, flore albo composito radiato. s. *Leucanthemum vulgare* T. grosse Maßlieb auf denen Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 710. Oeil de beuf.

Berberis dumetorum T. flore simplici rosaceo luteo. Saurdorn / Saurach in denen Hecken und Zäunen. Icon. 2. Tab. p. 1448. Epine vinette.

Betula T. flore amentaceo sub luteo, folio subrotundo late virenti, per ambitum serrato. Birckenbaum. Ic. Tab. p. 1398. Bouleau.

Blitum sylvestre spinachiae facie, Bonus Henricus dictum, floribus stamineis luteis s. *Chenopodium folio triangulo*. T. Stoltzer, Heinrich / wilder Feld-Spinat an denen Wegen. Icon. Tab. p. 810. bon Henry. Espinat sauvage. perenn.

Brassica alba crispa T. folio rugoso patulo, flore simplici cruciformi, krauser oder welscher Kohl. Icon. 6. Tab. p. 784. in Gärtners Feldern. Chou frise blanc. ann.

Bras-

Brassica arvensis T. s. Sylvestris Crambe dicta, Schnitt-Kohl. Icon. 15. Tab. p. 787. ann. cum praecedent.

Brassica capitata alba Tab. flore simplici cruciformi luteolo. Sauer oder weiß Kraut / in Gärtners Feldern. Ic. 4. Tab. p. 784. Chou pomme blanc. ann.

Brassica capitata rubra T. roth oder Salat-Kraut. Ic. 5. Tab. p. 784. Chou rouge.

Brassica cauliflora T. flore tetrapetalo luteolo, Blumen-Kohl. Icon. 9. Tab. p. 785. Chou fleur.

Brassica fimbriata s. *crispa laciniosa* T. Wirsing / Chou frise à feuilles fendues.

Brassica gongylodes T. caule rapum gerens rotundum, Kohlraben runder Ruben-Kohl / Chou rave. Ic. 1. Tab. p. 789.

Eadem rapo longiore, langer Ruben-Kohl. Icon. 2. Tab. p. 789.

Brassica lativa vel *viridis vulgaris* aperta laevis. flore simpl. cruciformi luteolo s. *Brassica alba vel viridis* T. gemeiner Kohl. Ic. 1. Tab. p. 783. Chou blond.

Bryonia aspera s. *alba baccis rubris* T. s. Vitis alba, foliis asperis baccis rubris, floribus monopetal. campaniform. albis, radice rapacea alba amara s. Zaun-Ruben / Scheiß-Ruben / in denen Hecken und Zäunen. Bryone ou couleuvrée. Ic. Tab. p. 1291.

Bryonia laevis s. *nigra*, fructu racemoso

so flore monopetalo viridante campaniformi s. *Bryonia alba baccis nigris* T. schwarze Zaun-Ruben in Hölzern und Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1288. *Bryone noir*. perenn.

Castanea T. sativa, fructu majore dulci floribus stamineis amentaceis in julum congestis foliis late, virentibus ac splendidibus acuminatis rigidis. *Castanten*. Baum. Ic. 1. Tab. p. 1385. Chateigner.

Castanea sylvestris quæ peculiariter *castanea* T. fructu dulci minore, folio multifido. wilder Kästen Baum. Marronier sauvage.

Castanea equina flore simpl. rosaceo in spicam congesto, folio multifido fructu amaricante s. *Hippocastanum vulgare* T. Roß, *Castanten* hin und wieder in Gärten. Marronier d'Inde. Icon. 2. Tab. p. 1385.

Chamaecerasus dumetorum; fructu gemino rubro T. s. *Periclymenum rectum* fructu gemino rubro, flore simplici monopetalo labiato, aufrechter Zünsting / Hunds-Kirschen. Cerisier bas, Icon. 4. Tab. p. 1299. perenn.

Chamadrys spuria minor, foliis imis rotundioribus flosculis coeruleis cruciform. quæ *Teucrium officinarum* pratense s. *Veronica minor* foliis imis rotundioribus T. falsch wiesen Chamanderlein. Ic. 3. Tab. p. 773. ann.

Chamæmelum vulgare odoratum, flore composito radiato, foliis tenuissime dissectis, *Chamemelum vulgare leucanthemum* T. A. potheca

potheker Chamillen auf den Winter Feldern. Ic. 1. Tab. 58. Camomille. ann.

Chærefolium sativum flosculis albis rosaceis umbellatis s. *Charophyllum sativum* T. Garten. oder Kuchen. Rösel. Icon. 1. Tab. p. 283. Cerfeuil. ann.

Chelidonium majus vulgare T. flosculis cruciformibus luteis, radice croceo succo madente, groß Schöllkraut an den Zaunen und Mauern. Eclair, grande chelidoine. Icon. 1. Tab. p. 101. perenn.

Cirsium singularibus capitulis parvis T. foliis non laciniatis floribus flosculosis purpurascentibus s. tertium montan. Clus. hist. CXLIX. perenn.

Consolida media Genevensis s. *Bugula sylvestris villosa* flore speciosiore coeruleo T. monopetalo unilabiato, groß gulden Günsel an aufgeworffenen sonnenreichen Hügeln. Bugle de Geneve. Ic. J. B. 3. 432. perenn.

Consolida pratensis media flore coeruleo monopetalo unilabiato s. *Bugula* T. gulden Günsel auf den Wiesen. Ic. 1. Tab. p. 945. Bugle ou Consoude moyenne. perenn.

Eadem flore purpureo.

Consolida media pratensis cinerea vel alba s. *Bugula flore cinereo vel alba* T. weißer gulden Günsel. perenn.

Consolida media genevensis flore rubello, s. *Bugula sylvestris villosa* flore saepe ruben-

re T. gulden Gunkel mit Fleischfarben Blumett.
Icon. Clus. Hist. XLIII.

Eadem flore albo. perenn.

Cornus femina T. s. *Cornus sylvestris* femina, putata Virga sanguinea, floribus cruciformibus sub albicantibus, fructu nigro amaro ac acerbo, foliis nervosis corno proximis. Hartriegel sanguine in denen Hecken und Zäunen. Ic. Tab. p. 1459.

Cucumis vulgaris sativus T. floribus monopetalis luteis campaniformibus multifidis, foliis angulosis, Cucumern in Gärten und Feldern. Ic. 1. Tab. 864. Concombre. ann.

Cyanus segetum flore coeruleo T. composito flosculofo, foliis integris. Bluet. Kornblumen. Icon. 1. Tab. 428. ann.

Cydonia fructu brevior & rotundior T. s. Mala cotonea minora, floribus albis rosaceis. Apfel Quitten. Baum in Gärten. Icon. 1. Tab. 1412. Coignier male ou pommier de Coing.

Cydonia fructu oblongo & levior T. s. Mala Cotonea majora, Birn Quitten. Baum. Coignier femelle. Icon. 2. Tab. p. 1413.

Cydonia vulgaris angustifolia T. s. Cotonea sylvestris. Coignassier, wilder Quitten. Baum in Hecken.

Cynoglossum majus vulgare T. floribus monopetalis infundibuli formibus multifidis purpureis, foliis oblongis. Hunds. Zung an den

den Strassen. Icon. Tab. p. 1113. Langue de Chien. ann.

Idem flore albo. T. weisse Hunds. Zung.

Dens leonis folio angustiore T. schmaht blättricht Löwen. Zahn.

Dens leonis minimus s. *Cichorium pumilum* sylvestre vel *Hedypnois* Clus. cur. post. auf durren grasichten Orten.

Dens leonis minor, foliis radiatis T. per terram sparsis laciniatis, radice parva nigricante.

Dentaria heptaphyllos baccifera T. flore cruciformi, ex candido leviter purpurascens, siliqua corniculata, Schuppen. Wurzel in Wäldern. Clus. Hist. CXXI. Icon. Tab. 4. p. 324.

Equisetum foliis nudum non ramosum s. *Juncus* T. floribus apetalis stamineis spicatis, Schachtelhalm; Handwerks. Kraut. Queue de Cheval ou Prele. Icon. 1. Tab. p. 568. in feuchten stillen Wasser. Gräben. perenn.

Equisetum sylvaticum tenuissimis setis T. s. *Equisetum sylvaticum non asperum*, Waldschaffe. Hau in feuchten und sumpfigen dunklen Wäldern. Ic. 6. Tab. p. 569. perenn.

Eruca palustris latifolia, flore luteo cruciformi, foliis latiusculis splendentibus s. *Sisymbrium eruca* folio glabro, flore luteo T. alias Barbarea. Wasser. Kresse / St. Barbara. Kraut an denen Gräben und andern feuchten Orten. Ic. 1. Tab.

Tab. p. 843. herbe aux charpentiers ou St. Barbe. perenn.

Eruca palustris minor & nasturtii folio, siliqua longa, floribus cruciformibus luteis s. *Sisymbrium palustre repens, nasturtii folio* T. kleine Wasserraucke / auf sandigen Ufern des Wassers. Icon. 2. Tab. p. 836. Roquette.

Euonymus vulgaris granis rubentibus. T. floribus albicant. rosaceis male olentibus, Janhödlein / oder Spindelbaum / in denen Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1462. Fusain ou Bonnet de Prêtre.

Euphrasia vulgaris, flosculis monopetalis anomalis personatis luteis, parvis ac labiatis, foliis crispis s. *Euphrasia officinarum* T. Augen / Trost / auf denen Wiesen. Ic. Tab. p. 1246. Eufraise. ann.

Fagus T. flore amentaceo glomerato, Buchen. Hêtre, in Wäldern. Ic. Tab. p. 1388.

Ferrum equinum germanicum siliquis in summitate T. florib. luteis papilionaceis s. *Hedysarum minus*. Ic. 2. Tab. p. 901. Unser lieben Brauen / Schüssel / gelbe Steinwicken. Fer de cheval.

Filipendula vulgaris T. floribus ochrolevis rosaceis, foliis pinnatis serratis, radice tuberosa, rother Steinbrech auf trocknen Wiesen. con. 1. Tab. p. 419. Filipende. perenn.

Fragaria vulgaris T. trifolia, flore simplici albo rosaceo. Erdbeeren / auf denen grasigen Hügel / an denen Zäunen. Ic. 1. Tab. p. 346. Fraizier. perenn.

Geni

Genista angulosa & scoparia trifolia s. vulgaris, floribus amplioribus inodoris luteis papilionaceis, foliis summe viridibus non aculeatis. s. *Cytiso scoparia vulgaris* T. Psrimmen / in Wäldern. Genet commun. Icon. 1. Tab. p. 1509. perenn.

Genista spinosa major, longioribus aculeis, flore luteo papilion. s. *Genista spartium spinosum majus*, brevioribus & longioribus aculeis T. großstehende Psrimmen Scorpions. Kraut. Genet piquant. perenn. hin und wieder in Gärten.

Genista spinosa minor germanica aculeata, caliculis aculeatis foliosis. s. *Genista spartium minus germanicum* T. klein stehend Psrimmen. Kraut. Petit genet piquant. Icon. 5. Tab. p. 1510. perenn.

Geranium columbinum majus, folio malvæ rotundo, multum serrato, flore ex coeruleo purpurascens rosaceo. s. *Geranium folio malvæ rotundo*. T. Storch. Schnabel / in denen Korn / Feldern / auch an denen Zäunen. Ic. 2. Tab. p. 123. ann.

Geranium robertianum T. flore dilute rubello striato simplici rosaceo. St. Ruperts. Kraut / stinkender Storch. Schnabel / auf den Mauern und andern schattichten steinichten Orten. Icon. Tab. p. 122. Bec de cicogne, ou herbe Robert. ann.

Gladiolus minor, floribus uno versu dispositis T. purpureis monopetalis liliaceis radice bulbosa.

bosa. Glais. Icon. Tab. p. 1024. auf Bergst-
ten Orten und Wiesen. perenn.

Gnaphalium montan. flore rotundio-
re, suave rubente composito flosculofo, fo-
lio incano s. *Elichrysium montanum*, flore rotun-
diore subpurpureo T. *Rasenskölein* / *Engelblum* /
an durren Orten / auf denen Heiden. Icon. 7. Tab.
p. 781. Pied de chat, ou Immortelle rouge. pe-
renn.

Idem flore albo. Icon. 6. Tab. p. 781.

Gnaphalium montanum, longiore & folio &
flore purpureo T. beyhm vorhergehenden. Icon. 7.
Tab. p. 781. perenn.

Flore etiam variat.

Gramen Cyperoides, spica parvis longissime
distantibus T. auff feuchten Wiesen. Raij. Hist.
1295,

Gramen Cyperoides sylvarum tenuius spicat.
T. in Wäldern. Parckins. theatr. 1171.

Gramen Cyperoides spica pendula brevior. T.
nigra, an denen Ufern.

Gramen cyperoides vel cyperinum pa-
lustre majus, spica compacta nigra, flori-
bus apetalis stamineis, foliis sparganio simi-
libus, caule triquetro. s. *Cyperoides latifolium*
spica rufa sive caule triangulo. T. groß Cyper-Gras.
Icon. 6. Tab. p. 533. an den Ufern der Wasser.
perenn.

Gramen cyperoid. vel cyperinum pa-
lustre,

lustre, spica minus compacta, radice fibro-
sa, foliis gramincis angustis, caule trique-
tro subaspero, s. *Gramen cyperoides lilifolium*,
spicis teretibus erectis T. beyhm vorhergehenden. Ic.
4. Tab. p. 532. perenn.

Gramen pratense tomentosum, panicu-
la sparsa, summe candida. s. *Linagrostis*, pani-
cula ampliore T. *Glachs*. Gras / auf feuchten Wiesen
und Mosichten Orten. Ic. Tab. p. 540. perenn.

Grossularia hortensis, majori fructu rubro &
albicante, T. non spinosa, flore simpl. rosac.
subviridi, foliis amplioribus. grosse St. Johan-
nis Träublein. Stauden / St. Johannes Beerbaum.
Groselier rouge & blanc de Jardin. Icon. 1.
Tab. p. 1492.

Grossularia multiplici acino s. non spi-
nosa hortensis rubra, foliis crenatis ac trian-
gulatis s. *Ribes officinarum* T. gemeine rothe St.
Johannes Träublein. Stauden. Groselier rouge. Ic.
1. Tab. p. 1492.

Grossularia non spinosa fructu nigro T. s. *Ri-*
bes nigrum vulgo dictum, folio olente.
Schwarze St. Johannes Beeren. Stauden / Wen-
delbeeren / in Hecken und Büschen. Icon. 2. Tab.
p. 1492. Groselier noir.

Hedera arborea. T. scandens & corym-
bosa, floribus rosaceis albis, foliis triangula-
tis. grosse Epheu / an denen alten Mauern und Bäu-
men. Icon. 1. Tab. p. 1278. Lierre. perenn.

Hedera major sterilis s. *hedera helix*.
C 3 Epheu

Ephedra in denen Bäumen und an denen Bäumen. Ic. 2. Tab. p. 1278. perenn.

Helianthemum vulgare, flore luteo T. simplici rosaceo. Sonnen. Günsel / auf grasigten dörren Orten. Icon. 2. Tab. p. 1474. Elanteme. perenn.

Horminum pratense, foliis ferratis, flore coeruleo monopetalo labiato. s. *Sclarea pratensis foliis ferratis*, flore coeruleo. T. Wilder Scharlach. Icon. 4. Tab. p. 765. Toute bonne. perenn.

Idem flore albo & suaverubente.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato spinoso, flore monopetalo rotato albo, s. *Aquifolium* T. Stroh. Eiche / Stachpalmen / in Wäldern. Icon. Tab. p. 1382. Houx. perenn.

Iris palustris lutea. T. *Iris palustris*, flore luteo monopetalo liliaceo, folio ensiformi, radice tuberosa. Gelber Wasser. Schwertel / Sumpff. Lilien / in Wasser. Gräben. Ic. 1. Tab. p. 1032. La flambe, bastarde. perenn.

Iris pratensis angustifolia, flore elegantissime coeruleo liliaceo striato. s. *Iris pratensis angustifolia*, non foetida altior. T. blaue wiesen Schwertel / auf denen dunklen wassertichen Wiesen. Icon. 12. Tab. p. 1037. Glajoul des prez. perenn.

Isatis sativa latifolia. T. flosculis luteis cruciformibus. Weyd / auf denen Feldern. Icon.

Icon. 2. Tab. 1114. Pastel ou Gnesde, à feuilles larges. perenn.

Isatis sylvestris vel angustifolia T. schmalblättrichte Weyd / hin und wieder auf der Contrescarpe. Ic. 1. Tab. p. 1114. perenn. Pastel ou Gnesde à feuilles étroites.

Juncus aquaticus maximus, caule meduloso, floribus apetalis stamineis s. *Scirpus palustris altissimus* grosse Weyher Sinken / in still stehenden Wassern und Gräben. Ic. 1. Tab. pag. 365. Junc perenn.

Lamium montanum melissae folio, flore monopetalo amplo labiato, suave rubente, grati odoris, foliis ex opposito binis latioribus, in ambitu ferratis s. *Melissa humilis latifolia*, maximo flore purpurascence T. Berg. Nessel mit Melissenblätter / auf hohen Bergen und Wäldern. Ic. Clus. hist. sub nomin. Lamii Pannon. p. XXXVII. Melisse de Montagne. perenn.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. T. floribus papilionaceis, elegantissimis purpureis odoratis s. *chamaebalanus leguminosa*. Erbsen / in denen fetten Korn. Feldern. Icon. Tab. p. 891. Gesse. perenn.

Lathyrus sylvestris dumetorum, flore luteo papilionaceo, foliis viciae, radice fibrosa s. *Lathyrus latifolius luteus*, foliis viciae T. gelbe Wiesen auf truckenen Wiesen. Ic. Tab. p. 890. perenn.

Leucojum bulbosum triphyllon majus, flore liliaceo campaniformi pendulo. s. *Nar-
cisso leucojum trifolium majus* T. grosse Schne-
Tropfen in Gärten. Perceage. perenn. Icon. 2.
Tab. p. 1005.

Lilium convall. album T. flore monopeta-
lo campaniformi. Meyenblümlein. Muguet à
fleur blanche. perenn.

Lilium convallium minus, flore rosaceo
monopetalo albicante, folio nervoso cor-
dato s. *Smilax unifolia humillima*. T. Ein Blatt in
denen Büschen. Icon. Tab. p. 1134. perenn.
Smilax.

Linaria montana flosculis subluteis apetalis
stamineis s. *Alchimilla linariae folio*, calice
florum subluteo, T. alias *Linaria adulterina*.
Falsch. Leintraut / auf durren grasichten Orten. lc.
5. Tab. p. 1209. perenn. Faux linare.

Lotus pentaphyllos, flore majore luteo papilio
naceo splendente T. foliis & siliquis hirsutis
longioribus. Vogelwicken auf den Wiesen. pe-
renn. Lotier. Icon. J B. 2. 355. ann.

Lychnis montana viscosa alba latifolia T. flo-
rum petalis supra albis, subtus virescenti-
bus, interdum se contrahentibus. Wilde weisse
Marien. Kößlein. Icon. 6. Tab. p. 674. perenn.

Lychnis pratensis flore admodum laciniato
simplici T. s. *Caryophyllus pratensis*, flore la-
ciniato simplici purpureo caryophyllæo,
Flos Cuculi dictus. Gauchblumen auf denen Wie-
sen.

sen. Icon. 15. Tab. p. 677. perenn. Girofle
des prez.

Eadem flore albo.

Lychnis sylvestris alba simplex T. s. hirsu-
ta major perennis, flore simplici caryo-
phyllæo bifido, foliis latis, alias *Ocimo-*
ides album. weisser Wiedersstoss / Walcken. Kraut/
auf der Contrescarpe, und andern grasichten Orten.
lc. 1. Tab. p. 679. Basilic sauvage. perenn.

Lychnis sylvestris, minus hirsuta perennis,
flore rubello simplici. T. caryophyllæo. s. *Lychnis*
purpurea aquatica, *Ocimum* dicta
multis *Ocymoides purpureum*. rother Wieders-
stoss / an feuchten waldichten Orten. Basilic sauvage
à fleur rouge lc. 2. Tab. p. 679. perenn.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia
T. foliis caryophyllaceis. wilde purpurothe Ma-
rien. Kößl. auf grasichten durren Orten / und in Höl-
dern. Icon. 7. Tab. p. 675. perenn.

Eadem flore albo.

Malus sylvestris minor, fructu valde acer-
bo. T. flore albo rosaceo, fructu albo atque
rubente; wider Apfelbaum / in Büschen und an-
dern Strassen. Icon. 23. Tab. p. 1420. Pommier
sauvage.

Matricaria vulgaris s. sativa T. graveolens,
floribus compositis radiatis, foliis latioribus
incisis. Mettram / in Gärten und an den Zäunen.
lc. 3. Tab. p. 28. Matricaire. perenn.

Mercurialis spicata s. femina T. flore ape-
talo.

calo. Ringel. Kraut Weiblein / in Gärten / auf Feldern und andern gebauten Orten mehr. Ic. 2. Tab. p. 941. Mercuriale femelle. ann.

Mespilus apij folio sylvestris, spinosa laciniato T. s. flore simpl. rosaceo subviridi. *Oxyacantha vulgaris*, weiß Dorn / Hagendorn / in Zäunen und Büschen. Icon. 1. Tab. p. 1448. Epine blanche.

Mespilus apij folio sylvestris, non spinosa flore simpl. rosaceo. s. *Sorbus Torminalis* vel *Crataegus folio laciniato* T. Eschroselbaum / in Hölzern und Bergen. Icon. 3. Tab. p. 1427. Alisier.

Mespilus sylvestris s. germanica, folio laurino non serrato, T. flore simpl. rosac. Dösp. Baum / in Bergen und Gärten. Icon. 1. Tab. 1447. Néflier.

Miliosolium vulgare album T. foliis pinnatis, floribus albis compositis radiatis umbellatis. Schaf. Garbe / Tausend. Blatt / an denen Wegen und Strassen. Icon. Tab. p. 372. Mille feuille. perenn.

Idem, flore purpureo. Ic. 3. Tab. p. 374.

Myagrurn sylvestre, capitulis minoribus, flosculis albis cruciformibus, foliis glastii, wilder kleiner Eitendort. Ic. 2. Tab. p. 1194. sub nomine paronych. 2d. *Myagrurn*. ann. in Glashstücken.

Myrrhis femine longo nigro, laevifriato, flosculis albis rosaceis umbellatis, s. *Chero-*

Cherophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio, T. wilder oder Eselskörbel / an denen Zäunen. Ic. 2. Tab. 254. Cerfeuil sauvage. ann.

Nasturtium aquaticum erectum majus & amarum, folio longiore flore simpl. cruciform. albo, s. *Cardamine flore majore elatior*. T. Ic. J. B. 2. 885. in denen Wassergräben / perenn. Cresson d'eau.

Nasturtium filiquosum s. Cardamine magno, flore albo pleno T. gefüllter weißer Wiesentresse. perenn. in feuchten Orten. Cresson a fleur double.

Nasturtium filiquosum pratense, magno flore simplici purpurascence cruciformi s. Cardamine pratensis, magno flore purpurascence. T. Wiesen. Kresse. Ic. 1. Tab. pag. 844. *Cardamine* ou Cresson, des Prez. perenn.

Idem flore albo.

Nasturtium sylvestre filiquosum, flore luteo minimo cruciformi, foliis tenuissime divisis, Sophia chirurgorum dictum s. *Sisymbrium annuum, absynthii minoris folio*. T. Sophien. Kraut, Wollsaamen / an denen Strassen und aufgeworffenen Gräben Ic. 1. Tab. p. 26. ann.

Nux Juglans s. Regia vulgaris T. floribus amentaceis, ex julo pendentibus. Weisscher Nußbaum. Ic. Tab. p. 1382. Noyer. Icon. Tab. p. 1382.

Orchis abortiva fusca, caule & flore majore polypetalo galeato luteo, s. fusco. *Nidus avis* T. Wagensbrunnen / Vogels. Nest / hin und wider

wieder auff dürrn Orten zwischen den Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1062. Nied d'oiseau. ann.

Orchis abortiva violacea, vel *Orobanchae sub coeruleo flore polypetalo galeato*. s. *Limodorum Austriacum*. T. bey der vorher gehenden.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo. T. weiß Knabentraut / Buchshölein / mit langen Sporen in Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1053. perenn.

Orchis bifolia latissima T. s. foliis binis splendidibus amplissimis quæ prima Clus. hist. 267. groß Knabentraut in Wäldern. perenn.

Orchis bifolia altera. T. bey der vorher stehenden. Icon. 5. Tab. p. 1054 perenn.

Orchis bifolia, flore herbaceo major. s. *Ophrys bifolia*. T. Zweyblatt / an feuchten Orten. Icon. 1. Tab. p. 1101. Double feuille. perenn.

Orchis foliis sessilibus non maculatis, s. *Orchis trifolia major*. Tab. Ic. 8. p. 1057. perenn.

Orchis fucum referens, colore rubiginoso. T. flore subvirente, auf dürrn Wiesen. Icon. 3. Tab. 1158. perenn.

Orchis hirci odore, brevior latioreque folio. T. s. Testiculus hircinus. große Buchshölein / oder stinckende Geiß. Wurzel / mit breiten Blättern / an dürrn Orten zwischen den Hecken. Ic. 1. Tab. p. 1055. perenn.

Orchis hirci odore minor. T. flore cimum instar fuliginoso, stinckend Wanken-Knaben.

Knaben-Kraut / auf dürrn Orten. Ic. 1. Tab. p. 1053. perenn.

Orchis latifolia, biante cucullo major T. galea & alis fere cinereis s. *Satyrion triphyl-lum*. auf Bergichten Orten und Wiesen. Icon. 8. Tab. p. 1057. perenn.

Orchis militaris magna, foliis latis, flore albo punctato, galea fusca. s. nigricante que altera Clus. hist. 267. s. *Orchis militaris major* T. groß Knaben-Kraut mit breiten Blättern / in Hölzern. perenn. Ic.

Orchis militaris pratensis, minor, floribus parvis albis, multis punctis purpureis notatis, foliis angustioribus. s. *Orchis militaris pratensis humilior*. T. schmalblättrichtes klein punctirtes Knaben-Kraut / an dürrn grasichten Dertern. Icon. Clus. hist. sub nomin. *Orchis pannon*. 4. perenn.

Orchis militaris montana, spica rubente conglomerata T. odoris suavissimi, ganz roth wohlriechend Stendel Wurzel / in ausgestockten Sonnenreichen Hölzern. Icon. 8. Tab. p. 105. perenn.

Orchis minor palmata radice repente. s. *Helleborine sylvatica*, radice repente *Pseudo orchis* C. B. p. in schattichten Wäldern. perenn. Icon. Eyst.

Orchis morio mas, foliis maculatis. T. flore purpureo violaceo, Knaben-Kraut mit Violettothen Blumen und gefleckten Blättern / auf dürrn grasichten Orten und brachliegenden Feldern. Icon. 6. Tab. p. 1048. *Orchis*

Orchis morio femina T. tota purpurea, foliis non maculatis, Knabenkraut mit rothen Blumen / und Blättern ohne Flecken / bey der vorhergehenden. Icon. 7. Tab. p. 1048.

Orchis minor, foliis sessilibus maculatis, s. *Orchis delphinia maculosis foliis*. T. klein braun Knaben-Kraut bey der vorhergehenden. Ic. 5. Tab. p. 1048.

Orchis palmata maxima montana. s. *Orchis palmata montana maculata*. T. Berg-Händleins-Wurzel. Icon. 6. Tab. p. 1060. sub nomine Palm. Christi. macul. mont. in Bergischen Hölzern und Wiesen.

Orchis palmata pratensis maculata T. s. *Palma Christi maculata*. Icon. 5. Tab. 1000. auf Wiesen.

Eadem flore albo.

Orchis palmata pratensis latifolia non maculata, floribus purpureis, longis calcaribus præditis. s. *Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus, folio non maculato*. T. Wasser-Händleins-Wurzel / mit nicht gesteckten Blättern. Icon. 1. Tab. p. 1057.

Orchis palmata pratensis angustifolia minor. T. flore purpureo odoratissimo longo calcaris prædito. Wohlriechend Händleins-Wurzel. Icon. 3. Tab. p. 1060. auf feuchten Wiesen.

Orchis palmata palustris latifolia T. flore albo subpurpurascente folio maculato. Händleins-Wurzel mit röthlichen Blumen / auf feuchten Wiesen. Icon. 7. p. 1061.

Orchis

Orchis palmata palustris altera. T. latifolia flore violaceo, foliis maculatis. Wasser-Händleins-Wurzel mit punctirten Blättern. Icon. 9. Tab. p. 1061.

Eadem non maculata.

Orchis palmata palustris angustifolia s. *Orchis palmata palustris tertia* T. Wasser-Händleins-Wurzel mit schmahlen Blättern. Ic. 8. Tab. p. 1061.

Orchis palmata palustris tota rubra T. foliis & floribus rubris s. *Palma Christi palustris 2da* Tab. p. 1061.

Pedicularis pratensis, flosculis monopetalis personatis purpureis, foliis profunde dissectis, s. *Pedicularis pratensis purpurea* T. rother Hahnen-Kamm / auff feuchten Orten und Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 1180. ann. *Pedculaire des prez.*

Pedicularis palustris rubra elatior Ray hist. T. beyhm vorhergehenden. ann.

Pedicularis pratensis major. s. *femina*, flosculis luteis monopetalis personatis, Crista galli dicta. s. *Pedicularis pratensis lutea* T. gelber Hahnen-Kamm. Icon. 2. Tab. p. 1180. ann. Crête de coq.

Pentaphylloides argenteum alatum vel Potentilla T. Anserina officinar. flore luteo simpliciter rosaceo, foliis serratis, subtus incanis. Gänserich / an denen Wegen. Icon. Tab. p. 342. perenn. Argentine.

Peri-

Periclymenum vulgare germanic. non
perfoliatum, flore monopetalo tubuloso di-
viso, foliis ex geniculis ad intervalla binis
oppositis. s. *Caprifolium germanicum*. T. Spect.
oder Zaun. Illen / in denen Hecken. Icon. 1. Tab.
p. 1299. perenn. Chevre feuille.

Phalangium parvo flore albo liliaceo s.
Phalangium ramosum T. Spinnen. Kraut in
Hölzern und andern durren grasichten Orten. Ic. 1.
Tab. p. 557. perenn. Phalangium.

Phalangium flore majore s. minus ra-
mosum f. *phalangium aliud pulchrius ema-*
culato lili candore conspicuum Chabraei
sciagr. p. 222. In Wäldern. peren.

Pilosella major repens hirsuta, flore
composito luteo vulgaris. f. *Dens Leonis qui*
pilosella officin. T. Müsshörlein auf trocken grasich-
ten Orten. Icon. 1. Tab. p. 506. peren. *Pilosella*
ou Oreille de Rat.

Pilosella major repens, minus hirsuta &
erecta. f. *Dens Leonis qui pilosella folio minus hir-*
suto T. auff sandigen Boden. Icon. 2. Tab. p. 507.
peren. *Piloselle* ou Orielle de Souris.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. T. klein
Spierber. Kraut. Pimpernell. Icon. 2. Tab. p.
316. Petite pimprenelle. auff trocknen Wiesen.
perenn.

Pimpinella saxifraga major, umbella
candida, florib. alb. rosaceis umbellatis. s.
Tragoselinum majus umbella candida. T. Stein-
bock

bocks. Pimpernell / auf durren Auen und sonst auf
grasichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 255. perenn.
grande boucage.

Pimpinella saxifraga major, umbella
rubente. s. *Tragoselinum majus, umbella rubente*. T.
beym vorhergehenden. Boucage rouge.

Pimpinella saxifraga minor, foliis cri-
spis, flosculis albis rosaceis umbellatis f.
Tragoselinum minus T. Krauß. Steinbockspeterlein /
auff durren Orten. Icon. 2. Tab. p. 255. perenn.
Petite boucage.

Pinus sylvestris vulgaris T. coma brevi, fo-
liis rudioribus & acutioribus, florib. apeta-
lis. Fichtenbaum / wilder Bergstrubelbaum. Icon. 5.
Tab. p. 1345. Pin sauvage.

Pistacia sylvestris, flore albo rosaceo,
ex racemo oblongo pendente, foliis fraxi-
ni s. *Staphylodendron Matthiol.* T. Pimpernißlein
Baum / hin und wieder in Gärten. Icon. Tab. p.
1430. Pistachier ou Nez coupez. perenn.

Pisum hortense, flore candido papilio-
naceo, fructu rotundo albo f. *Pisum hortense*
majus. T. Garten. Erbsen. Pois. ann.

Idem flore purpureo.

Pisum arvense. T. s. *Pisum vulgare*, par-
vum album arvense, floribus albis papilio-
naceis, foliis latioribus pinnatis. kleine Feld-
Erbsen. Icon. 4. Tab. p. 883. ann.

Plantago angustifolia major T. flore mono-
petalo hypocrateriformi quadripartito. Spi-
ger

her Wegerich / auf den Wiesen und Ketten der Ae-
cker. Icon. 1. Tab. p. 1111. Plantain à feuille
étroite. perenn.

Plantago latifolia glabra minor. T. kleiner
breiter Wegerich. Icon. 2. Tab. p. 1107. peren.

Plantago latifolia incana. T. Schaaf-Zunge
auff den Wiesen und an denen Wegen. Ic. 4. Tab.
p. 1107. peren. Plantain à large feuille. peren.

Pæonia folio nigricante splendido quæ Mas. T.
flore intense purpureo rosac. foliis latiori-
bus dissectis. Gicht- oder Pfingst-Rosen. Pivoi-
ne mâle. in Gärten und Feldern. Icon. 1. Tab. p.
1171. peren.

Eadem flore simplici. peren.

Pæonia communis vel femina T. flore sim-
plici & pleno rubro. einfache und gefüllte Gichtro-
sen. Pivoine femelle. Icon. 2. Tab. p. 1171. pe-
renn.

Polygonatum latifolium vulgare T. flore albo
simplic. monopetalo campaniformi tubu-
lato diviso s. Sigillum Salomonis, Weiswurz/
in schattichten Hölkern. Icon. 1. Tab. p. 1137.
peren. Seau de Salomon.

Polygonatum latifol. flore majore T. polygo-
natum, floribus ex singularibus pediculis.
Weiswurz bey der vorhergehenden. Icon. 2. Tab.
p. 1137. perenn.

Prunus sativa vulgaris, fructu magno crasso
subacido T. vulgo damascena, flore rosaceo
albo, folio oblongo serrato. Pflaum-Baum/
Quetschenbaum. Prunier.

Pyrus

Pyrus sativa T. floribus albis rosaceis.
süßmer Birnbaum. Poirier.

Pyrus sylvestris. T. wilder Birnbaum / an
denen Dörffern und Strassen. Poirier sauvage. Ic.
2. Tab. p. 1425.

Pyrus sylvestris, fructu majore T. s. Pyra
sylvestria majora Tab. Icon. 1. p. 1425

Quercus latifolia mas, qua brevi pediculo est
T. floiculis rubentibus amentaceis. Eich-
baum. Chene.

Quercus vulgaris cum longo pediculo T. ge-
meiner Eichbaum. Icon. Tab. p. 1374.

*Ranunculus aquaticus, folio rotundo & ca-
pillaceo* T. flore albo rosaceo. Flußhahnen-Fuß.
Icon. Tab. p. 119. perenn.

*Ranunculus aquaticus, folio tantum ca-
pillaceo, tam supra quam infra aquas te-
nuissime diviso, flore albo, medio luteus s.*
Ranunculus aquaticus capillaceus. T. in denen Grä-
ben. perenn. Ic. J. B. 3. 781.

Ranunculus aquaticus, foliis circinatis
nondum descriptus. in ausgetretenen Flußwäs-
serlein. perenn.

Ranunculus montanus, folio aconiti, magno
flore luteo globoso. T. valde hirsuto. in Bergich-
ten schattichten Dörtern. Icon. 11. Tab. p. 109.
perenn.

Ranunculus pratensis erectus dulcis T. flore
luteo rosaceo. gelber süßer Hahnen-Fuß auff de-
nen Wiesen. Icon. 1. Tab. p. 117. perenn.

D 2

Ra-

Ranunculus pratensis minor, radice verticilli modo rotunda T. s. *Ranunculus pratensis minor* radice tuberosa rotunda. kleiner Hahnen-Fuß / Sanct Antonius Rüblen auff trocknen Wiesen. Icon. 4. Tab. p. 108. perenn.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. T. süßer harichter Hahnen-Fuß / auf den Wiesen. Icon. 6. Tab. 118. perenn.

Raphanus aquaticus alter, foliis ferratis, floribus luteis cruciform. aliis *Rapistrum aquaticum* s. *Sisymbrium aquaticum raphani folio*, siliqua breviori. T. Wasser-Kresse / in denen Wasser-Gräben. Icon. 2. Tab. p. 792. perenn. *Sisymbrium*.

Raphanus aquaticus, flore luteo cruciformi, foliis in profundas lacinias divisiss. *Sisymbrium aquaticum*, foliis in profundas lacinias divisiss, siliqua brevior. T. Wasser-Kettich / bey dem vorhergehenden. Ic. 3. Tab. p. 797. perenn.

Raphanus major oblongus T. cortice albo & nigro, flore albo cruciformi. grosse Sauren Kettich. Raifort. ann.

Raphanus minor oblongus T. crusta rubra vel alba cruciform. siliqua cornuta. Radischgen / frühe rothe und weisse Kettich in Gärten. ann.

Rapistrum arvense, flore albo striato cruciformi, foliis crucæ, siliqua articulata s. *Raphanistrum* flore albo striato, siliqua articulata striata minore T. Heyd. Kettich / Hederich auf den Feldern. Icon. Tab. p. 800. ann.

Ra-

Rapistrum flore luteo, foliis incisiss vel sinuatis s. *Raphanistrum segetum*, flore luteo vel pallido. T. Hederich / bey dem vorhergehenden. Icon. Tab. p. 793. ann.

Rapunculus corniculatus, flore coeruleo monopetalo campaniformi, folio oblongo s. *Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari*. T. Wald, Rapunkel mit runder Blum / in Hölzern. Reponse de bois. J. B. 2. 810.

Rhamnus catharticus s. *Rhamnus* T. flore ex albo viridescente monopetalo, foliis pyri, baccis nigris, Officinis, Spina cervina vel Infectoria. Creutzbeer / Wegdorn / hin und wieder in denen Hecken. Icon. 1. Tab. p. 1489. Nerprun. ou Bourgepine.

Rapunculus corniculatus spicatus s. *Alopecuroides folio Urticæ*, flore coeruleo monopetalo spicato s. *Ranunculus spicatus* T. Wald. Rapunkel in Hecken. Ic. 5. p. 795. perenn.

Quandoque & flore albo.

Rapunculus esculentus s. *Campanula radice esculenta*, flore monopetalo coeruleo T. foliis inferioribus bellid. similib. humi accumbentibus, superioribus angustis & glabris, radice longiuscula alba subdulci. in grasigten Orten und Hecken / Rapunkel, Sürwislein. Reponse. Icon. 1. Tab. 793.

Rosa sylvestris s. *vulgaris* flore odorato incarnato folio glabro. T. Hecken, Rosen / wilde Rosen. Icon. Tab.

D 3

Eadem

Eadem & flor. albo.

Rubia s. *Aparine montana angustifolia* T. foliis longioribus & angustioribus, floribus albicantibus campaniformibus, radice rufescente fibrosa, auf bergichten trocknen und rauhen Orten. perenn. C.B. prodr. p. 145.

Rubus Idæus spinosus T. flore albo rosaceo, fructu rubro odoro. Hohlbeer/ Hindbeer. Staude/ in Pflücken und Bergen. Icon. Matth. p. 752. Framboisier. perenn.

Idem fructu albo.

Rubus repens, fructu casio T. flore rosaceo, s. *Rubus minor*, fructu coerulesco. J. B. 2. 59. klein kriechender Kraut, oder Brombeer. Staude/ in ausgestockten Aeckern/ auch zuzeiten an Rändern derselben.

Rubus vulgaris, fructu nigro T. flore albo rosaceo. Brombeer in Hecken. Ic. Tab. p. 1297. Ronce. perenn.

Idem flore purpurascens.

Ruta hortensis latifolia T. floribus rosaceis luteis, foliis colore saturate viridibus ac graveolentibus. Garten. Raute. Ruë. Ic. 1. Tab. p. 387

Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinar. T. flore ex coerulesco purpurasc. composito, folio laciniato. Apostem. Kraut. Wiesen Scabiosa. Scabieuse. Icon. 2. Tab. p. 441. perenn.

Sambucus aquatica flore simpl. monopetalo albo umbellato, folio vitigineo s.

Opulus

Opulus T. Schwellenbaum/ Hirschholder/ in feuchten Wäldern und sonst in denen Zäunen. Icon 4. Tab. p. 1440. Obier ou Opier.

Sambucus aquatica, flore monopetalo globoso pleno s. *Opulus flore globoso* T. Schnebällchen in Gärten. Icon. 5. & 6. Tab. p. 1440.

Sambucus humilis s. *Ebulus* T. flore albo monopetalo rosaceo multifido. Aitich. Yeble. Icon. Tab. p. 1160.

Sanicula officinar T. flore rosaceo umbellat. subvirid. Santikel. Sanicle. in Hölzern. Icon. Tab. p. 244.

Satureja sativa T. s. hortens. Saturren/ Bohnen. Kraut/ flore barbato & galeato purpurascens. Sarriette. Icon. Tab. p. 744.

Scandix semine rostrato vulgaris T. folio tenuiore, floribus albis rosac. Nadelstörkel in denen Frucht. Aeckern. Icon. 1. Tab. p. 288. Peigne de Venus. ann.

Senecio minor vulgaris T. flore composito luteo flosculoso. Creuzel. Kraut/ Canarien. Vogel. Kraut/ auf Kraut. und Gärtners. Geldern. Ic. 1. Tab. p. 462. Petit Senecion. ann.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta, flore ochroleuco monopetalo labiato, s. *Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis*. T. Zeisigen. Kraut. Berus. Kraut. Icon. 5. Tab. p. 370. Crapaudine. ann.

Sinapi sativum, folio rapæ, flore subluceo cruciform. s. *Sinapi rapifolio* T. rechter Senf in

in Gärten und auff Gärtners Aeckern. Moutarde.
Icon. 1. Tab. p. 838. ann.

Solanum scandens T. floribus violaceis graveolentibus monopetalis rotatis divisis, baccis rubris s. *Dulcamara* Hindsch. Kraut / an Wasser gestaden. Icon. Tab. p. 1290. Morelle, perenn.

Sorbus sylvestris, foliis domestica similibus T. s. *Sorbus aucuparia*, floribus albis cruciform. foliis pinnat. ferratis, baccis rubris. grosser Meelbaum / Vogelbeerbaum / in bergichten Wäldern. Icon. 2. Tab. p. 1426. Sorbier.

Symphytum majus vulgare T. s. *Consolida major* flore purpureo monopetalo infundibuliformi, foliis oblongis hirsutis, quæ Mas schwarze Schmeer oder Wall. Wurzel. Icon. 2. Tab. p. 949. Grande Consoude ou Oreille d'Asne. perenn.

Idem flore albo quod foemina & incarnato.

Syringa flore coeruleo monopetalo infundibuliformi diviso major s. *Lilac* T. hin und wieder in Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1459. *Lilac*. perenn. Strincken.

Eadem flore albo.

Thlaspi arvense vaccariae incano folio majus, flosculis albis cruciform. s. *Thlaspi vulgatus* T. Bauren. Kresse / in Kraut. Aeckern. Moutarde ou Seneve sauvage. Icon. 2. Tab. p. 849. ann.

Thlaspi

Thlaspi arvense & vaccaria folio lato levique, siliquis latis T. Bauren. Sene/beym vorhergehenden. Icon. 3. Tab. p. 850. ann.

Thlaspi arvense siliquis latis T. flosculis albis s. *Thlaspi Drabæ folio*, grosser Bauren. Sene in Gärtners Feldern. Icon. 1. Tab. 849. ann.

Thlaspi incanum, Alyssum dictum, campestre majus, folio polygoni, flosculis subluteis cruciform. siliculosis, tenui radice alba s. *Alyssum incanum luteum, serpilli folio majus* T. groß Schild. Bese. Kraut / an durren Orten. Alysson. Icon. 4. Tab. p. 850. ann.

Thlaspi incanum Alyssum dictum campestre minus s. *Alyssum incanum luteum serpilli folio minus* T. klein Schild. Bese. Kraut / beyhm vorhergehenden. Icon. 18. p. 853. ann.

Tilia femina folio majore T. flore rosaceo luteolo. Linden Baum mit breiten Blättern. Tilleul. Icon. 2. Tab. p. 1397.

Eadem folio minore s. *sylvestris* vel Mas foliis Ulmi. Ic. 1. Tab. p. 1396.

Trifolium arvense lupulinum, flore luteo papilionaceo majus s. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli* s. *Agrarium*. T. gelber Fels oder Hopfen. Klee / auff denen Wiesen. ann.

Trifolium arvense flore luteo lupulino minus s. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior*. T. kleiner Hopfen. Klee / beyhm vorhergehenden. Icon. 13. Tab. p. 908. ann.

D 5

Tri-

Trifolium montanum lupulinum T. capitulis spadiceis. Unser Frauen Hopf. Klee / Berg Hopffen. Klee / in Bergen. ann.

Trifolium pratense, flore albo minus & semina glabrum T. foliis subrotundis maculatis floribus suaveolentibus, wohlriechender Bisam oder Wiesen. Klee. Treffe des prez. perenn.

Trifolium pratense album, flosculis papilionaceis foliis oblongis imis cordatis s. *Trifolium pratense album* T. weiser tangblättrichter wiesen Klee / unten zu mit runden Herzblättern / auf den Wiesen. Ic. 1. Tab. p. 907. perenn.

Trifolium pratense fibrinum flore monopetalo coeruleo, radice amarissima succulenta s. *Menyanthes palustre* T. Biber. oder Sumpff. Klee / auf feuchten Wiesen und in sumpftichten Gräben. Icon. 2. Tab. p. 906. Menante. perenn.

Trifolium pratense album inodorum folio subrotundo non maculato. kleiner weiser Wegklee ohne Geruch. perenn.

Trifolium pratense flore monopetalo T. purpureo papilionaceo. Fleischblum / brauner wiesen Klee. Ic. 2. Tab. p. 908. perenn.

Trifolium siliquosum s. *Lotus pratensis* siliquosus luteus T. pentaphyllos flore papilionaceo. Schotten. Klee / auff denen Wiesen und andern grasichten Orten. Ic. 1. Tab. p. 904. perenn.

Typha palustris major. T. floribus apetalis exiguis, folio triangulo. grosse Liefch. oder Nar.

Narren. Kolben. Grande masse, le jonc ou Marteau. Icon. Tab. 1. p. 558. perenn.

Typha palustris minor T. kleine Narren. Kolben. Petit Masse. Ic. 2. Tab. p. 559. perenn.

Veronica serpens, folio rotundiore serrato, flore dilute coeruleo monopetalo rotato diviso s. *Veronica mas*, supina & vulgatiss. T. quæ officinar. Ehrenpreis Männlein in Wäldern und andern heckichten Orten. Veronique mâle vulgaire. Icon. 1. Tab. p. 773. perenn.

Veronica spicata minor. T. s. recta minima Clusii Hist. 347. klein aufrecht stehender Ehrenpreis.

Veronica spicata pratensis serpilli folia, flore ex purpureo candido monopetalo rotato diviso s. *Veronica pratensis serpillifolia*. T. Heil aller Welt / klein Ehrenpreis Weiblein / auff feuchten und andern sandigen Wiesen. Icon. 2. Tab. p. 773. perenn.

Veronica spicata minor, foliis imis rotundioribus T. s. *Chamædris spuria minor* rotundifolia. klein Samanderlein auff schattichten Wiesen und in Püschchen. Ic. 3. p. 771. perenn.

Eadem flore albo.

Veronica supina Teucris folio. T. s. *Chamædri spuria* affinis rotundi folia scutellata. In Wäldern und Bergen. perenn.

Viburnum T. flore albo monopetalo rotato diviso, foliis crassioribus incanis ac sensim per ambitum serratis. Meelbaum / Schlingbaum / in Hecken und Wäldern. Viorne. Ic. Tab. p. 1461. Vicia

Vicia annua minor, purpureo coerulea spicata procumbens, flore papilionaceo s. *Vicia sylvestris spicata*. T. Vogel. oder Feld- Wicken / in den Korn- Feldern. Vesse. Clus. Hist. sub nomin. *Vicia sylvestr.* 2d. p. CCXXXV. ann.

Vicia perennis maxima dumetorum, flore papilionaceo purpureo s. *Vicia maxima dumetorum* T. alias Cracca major. grosse wilde Wicken / in den Büschen und Hecken. Icon. 2. Tab. p. 892.

Vicia perennis multiflora sepium s. *dumetorum*, coeruleo spicato flore papilionaceo s. *Vicia multiflora* T. steigende Vogel- Wicken / mit blauen Blumen / in denen Hecken und Büschen. Ic. 1. Tab. p. 891.

Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis T. s. flosculis ex albo purpureis, semine rotundiore maculato. Cracca minor, kleine weiß- graue wilde Wicke / unter dem Getreide. Vesse- sauvage ou Vesseron. Ic. 3. Tab. p. 892. ann.

Vitis Idæa T. foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Omnium minima est* s. Myrtillus, flore albo monopetalo campaniformi pendulo. Schwarze- beer, Wald-, oder Heidelbeer, Staude in Bergen. Airille ou Myrtille. Ic. 1. Tab. 1487. perenn.

Vitis Idæa T. semper virens, foliis buxi, baccis rubris austeris ac amaricantibus, floribus blande rubentibus s. *Vitis Idæa foliis sub-*

rotundis non crenatis, fructu rubro. T. Preussels oder rothe Steinbeeren / in Bergen. Ic. 4. Tab. p. 1488. perenn.

Vitis Idæa palustris, flore rosaceo purpurascence, petalis reflexis. s. *Oxycoccus*. T. Moßbeeren / in sumpsichten Orten. Couffinet des mamis. perenn.

MENSIS

JVNIVS. & JVLIVS.

A *Cetosa rotundifolia hortensis* T. s. *Oxalis romana* repens, folio rotundiore succulento, pallide virente, floribus apetalis stamineis. Garten- Ampfer. Ozeille ronde. Ic. 3. Tab. p. 1184. perenn.

Adiantum album murarium, foliis rutaceis saturate virentibus s. *Ruta muraria* T. Mauerrauten. Rue des murailles. Icon. 3. Tab. p. 1184. perenn.

Adiantum vel Polytrichum aureum s. *Muscus capillaceus major*, pediculo & capitulo crassioribus T. Wiedertodt / Wiedertthon. Perce- mouffe ou Politric. In schattichten feuchten Orten. Ic. Tab. sub nomine *Adiant. aurei*. p. 1186. perenn.

Adiantum nigrum vulgare s. officinarum, foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro s. *Filicula quæ adiantum nigrum officin-*

officinarum, pinnulis obtusioribus. T. Frauen-Haar/
grosse Esels, Barn. Icon. 5. Tab. p. 1185. Ca-
pillaire noir. perenn.

Agrimonia officinarum T. flosculis rosaceis
luteis, suaveolentibus, radice nigra adstrin-
gente, fructu oblongo echinato, caule hirsu-
to, folio serrato fisso. Odermennig in denen
Hecken. Aigremoine. Icon. Tab. p. 330. perenn.

Agrimonia odorata s. *Eupatorium odo-
ratum* T. s. folio speciosiore diviso, ac per
ambitum serrato, floribus luteis rosaceis
spicatum dispositis. Wohlriechender Odermennig/
in Bergen und andern sandigen dunklen Orten. Eu-
patoire à un fumet agreable. perenn.

Alchimilla vulgaris T. folio rotundo cre-
nato, floribus subluteis apetalis, hirsutis ver-
ticillatis. Stau / unser Frauen Mantel / in
feuchten Orten / in Wäldern. Pied de Lion. Icon.
Tab. p. 249. perenn.

Alga tenuioribus filamentis s. *Tricho-
manes aquaticum* Dalechampij. in denen Was-
ser. Quellen.

Alga vulgarissima & longissima Con-
ferva vulgo. aller Orten in Wasserbächen.

Allium montanum latifol. maculat. T. flore
albo liliaceo s. *Victoralis longa* Clus. Hist.
189. Allermannsharnisch / auf bergichten Wiesen.

Idem foliis angustioribus C. B. Ail de
montagne longue.

Allium sativum T. flore liliaceo multi-
fido

fido albo, folio non fistuloso radice fibrosa.
Knoblauch / auff den Gärtners Aekern. Ail. Icon.
Matth. p. 328. ann.

Allium sativum alterum sive Alioprasum
caulis summo circum voluto T. s. *Scorodopra-
sum*. Icon. Clus. Hist. 19. ann. Rocambole.
Welscher Knoblauch.

Allium campestre juncifolium capita-
tum purpurascens majus, aliis Porrum syl-
vestre latifolium, floribus liliaceis rubris. f.
Cepa juncifolia minor purpurascens T. Icon. Tab.
p. 872. Poireau sauvage. wilder Knoblauch / in Fel-
dern und Hecken. perenn.

*Allium campestre purpurascens tenui-
folium* s. *Cepa tenuifolia*, *spherocephalos purpu-
rascens* T. Petit poireau sauvage. Raij. Hist. 1118.
kleiner wilder Knoblauch / beyhm vorhergehenden.
perenn.

Alsine altissima nemorum T. repens foliis
ex adverso nascentibus, parietariae similibus
floribus amplioribus rosaceis albis. groß Bo-
gelkraut in feuchten Hecken und Büschen / gern bey
Quellen und ablauffenden Wasserlein. Morgeline.
Icon. 2. Tab. p. 1086. ann.

Alsine aquatica s. palustris major T. Wasser-
Vogel. Kraut / in Wassergräben und Bächlein. Ic.
9. Tab. p. 1089. ann.

Alsine aquatica media T. uliginosis locis
proveniens s. *fontana longifolia*, floribus al-
bis

bis rosaceis. Brunnen, Vogel, Kraut / in frischen Wasser, Bächlein. Ic. 8. Tab. p. 1089. ann.

Alfine minor multicaulis T. foliis serpilli similibus. kleiner Hüner, Darm / auff sandigem Boden. Icon. 4. Tab. p. 1087. ann.

Alfine minor capitulis lini T. s. *Petræa minima*. Tab. Icon. 3. p. 1088. klein Stein, Vogel, Kraut / auff brachliegenden Aeckern und andern Orten mehr. ann.

Alfine montana latifolia flore laciniato T. foliis latioribus & hirsutis. In schattichten Püschchen.

Angelica sylvestris minor s. *Erratica* T. repens, floribus rosaceis, umbellat. albis, foliis latioribus dissectis atro virentibus. kleine wilde Angelique, in schattichten Orten und Zäunen. Icon. 2. Tab. p. 230. Angelique sauvage ou herbe Gerard.

Anonis spinosa T. trifolia flore purpureo simpl. papilionaceo. Stachelkraut / Hauhechel / auf dürreren Orten. Icon. 1. Tab. p. 913. Arreste. boeuf ou bugraine avec d'espines, perenn.

Eadem flore albo. Ic. 2. Tab. p. 913.

Anonis non spinosa trifolia, flore purpureo s. *Anonis spinis carens*, purpurea. T. Hauhechel / ohne Stachel / an denen Rändern der Aecker. Ic. 3. Tab. p. 913. Arrestes boeuf. sans epines, perenn.

Anthyllis leguminosa, luteo pallescente flore, simplici papilionaceo, foliis subrotundis. s. *Vulneraria rustica* T. gelber Hasen-

Ries.

Ries. Icon. 3. Tab. p. 909. Vulnèraire. ann.

Apium s. *Sium palustre foliis oblongis* T. per ambitum serratis angustis, floribus albis rosaceis umbellatis. Icon. 1. Tab. p. 202. Wasserpererlein / Wasser, Eppich / in frischen stehenden Bächlein. Berle. perenn.

Asparagus sativus, folio anethi, flosculis luteis rosaceis divisis, baccis rubris, radice squamosa alba s. *Asparagus sativa*. T. Spargen / in Gärtners Feldern. Asperge. Icon. 1. Tab. p. 414, perenn.

Aster montanus luteus, foliis glabro folio. T. s. *Bubonium luteum* Tab., flore perfecto composito radiato. gelb Bergstern Kraut in Höstern / Aster. Icon. 2. Tab. p. 716 perenn.

Astragalus luteus perennis procumbens T. s. *Glycyrrhiza sylvestris*, floribus luteo pallescentibus papilionaceis C. B. p. Wilder foenum græcum, in grashtichten dürreren Orten / Astragale jaune. Icon. Moris Histor. Oxon. Part. 2. 107. perenn. Fenugrec sauvage.

Avena vulgaris s. *alba* T. floribus apetalis, folio gramineo. Weisser Habern / Avoine, auff denen Aeckern. Ic. Tab. p. 642. ann.

Avena nigra. T. schwarzer Habern. Avoine noir. ann.

Balsamina lutea s. *Noli me tangere* T. flore pendulo polypetalo patulo luteo, folio oblongo latiusculo. Springkraut / an schattichten Orten

E

Orten

Orten der Wasserbächlein. Balsamine jaune. Icon. Tab. p. 1254. ann.

Barba caprae, floribus compactis albis rosaceis, folio serrato ac sinuato, radice capillata amara. s. *Ulmaria officinarum*. T. Geißbart / auff feuchten Wiesen. Barbe de Cheure ou Reine des prez. Icon. Tab. p. 1162. perenn.

Barba caprae floribus oblongis rosaceis T. s. *Drymopogon*. Tab. Waldbart in Höckern. Icon. 1. Tab. p. 1163. perenn.

Beta alba s. viridis, radice fibrosa, floribus viridantibus stamineis, folio latiore costa spissa. s. *Beta alba vel pallescens qua Cicla, officinar.* T. Mangold in Gärten und Feldern. Poirée blanche. Icon. 1. Tab. p. 814. ann.

Beta rubra radice rapae. T. rötliche Rüben oder Möhren. Betterave ou Poirée rouge. Icon. 3. Tab. p. 814.

Betonica vulgaris, flore purpureo monopetalo labiato, folio laciniato hirsuto s. *Betonica purpurea*. T. braune Betonien / auff den Wiesen und in Höcken. Betoine. Icon. 1. Tab. p. 931. perenn.

Eadem flore albo. Icon. 2. Tab. p. 931.

Brassica sylvestris foliis longis, circa radicem cichoraceis asperis, floribus interdum ex albo pallescentibus cruciform. radice alba durior. s. *Turritis foliis inferioribus cichoraceis, coeteris persoliat.* T. langstielichter Waldröhl / mit Hindlauff. Blättern / auff sandigen Orten und

und ausgeflochten Höckern. Icon. Clus. hist. sub nomin. Turritis major. Plateau. p. CXXXVI. ann.

Brunella folio laciniato T. flore albo monopetalo labiato parvo. weisse Braunellen / auff trocknen grasigten Orten. Icon. 2. Tab. p. 944. perenn. Brunelle.

Brunella major, folio non dissecto T. flore rubro monopetalo labiato s. *Brunella vulgaris*. Braunelle / auff trocknen Wiesen und Reinen. Icon. Tab. p. 943. perenn.

Eadem flore albo.

Buglossum angustifolium majus. T. s. Vulgare, flore rubro monopetalo infundibuliformi diviso. Ochsen. Zung / in Gärten / auch in fetten Korn. Feldern. Bugloffe. Icon. 1. Tab. p. 803. perenn.

Buglossum sylvestre minus T. asperum floribus eleganter coeruleis monopetalis infundibuliform. wilde kleine Ochsen. Zung / in den Feldern. Icon. Fuchs la petite bugloffe. ann.

Cacalia foliis crassis hirsutis T. flosculis flosculosis purpurascens cruciformibus s. *Cacalia incano folio* Clus. Hist. CXV. grosse Waldröschhub. *Cacalia*. perenn. in Wäldern.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris C. B. s. *Cacalia glabro folio* Clus. Hist. CXV. in bergichten Wäldern. perenn.

Campanula arvensis minor, siliqua ampliori. T. *Speculum veneris minus*, flore coeruleo

monopetalo campaniformi multifido. *Fraus*
Eptegel / in den Frucht, Aeffern, ann.

Eadem quandoque flore albo. Ic. Tab.
p. 683.

Campanula nemorosa angustifolia, magno flore, major. T. s. *Rapunculus nemorosus*, magno flore, major. Wald. *Rapungel*. Icon. 6. Tab. p. 795. perenn.

Campanula nemorosa angustifolia parvo flore. T. s. *Rapunculus nemorosus angustifolius*, parvo flore. Icon. 3. Tab. p. 794. kleine Wald. Glöcklein. perenn.

Campanula persica folio, T. s. *Rapunculus persicifolius*, magno flore coeruleo monopetalo campaniformi, folio angusto atque oblongo, parum cretato, radice lactescente. Wald. Glöcklein / in bergichten Orten und Wäldern. Icon. Clus. Hist. CLXXI. perenn.

Campanula hortensis, rapunculi radice. T. s. *Campanula repens*, flore minore coeruleo. wilde Milch. Glöcklein. Icon. J. B. 2. 804.

Campanula minor vulgaris rotundifolia. T. s. *Campanula minor rotundioribus imis foliis*, floribus monopetalis coeruleis, radice fibrosa repente. kleine blaue Milch. Glöcklein / hin und wieder auf den aufgeworffenen gräßlichen Hügel. Icon. 2. Tab. p. 794.

Caryophyllus sylvestris latifolius vulgaris. T. f. minor, flore rubro simplici caryophyllæ aliis Tunica. Donnernägelein / auf grasfichem

Reuten trocknen Orten. Icon. 12. Tab. p. 665.
Oeillet rouge sauvage, à feuilles larges.

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius. T. s. *Caryophyllus montanus albus*. weisse W. de Stein. Nägelein / bey dem vorhergehenden. Icon. 13. Tab. p. 668.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico T. s. *repens humilis minimus vulgarissimus rubellus*, radice longa tenui fibrosa. Icon. Clus. Hist. p. 282. Stein, oder Bildnägelein auf trocknen sandigen Orten.

Centaureum luteum persoliatum T. flore monopetalo in fundibuliformi, radice alba fibrosa. Selbst tausend Gulden. Icon. 4. Tab. p. 1166. Centaurée jaune.

Cepa fissilis. T. Schleiß. Zwiebel. Ciboule. Icon. Matth. epit. p. 326.

Cepa sectilis caule, floribus & semine vulgaris cepæ similibus, ut & bulbulis oblongis minime capitatis. Schnitt, oder St. Jacobs Zwiebeln. Oignon de St. Jacque. Ic. Matth. Epit. p. 325.

Cepa sectilis juncifolia perennis. T. s. Porrum sectivum juncifolium. Schnittlauch. Ic. Tab. 276.

Cepa vulgaris. T. rotunda, floribus & tunicis purpurascens liliaceis, foliis fistulosis. Zwiebel / in Gärten und Feldern. Oignon. Ic. 2. Tab. p. 270.

Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis.
E 3

dis. T. s. *Cepa alba rotunda*, weisse Ziboln.
Icon. 1. Tab. p. 370.

Cepa vulgaris oblonga, T. Winter Ziboln.

Cepa ascalonica, T. s. Sterilis, Schalotten.
Icon. Matthiol Epitom. p. 327. Eschalotte.

Chamadrys major repens, T. foliis lacinia-
tis, flore monopetalo labiato rubello. Edel
Samanderlein/ Dathengel. Germandree Ic. 2. &
3. Tab. p. 768.

Chamadrys minor repens, T. flore purpureo
monopetalo labiato. Gemein Samanderlein.
Ic. 1. Tab. 768. petite Chesnette.

Eadem flore albo.

Chamadrys palustris canescens T. s. *Scordium*
officinarum flore purpureo monopetalo
tantum labiato, folio villosa. Lachen-Knoblauch/
Wasser-Dathenig. Germandrée d'Eau ou Scordi-
um Ic. 1. Tab. p. 1144.

Chamamelum foetidum T. flore compo-
sito radiato sive *Cotula foetida* officinar.
Krotten-Dill/ stinckende Hunds Camille/ an unges-
bauten Orten. Camomille puante, ou Marouttes.

Chamamelum inodorum, T. s. non foetidum
vel *Cotula non foetida*, Hunds-Camillen/ ohne
Geruch/ hin und wieder in den Feldern. Camo-
mille sans Odeur. Ic. 1. Tab. p. 71.

Chamamelum miniatum sylvestre, flo-
re phæniceo-rosaceo, foliis tenuissime dis-
sectis s. *Ranunculus arvensis*, foliis *Anthemidis*
floribus minoribus atrorubentibus & splendidibus
T. alias

T. alias Flos Adonis. hellrothe Feld-Röschlein/ Co-
rallen. Blumen/ in denen Frucht-Neckern. Icon.
1. Tab. p. 72.

Idem flore luteo s. *Ranunculus arvensis* fo-
liis *chamemeli*, flore citriato. T. gelbe Feld-Röschlein/
beym vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 72.

Chamaepithys vulgaris, flore luteo odo-
rato, monopetalo unilabiato, folio trifido
oblongo s. *Chamaepithys lutea vulgaris* T. Feld-
Cyressen/ Schlagträutlein. Ivette Ic. Tab. p. 776.

Cichorium angustifolium T. s. *Intybus* vel
Endivia sativa angustifolia vulgaris, flore
composito semisflosculoso, schmalblättriche
Endivien. Ic. 3. Tab. p. 477. Scariole ou Endive.

Cichorium crispum T. s. *Intybus* vel Endi-
via crispa frause Endivien/ Scariole crespée. Ic.
2. Tab. p. 477.

Cichorium latifolium s. *Endivia vulgaris*
T. floribus coeruleis & candidis compositis
Endivien/ mit breiten Blättern/ Winter-Endivien.
Endive à feuilles larges. Ic. 1. Tab. p. 467.

Cichorium sylvestre T. flore coeruleo &
albo composito, wilde Wegwart/ Wegwetsch. Chi-
corée sauvage, neben den Wegen und Strassen. Ic.
1. Tab. p. 467.

Cichorium sativum T. flore coeruleo & al-
bo, zahme oder Garten-Wegwart/ Cichorien/ in
Gärten. Chicorée.

Cicutaria latifolia foetida T. caule genicu-
lato, foliis myrrhidis latioribus & nigriori-
bus

bus rosaceis umbellatis, stinkender Schirlling/
in feuchten schattigten Orten. Cigue, Ic. 2. Tab.
p. 1170.

Cicutaria palustris latifolia alba & ru-
bra, s. Myrrhis palustris latifolia alba. r. Was-
ser. Schirlling in feuchten Orten. Cigue en marais
à feuilles larges.

Eadem rubra.

Cicutaria palustris tenuifolia, flore albo
rosaceo s. Phellandrium r. Sumpff. Schirlling in
stillstehenden Wasser. Bächen. Cigue en Marais à
feuilles étroites. Ic. 3. Tab. p. 1170.

Consolida regalis arvensis, flore mi-
nore coerulesco polypetalo foliis tenuius di-
visis, s. Delphinium segetum flore coerulesco, r. Korn-
Rittersporen in Frucht-Feldern. Pied d'alouette. Ic.
2. Tab. p. 131.

Conyza aquatica laciniata ferratifolia
s. Aster palustris laciniatus luteus, r. aliis Jaco-
bæa palustris altissima suaveolens, foliis dis-
sectis, floribus luteis compositis radiatis
Wasserwund. Kraut in feuchten Orten/ zwischen den
Röhren. Ic. 3. Tab. p. 946. Conise d'Eau.

Conyza coerulesca acris s. Aster arvensis
coerulesca acris r. flore composito radiatosub-
coeruleo, kleine Dürnwurzel, Beruffstrauch. Ic. 3.
Tab. p. 946. Aster auff den Mauern und andern
dürren Orten.

Conyza incana s. Aster incanus verbasco
folio villosus r. aliis Jacobæa palustris altissi-
ma

ma suaveolens foliis integris. Conise musquée
in sumpffigten Orten.

Convolvulus major albus, r. flore albo mo-
nopetal. campaniformi, grosse weisse Winde/
in denen Zäunen und Hecken. Liseron ou Cam-
panette. Ic. 1. Tab. p. 1263.

Convolvulus minor arvensis r. flore candi-
do monopetalo campaniformi, kleine weisse
Winde/ in sandigen Feldern/ und an denen grasich-
ten Reinen. Petit liseron ou Lizet. Icon. 3. Tab.
p. 1263.

Idem flore roseo striato, ex carneo &
albo. kleine rosche Winde/ bey der vorhergehenden.

Coriandrum majus r. s. sativum, flore al-
bo rosaceo umbellato foliis inferioribus la-
tioribus, superioribus vero tenuius dissectis.
Coriander, auff denen Gärtners Feldern. Co-
riandre. ann.

Coronopus sativus s. hortensis r. tenuifoli-
us laciniatus, spica plantaginis, floribus mo-
nopetalis hypocrateriform. divis aliàs Cor-
nu Cervinum, zahmer oder Garten Krähen-Fuss/
in Gärten und Gärtners Feldern. Corne de cerf.
Ic. 1. Tab. p. 302. ann.

Cymbalaria flosculus purpurascens
monopetalis personatis, foliis hæderaceis at-
que cauliculis repentibus s. Linaria hæderaceo-
folio, r. Cymbalstrauch. Linaire de Murailles. peren-

Doronicum folio plantaginis r. oblon-
go villosa flore aureo composito radi-

ato s. Arnica vel Damasonium i. Dioscoridis, groß Eucianus-Kraut / Johannisblum / in Wäldern und Bergichten Orten. Plantaine des Montagnes. Ic. Tab. p. 714. & i. p. 1116. perenn.

Daucus montanus multifido folio semine selini s. *Foeniculum minimum patulum*. T. Berg-Fenchel Ic. hist. Clus. sub nomine Selin. montan. pumil.

Dracunculus pratensis folio serrato longo, flore albo composito radiato s. *Parmica vulgaris*, flore albo folio longo serrato, T. wilder weißer Bertram / Dorant auff feuchten Wiesen und Wassergestaden. Ic. Tab. p. 1164. perenn. *Parmica*.

Echium scorpioides arvense repens, flore coeruleo minimo monopetalo infundibuliformi, folio integro hirsuto. s. *Lithospermum arvense minus* T. blau Mauphöhrlein / auf ungebauten Aeckern. Petit gremil. Icon. i. Tab. p. 511. ann.

Echium scorpioides arvense minus, floribus luteis vel luteo coeruleis. T. beyhm vorhergehenden. ann.

Echium scorpioides palustre repens, flore coeruleo rosaceo. s. *Lithospermum palustre minus* flore coeruleo. T. Vergiß mein nicht / Je länger je lieber / in sumpfsichten feuchten Orten. Ic. 2. Tab. p. 511. perenn.

Idem flore albo quandoque & rubello.

Echium

Echium scorpioides palustre repens, flore & folio majore s. *Myosotis glabra palustris* & major Dillen. C. P. p. 83.

Equisetum foliis nudum ramosum. T. live junceum ramosum. Icon. i. Tab. p. 568. perenn. Queu de cheval sans branche.

Equisetum palustre majus T. setis longissimis, groß Wasser-Schachtel, Halm. Icon. 4. Tab. p. 569.

Equisetum palustre minus polystachion 2. C. B. prodr. s. radice repente geniculata. auff grasichten sumpfsichten Wiesen / beyhm Rhein-strohm.

Equisetum foliis nudum minus variegatum Basileense T. radice nigra, julo brevissimo. hin und wieder in feuchten Orten des Rheins. perenn.

Equisetum palustre brevioribus setis T. in stillstehenden Wasser-Gräben. s. *Palustre*. Ic. Lob. 795. perenn.

Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermum. Wasser-Schachtel / in Weyhern und Wasser-Gräben. Icon. i. Tab. p. 1217. perenn.

Equisetum palustre longioribus setis T. s. *Equisetum majus aquaticum* J. B. 3. 728. Icon. C. B. Theatr. bot. p. 241. perenn.

Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis, lang zart Wald-Schachtel / in feuchten Wäldern und andern Orten bey Fisch-Weyhern. Icon. C. B. Th. p. 246. perenn.

Erica vulgaris glabra. T. flore purpureo

& albo monopetalo, foliis sabinae similib.
Deyde. Bruyere. Ic. Tab. 1. & 2. p. 1517. perenn.

Eryngium vulgare T. flosculis rosaceis umbellatis, Manns-tren Bracken-Distel / an den Strassen. Chardon roland ou à cent tetes. Icon. Tab. p. 1072. perenn.

Faba major recentiorum T. flore picto papilionaceo. Saubohnen in denen Feldern. Grande feve. Icon. 1. Tab. p. 879. ann.

Fenum graecum sativum T. flore albo papilion, foliolo ex uno petiolo terneo. Bockshorn / in denen Gärtners Feldern. Fœnugrec. Icon. Matth. p. 199. ann.

Filicula fontana major. s. *Adiantum album filicis folio* T. caule tenui fragili. Braun-Farn-Kraut. Icon. J.B. 3. 741. in feuchte, steinichtes Orten. perenn.

Filicula fontana minor T. foliis rutæ murar. similibus, zwischen den Steinen und Felsen. Tab. Icon. 3. p. 1181. perenn.

Filicula saxatilis corniculata. T. s. *Holosteum petraeum*. Tab. Icon. 3. p. 1113. Schlangwurz / in rauhen steinichten Orten. perenn.

Filix non ramosa dentata T. s. Mas officinar. Buchfarn / aller Orten in Wäldern. Ic. Tab. p. 1181. Fougere mâle. perenn.

Filix ramosa major, *pinnulis obtusis non dentatis*. T. s. foemina. Fougere femelle ou fougere comun. gemeine Farn. Icon. 1. p. 1181. perenn.

Filix non ramosa, *petiolis tenuissimis & tenuiss.*

tenuissime dentatis T. s. *Filicula petraea fœmina*, Steinfarn / Ic. Tab. p. 1182. perenn.

Filix ramosa minor, *pinnulis dentatis* T. s. *Filix querna* vel arborea, Eichfarn in Bergichten Wäldern. Ic. Tab. 4. perenn.

Filix minor non ramosa, s. *Palustris minor* Ray hist. 146. klein Steinfarn / in sumpfigen Orten. perenn. Ic. J. B. 3. p. 731.

Filix saxatilis ramosa, *nigris maculis notata*. s. *Filix saxatilis Mas*, an den Bürgeln der Bäume und andern schattigten Orten und Steinfelsen. Ic. Clus. hist. CCXII. perenn.

Gallium album latifolium T. s. *Mollugo montana latifolia*, flore albo simpl. campaniformi diviso. Großstern Megerkraut / auf den Wiesen und in den Zäunen. Cailletait ou Mouquet. Ic. 1. Tab. p. 434.

Gallium album minus, *floribus ex albo & purpureo mixtis* s. *Rubeola* T. klein weiß Megerkraut / in trockenen grasichten Orten. Ic. 4. Tab. 433.

Gallium album palustre, *floribus albis campaniform.* s. *Cruciata palustris alba*. T. weiß Megerkraut / weiß Wallstroh / auf denen Wiesen und andern Orten.

Gallium luteum T. s. verum, unser Frauen Bettstrau / gelb Meger-Kraut / in denen Zäunen und Reinen der Aecker. Cailletait jaune. Ic. 1. Tab. p. 432.

Gallium sylvaticum majus ramosum,
floro

flore albo simplici, companiformi foliis stellatim positis f. *Gallium montanum latifolium ramosum* T. Falsch Waldmeister/ in Hölzern. Ic. 2. Tab. p. 434.

Genista humilis sagittalis, herbaceo flore luteo papilioneco f. *Chamaespartium* T. fleis neddrassende Psilmen/ Erpsfrimmen/ auf trocknen grassichten Orten. Icon. 2. Tab. p. 1512.

Genista tinctoria germanica. T. folio non terno, kleine Färber. Psilmen/ Genster/ auff den Rändern der Wiesen / und andern trocknen Orten. Ic. 6. Tab. p. 1510. Genet.

Geranium Cicutæ folio minus & supinum, T. flore rubro simpl. rosaceo. Storchenschnabel/ in Feldern und an den Strassen. Bec de Grue. Ic. 3. Tab. p. 123.

Idem flore lacteo, quod *Geranium arvense* alb. Tab. Ic. 4. p. 173.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium T. f. *Gramen harundinaceum paniculat.* Tab. groß Wasserried. Gras/ in stillstehenden Wassern. Ic. 2. Tab. p. 525.

Gramen batrachioides folio aconiti, f. 2d. minus Clus. hist. XCIX. Ic. 6. Tab. p. 124.

Idem flore albo lineis cæruleis variegato.

Idem flore albo.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum f. aquat. spicatum Lobel. vel *Gramen spicat.*

spicat. aquatic. spica cylindracea brevi T. f. Glet. sicht Wasser. Gras. Icon. Tab. 2. p. 530.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica vel Anatum Tragi f. *Gramen paniculatum aquaticum fluitans* T. Endien. Gras/ in stillstehenden Wassern. Ic. Tab. 1. p. 530.

Gramen aquaticum junceum folio articulato f. *Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis* T. in stillstehenden Wasserbächen. Ic. 1. Tab. p. 529.

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. T. Hafer. Gras/ in Bergichten Hölzern. Ic. 17. Tab. p. 519.

Gramen avenaceum panicula sparsa locustis majoribus & cristatis. T. f. *Festuca avenacea sterilis elatior*, Hafer. Zwalch/ an denen Wegen und unter der Sommer. Saat. Ic. 1. Tab. p. 544.

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus T. f. *Festuca graminea, glumis hirsutis*, Treff/ Zwalch/ an denen Rändern der Frucht. Aecker. Ic. 2. Tab. p. 544.

Gramen Caninum arvense f. *Gramen loliaceum radice repente*, f. *Officinarum* T. Queckengras/ Taub. Korn/ Hunds. Gras/ Chien dent. fast aller Orten. Ic. 5. Tab. p. 516.

Gramen Canin. longius radiculatum majus f. *Gramen paniculatum latifol. radice repente crassiore* T. groß Quecken. Gras.

Idem minus.

Gramen Cyperoides panicula sparsa ma-

majus f. *Cyperus vulgarior panicula sparsa* T. Groß-
Cypren. Gras / in Gräben und Teichen. Icon. 6.
Tab. p. 533.

Gramen Cyperoides latifolium, spicis tereti-
bus erectis T. longis. auf feuchten Wiesen und in
Gräben. Icon. Lob. 11. cujus nomen palustre
majus.

Gramen Cyperoides palustre majus, spi-
ca divisa, vel *Cyperinum palustre minus* Ic.
4. Tab. p. 533. klein wasser Cyper. Gras.

Gramen Cyperoides minus panicula
sparsa nigricante. f. *Cyperus minimus panicula*
sparsa nigricante. T. Klein Kted. Gras / auf den Wie-
sen. Ic. 4. Tab. p. 533.

*Gramen Cyperoides polystachyon lanu-
ginosum* T. in Weinbergen und an den Enden der
Acker.

*Gramen hirsutum angustifolium mi-
nus paniculis albis*, f. *Juncus angustifolius villo-
sus*, floribus albis paniculatis, T. in Wäldern.

*Gramen junceum folio articulato syl-
vaticum* f. *Juncus nemorosus folio articulofo* T.
Wingen. Gras. Ic. Tab. p. 535.

Gramen junceum spicatum, s. *Juncago*
palustris & *vulgaris*. T. auf trocknen Wiesen neben
den Wegen. Icon. 4. Tab. p. 535.

Gramen nodosum avenacea panicula T. s. bul-
bosum nodosum. Icon. Lob. & C. B. Theatr.
bot. p. 1. pag. 18. Knoten. Gras / auf feuchten
Ackern.

Gra-

*Gramen pratense paniculatum majus folio la-
tiore* T. spica fere arundinacea. Neugras auf
allen Wiesen. Icon. 2. Tab. p. 515.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum
T. potius minimum s. vulgatissimum, roth
Straßen. Gras / an allen Wegen. Icon. 15. &
16. Tab. p. 519.

Idem album, weiß Straßen. Gras.

Gramen pratense paniculatum medium T. s.
secundum Dod. auf den Wiesen. Icon. Bauh.
Theatr. bot. p. 1. p. 30.

Gramen tremulum majus, aut *Lepo-
rinum* f. *Gramen paniculatum majus*, locustis ma-
gnis candicantibus tremulis T. Zitter. oder Haasen-
Gras / auf denen Wiesen. Amourettes tremblen-
tes. Ic. Tab. p. 541.

Gramen tremulum minus, panicula
parva, radice rufescente repente f. *Gramen pa-
niculatum locustis parvis tremulis*, T. Klein Zitter-
Gras. Icon. C. B. Prodr. p. 4.

Gratiola centauroides, floribus mo-
nopetalis dilute purpurascens f. *Digi-
talis minima*, *Gratiola dicta* T. Gottes Gnade,
Purgier. Kraut. wild Aurt. Herbe à pauvre ho-
me perenn. Moris. Hist. Oxon. p. 2. 479.

Eadem flore prorsus albo.

Helenium vulgare, flore luteo com-
posito radiato, folio integro lato incano. s.
Aster omnium maximus Helenium dictus, T. Alant.

F

Wur-

Wurzel/ auff feuchten Wiesen. Aunée ou Enule Campan. perenn.

Helleborine angustifolia palustris T. flore herbaceo nonnihil candicante polypetalo. wild Nießkraut/ auff feuchten Wiesen bey Wäldern. Elleborine. Ic. 3. Clus. hist. p. 273. perenn.

Helleborine flore rotundo s. *Calceolus marianus* T. folio latiore nervoso, Marien-Schüchlein / in bergichten Orten. Icon. 1. Clus. hist. pag. 272. Sabor ou Soulier de notre Dame. perenn.

Helleborine montana angustifolia flore purpurascens T. wild schmahlblättrichte Nießwurzel / in bergichten Orten. Ic. 1. Tab. p. 109. perenn.

Helleborine flore albo T. s. *montana latifolia*, flore albo. wilde weisse Nießwurzel/ bey der vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 1100. perenn.

Hieracium asperum majore flore T. s. *Cichorium montanum angustifolium*, hirsutic asperum. Icon. 9. Tab. pag. 493. perenn. sub nomin. Hierac. Intybac. asper. in bergichten Orten.

Hieracium dentis leonis folio monoclono subasperum s. *Hieracium Intybaceum* T. perenn. Icon. Tab. 6. p. 492. an denen Ketten grasichter Orten.

Hieracium majus erectum angustifolium caule levi T. flore luteo composito semi flosculo s. *Hieracium majus Dioscorid.* Icon. 1. Tab.

Tab. pag. 491. auff den Wiesen und brachliegenden Feldern. Grande Cichoree ou jaune. perenn.

Hyoscyamus vulgaris foetidus & niger T. caule folioque piloso, flosculis monopetalis infundibuliform. luteis striatis alba radice. Wilsen-Kraut / hin und wieder an denen Straßen. Jusquiame, noir. Icon. 1. Tab. p. 968. perenn.

Hypericum vulgare T. foliis glabris. caule rotundo, floribus rosaceis luteis. Sanct. Johannis-Kraut / auff ungebauten Feldern/ und in denen Hecken. Mille pertuis. Icon. 1. Tab. pag. 1249. perenn.

Hypericum bifolium glabrum non perforatum, caule quadrangulo subrubro, flosculis luteis minoribus. s. *Hypericum ascyron dictum*, caule quadrangulo. T. in Püschchen und an feuchten Orten. Icon. 4. Tab. p. 1250. perenn.

Hypericum foliis latioribus atrovirentibus C. Sch. Johannis-Kraut/ mit dunkel-grünen breiten Blättern / in ausgestockten Hölzern und andern Orten. perenn.

Hypericum minus erectum T. klein Johannis-Kraut / auff den Rechen und andern grasichten Hügel. perenn. Icon. J. B. 3. 383.

Hypericum minus repens supinum, foliis glabris s. *Hypericum minus supinum glabrum*. T. klein niedrig kriechend Sanct. Johannis-Kraut / Clus. hist. CLXXXI perenn.

Hyslopifolia s. *Gratiola minor*, foliis polygoni, pallide virentibus, alternatim dispositis. F 2 spo.

Ipositis & *pediculis* carentibus, floribus elegantior coeruleis rosaceis s. *Salicaria hyssopifolia folio latiore*. T. Graß. Polen / in feuchten Orten. Icon. C. B. prodr. p. 108. perenn.

Hyssopus vulgaris flore monopetalo coeruleo labiato. s. *Hyssopus officinarum coerulea spicata*. T. Zopf / in Gärten und auf den Kirchhöfen. Hisepe. Icon. 1. Tab. pag. 751. perenn.

Jacobaea vulgaris laciniata T. flore luteo radiato. Sancti Jacobi. Blum. Jacobée ou herbe de St. Jacques. Icon. Tab. p. 485. perenn. hin und wieder an den Straßen.

Jacobaea vulgaris altissima, foliis *Erucae Artemisiæ*ve similibus & æmulis s. *Jacobaea vulgaris, foliis instar erucæ laciniatis* T. in Weinbergen / und auf den Reinen der Aecker hoher Berge. Prioris est varietas.

Imperatoria major T. flore rosaceo albo umbellato, folio latiore diviso, radice crassa odorata. Meister. Wurzel / in bergichten Wäldern / und in Gärten. Imperatoire ou Otruche. Ic. 1. Tab. p. 238. perenn.

Juncellus inutilis s. *Chamaeschænos*. s. *Scirpus omnium minimus capitulo brevior*. T. Mosch. bingen / in sumpfsichten Wasserlöchern. perenn.

Juncellus minimus capitulis equiseti s. *Scirpus omnium minimus capitulo longiori* T. an den Rändern der Pfützen. perenn.

Juncus capitulis equiseti major, radice geniculata serpente s. *Scirpus Equiseti capitulo major*.

majori. T. Schachtelbingen / in sumpfsichten Orten. Icon. C. B. Theatr. bot. p. 186. perenn.

Juncus capitulis equiseti minor, & fluitans, s. *Scirpus equiseti capitulo minori*. T. beyne vorhergehenden / kleine kolblechtrige Wasser. Bingen. perenn.

Juncus floridus major paludofus, floribus subpurpureis, folio gramineo triangulati. s. *Butomus flore roseo*. T. Cyper. oder Purpur. Schwertel / an den Reinen der Wasser. Junc. fleuri. Icon. 6. Tab. p. 567. perenn.

Juncus vulgaris. s. *Levis major*, panicula sparsa T. rufescente. Bingen in sumpfsichten Orten. Icon. C. B. Theatr. bot. 182. perenn.

Juncus levis panicula non sparsa T. s. glomerato flore, caule striato. wiesen Bingen. Ic. 2. Tab. p. 565. perenn.

Juncus s. *Scirpus medius vel sylvaticus* Tab. Wald. Bingen. Icon. 3. C. B. Th. bot. p. 181. perenn.

Juniperus vulgaris arbor T. flore viridi amentaceo. Wachholderbaum / hin und wieder in denen Daurhöfen und Gärten. Icon. 2. Tab. p. 1538. Grand Genevriér.

Juniperus vulgaris fruticosa T. flore amentaceo viridi, foliis angustis acuminatis pungentibus. Wachholder. Straude. Genevriér. in trocknen sandigen Orten. Ic. 1. Tab. p. 1557. perenn.

Lactuca montana vel sylvatica coerulea major s. *Chondrilla major sonchifolio*, flore purpurascente major T. composit. semifloscul.

in Bergichten Wäldern. Condrille rouge, perenn.
Icon. J. B. 2. p. 100.

Eadem minor. T. bey der vorhergehenden.

Lactuca sativa T. non capitata flore luteo composito. gemeiner Eattich. Icon. 1. Tab. p. 805. *Laique non pommée*, in Gärten und Gärtners, Feldern. ann.

Lactuca sativa capitata. T. s. sessilis. Kopf-Eattich / *Laique pommée*, bey der vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 806. ann.

Lactuca maculosa T. fusci ac veluti purpurei coloris, brauner oder Forellen-Eattich / *Laique tacheté*. ann.

Lactuca crispa laciniata T. non capitata, krauser Salat. Icon. 3. Tab. p. 806. ann. *Laique frisé*.

Lactuca crispa altera vel Sabaudica crispa, Ger. Endivien, Eattich. Icon. 4. Tab. p. 806. ann.

Lactuca dulcis Romana longa. T. s. *Lactuca folio obscurius virente*, semine nigro. brauner Sommer, Endivien / florentiner Salat. *Laique Romaine*. ann.

Lactuca foliis Endivie. T. s. Intybacea. Tab. Icon. 4. p. 806. weiser Sommer, Endivien / Eattich. ann.

Lactuca folio oblongo acuto. T. s. valde angusto oblongoque folio, spitzer Eattich / Icon. C. B. prodr. p. 60. ann.

Lactuca Italica laciniata. C. Bp. p. 60. *Laique*

Laique Royale. zarter Endivien Eattich. ann. alle hin und wieder auff den Gärtners, Feldern.

Lampsana Dodonæi T. Soncho affinis lampfana domestica floribus luteis compositis, foliis ut plurimum in lacinias divisus, alias Sonchus sylvaticus. Tab. Ic. 8. p. 500. *Wald-Sonchen, Kraut.* perenn.

Lapathum folio acuto crispo T. floribus apetalis, Grind-Wurzel / spitziger krauser Ampfer / auff denen Wiesen. Icon. 3. Tab. p. 823. perenn.

Lapathum folio acuto plano T. flore stamineo spicato s. *Lapathum officinarum.* Grinde oder Enden-Wurzel / auf den Wiesen. *Patience ou Parelle.* Icon. 2. Tab. p. 823. perenn.

Lapathum folio acuto rubente. T. s. *Lapathum sanguineum*, Sanguis Draconis herba dictum, Drachen-Ampfer / hin und wieder in Felder und Gärten. Sang. de Dragon, ou *Patience rouge.* Icon. Tab. p. 824. perenn.

Lapathum hortense semine non spinoso, florib. apetal. f. *Spinacia vulgaris*, capsula seminis non aculeata. T. Spinat. Epinars. Icon. 2. Tab. p. 809. ann.

Lapathum hortense, semine spinoso s. *Spinacia vulgaris*, capsula seminis aculeat. T. Spinat. Dinessch. Icon. 1. Tab. p. 809. ann.

Lapathum hortense sterile s. *Spinacia vulgaris sterilis.* T. Spinat. ann.

Lathyrus sylvestris major. T. s. dumetorum, flore suave rubente papilionaceo. F 4 *Wald.*

Wald, Bienen / in denen Hecken. Icon. 4. Tab. p. 885. perenn.

Lenticula palustris major, Commelin. foliis superne viridibus inferne rubentibus facile fragilibus, in denen Gräben.

Lenticula palustris quadrifolia CB. aliàs. *Hedera palustris* T. Wasser. Klee / in stillstehenden Teichen. 4. feuilles d'eau. Ic. 2. Tab. p. 890. ann.

Lenticula trifulca CB. s. *Hederula aquatica*. Lob Wasser. Ephen / in fließenden frischen Wasserbächeln. Lierre d'eau. ann. Ic. J. B. 3 786.

Lenticula vulgaris C. B. s. *Muscus palustris*, *lenticula folio*. Meers Wasser / oder Endien. Linsen. Lentille d'eau. Ic. 1. Tab. p. 890. ann.

Lilium montanum, floribus reflexis rubentibus. T. s. *Martagon sylvaticum* radice flava, floribus reflexis tetrapetalis. Goldwurz in bergischen Wäldern. Ic. 4. Tab. p. 1029. perenn.

Lilium montanum, floribus reflexis albis non punctatis. T. Goldwurz mit weißen Blumen. perenn.

Linaria annua minima, foliis hirsutis, floribus obsoleti fusci coloris, monopetalis personatis s. *Antirrhinum arvense minus* aut. *Linaria pumila vulgatio* arvensis. T. klein Feld. Dranc auff den Feldern. Icon. 4. Tab. pag. 1236. ann.

Linaria folioso capitulo lutea major. s. *Conyza linariae folio* T. auff sandtgen bergichten Hügel. Icon. 3. Tab. p. 1202. perenn.

Linaria

Linaria vulgaris lutea flore majore T. *Linaria commune*. gemein Glachs. Kraut. Icon. J. B. 3. 456.

Linaria vulgaris flore pallido rectu aureo. T. Lein. oder Glachs. Kraut / mit bleich. gelben Blumen. auff aufgeworffenen Gräben. *Linaria*. Icon. 1. Tab. p. 1208. perenn.

Linum sativum T. s. *vulgare caeruleum* flore rosaceo. zahmer Glachs auff den Feldern. *Linum*. Icon. Tab. p. 1205. ann.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens. wilder Glachs / mit röthlichen Blumen / auff trocknen grasichten Orten. *Linum sauvage*. Icon. 2. Tab. p. 1207. ann.

Lithospermum arvense, radice rubra, flore monopetalo albo infundibuliformi diviso. s. *Buglossum arvense annuum*, *Lithospermum folio*. T. wilder Stein. oder Meer. Hirsen / in denen Sam. Feldern. Ic. 3. Tab. p. 233. Gremil. ann.

Lithospermum majus erectum. T. s. *Milium solis*. Wald. Hirsen / in hölkern und andern ungebauten Orten. Herbe aux perles. Icon. Tab. p. 1234. perenn.

Lunaria minor, rutaceo folio, floribus carens. s. *Osmunda foliis lunatis*. T. Mond. Kraut. *Lunaria*. Icon. Tab. p. 413. perenn.

Lupinus sylvestris flore luteo T. floribus papilionaceis, foliis digitatis & stellatis. Wicken. Bohnen / Lupinen. *Lupinus*. Icon. 3. Tab. p. 881. ann.

F 5

Lych-

Lychnis segetalis major glabra, foliis perfoliata, floribus rubris rosaceis. f. *Lychnis segetum rubra*, foliis perfoliata. r. *Vaccaria didicta*. Rühfraut / Indweich / in denen Sommerfeldern. Icon. 3. Tab. p. 1253. ann.

Lychnis segetalis major hirsuta annua, pseudomelanthium dicta, flore rosaceo rubescente. f. *Lychnis segetum major*. r. Kaden Korn / Nagelblumen / in denen Frucht Aekern. Ic. 5. Tab. p. 674. ann.

Lychnis sylvestris angustifolia, caliculis turgidis striatis. r. folio incano. wilde Himmelröslein / mit gestreiften Häußlein und schmahlen Blättern. Moris. hist. 2. foliis angustioribus dignoscitur ab aliis. Passe fleur. perenn.

Lychnis sylvestris latifolia, caliculis turgidis striatis r. foliis hirsutis, breite blätterichte Himelröslein / mit gestreiften Häußlein. Icon. Tab. p. 675. perenn.

Lychnis sylvestris noctiflora f. *Lychnis noctiflora* r. wilde Nacht Marien Röslein. Icon. Camer. sub nomine ocimoides nocti florum. ann.

Luteola herba salicis folio r. integro, luteo flore polypetalo anomalo. Streich Kraut / auf dem aufgeworffenen Grund. Gande ou herbe jaune. Icon. Tab. p. 319. perenn.

Malva sylvestris, flore majore monopetalo campaniformi purpureo, venis saturate purpureis picto, folio sinuato. s. *Mal-*

Malva vulgaris folio sinuato flore majore. r. Rüse oder Hasen Papellen / mit gestreiften purpur. rothen Blumen / auf ungebauten fetten Orten. Icon. Tab. p. 1150. Mauve. Ic. Fuchs. hist. perenn.

Malva sylvestris minor repens, folio rotundo, flore albo minore. s. *Malva vulgaris flore minore folio rotundo*. r. Gänse Papellen an denen Wegen. Petite mauve. Icon. 2. Tab. p. 1156. perenn.

Malva sylvestris perennis altissima, folio cannabino, flore purpureo amplo, monopetalo campaniformi. s. *Alcea vulgaris major*. r. Stigmars Wurk / Fellsch / an denen Strassen. Alceé Mauve sauvage. Icon. 1. Tab. p. 1155. perenn.

Eadem foliis rotundis laciniatis. r. s. *Alcea foliis imis rotundioribus parum crenatis, superioribus vero profunde sectis*. Fellsch / unien mit runden Blättern. perenn.

Melampyrum cristatum, flore purpureo & albo r. monopetalo personato, rictu luteo Rüh Waißen / in denen Frucht Aekern. Blé noir ou de Vache. Ic. 5. J.B. 3. 440

Melampyrum coma caerulea. r. Blaugelb / Tag und Nacht in Wäldern. Ic. 1. Tab. p. 553. ann.

Melampyrum coma purpurascens, r. flore vario monopetalo personato, Wachtel oder Rüh Waißen / in denen Frucht Aekern. ann.

Melampyrum sylvaticum, flore luteo mono-

monopetalo personato, folio latiore s. *Melampyrum luteum latifolium* T. Wald. Hirse / in bergichten Wäldern / Ic. 1. Tab. p. 555. ann.

Melampyrum sylvaticum, luteum angustifolium. Wald. Hirse / mit schmalen Blättern / bey dem vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 555. ann.

Melilotus major odorata violacea T. flore papilionaceo s. Lotus hortensis odora. Siebenzeit / mit blauen Blumen auff grasichten Orten. Lotier bleu. Ic. Tab. p. 896. perenn.

Melilotus officinar. T. flore luteo papilionaceo. Melilot. Stein. Klee. perenn. Icon. Tab. p. 895.

Eadem flore albo.

Melo rotundus parvus T. s. saccharinus Tab. Melon sucré. Zucker. Melonen. ann. Icon. 3. Tab. p. 856.

Melo vulgaris T. flore monopetalo campaniformi. Melonen. Melon. Icon. 1. Tab. p. 855. hin und wieder in Gärten und Feldern. ann.

Melo reticulatus T. Neg. Melon. Ic. J. B. 2. 244.

Mentha sylvestris rotundior folio T. s. Menthastrum folio rugoso rotundior. flore monopetalo labiato spicato, odore gravi. wilde Mönke, Menthe sauvage. Icon. Tab. 729. an feuchten Orten.

Eadem purpureo flore.

Mentha sylvestris longior folio T. s. Menthastrum

thastrum spicatum, folio longiore candicante hirsuto, floribus subpurpurei coloris spicatis. Neg. Mönke. Icon. Fuchs. H. Pl. ut & Matth. epit. p. 489. bey dem vorhergehenden. perenn.

Millefolium aquaticum s. Viola aquatica caule nudo & cavo, aliàs Foeniculum aquaticum 2d. Tab. flosculis rosaceis subpurpurascens. Wasser. Weissen. Icon. 2. Tab. p. 186. Millefeuille d'eau. perenn.

Millefolium aquaticum flosculis albis ad foliorum nodos cruciformibus s. Potamogeton flosculis ad foliorum nodos. Wasser. Sengel. Icon. Clus. hist. CCLII. sub nomin. Myriophyll. aquat. perenn.

Millefolium aquaticum, cornutum Casp. & Joh. B. gehört Wasser. Garben. Kraut. Icon. Tab. 8. p. 188. perenn.

Millefolium aquaticum lenticulatum s. Lentibularia flore luteo galericulato aliàs, *Feniculum aquaticum galericulatum*. T. Wasser. Helmkraut / in finstern stillstehenden Wasserlöchern. ann. Icon. Rivin. Introd. in rem herbar.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum, flore purpurascens cruciformi spicato. s. *Potamogeton foliis pennatis*. T. Feder. Sengel / in stillstehenden Wassern. Icon. 7. Tab. p. 181. perenn.

Millefolium palustre s. Foeniculum aquaticum umbellatum capillaceo brevique folio

folio CB. p. Wasser, Fenchel. Icon. 1. Tab. p. 186. perenn.

Myagrū foetid. quod i. in prodr. CB. foliis pallide virent. flore pallide luteo cruciform. capsul. orbiculat. stinckender Eeindotter/ an denen aufgeworffenen Gräben. Myagrū pūant. Tabul. 1. lit. a.

Myagrū monospermum caule hirsuto, foliis ad radicem asperis, filiqua rotunda, flore cruciformi s. *Rapistrum arvense folio auriculato*. T. Rübsen / in denen Frucht. Aeckern / zwischen der Saat. Ic. CB. prodr. p. 52. sub nomine myagr. simil. filiqua rot. ann.

Myagrū sativum flore cruciform. & semine majore, foliis minus cinereis s. *Alyssum segetum, foliis auriculatis acutis*. T. Eein. oder Glachs. Dotter / in Glachsstückern. Myagrū. Ic. 1. Tab. p. 1252.

Myrrhis sylvestris seminibus asperis, flosculis albis rosaceis umbellatis caule hirsuto. s. *Charophyllum sylvestre seminibus brevibus hirsutis*. T. an denen Zäunen. Cigue. ann.

Myrrhis annua nodosa, semine aspero s. *Charophyllum sylvestre alterum geniculis tumentibus*. Ic. Moris. H. R. Bles. ann.

Nasturtium hortense crispum latifolium. T. flore albo simplici cruciformi. Krauser groß-blättrichter Garten-Kresse / Spanischer Kresse. Cresfon. Icon. CB. prod. p. 44. ann.

Nasturtium hortense crispum angustifolium. T. krauser



trauser schmahlbättrichter Garten- Kresse. Icon. 4.
Tab. p. 842. ann.

Nasturtium hortense vulgatum r. floribus al-
bis cruciform. gemeiner Garten- Kresse. Cresson
Alenois. Icon. 1. Tab. p. 841. ann.

Nasturtium filiculosum annuum, sylve-
stre verrucosum, foliis coronopi, flosculis al-
bis cruciform. s. *Nasturtium sylvestre capsulis*
cristatis. r. Feld- Kresse / an denen Wegen und an-
dern ungebauten Orten. Icon. 4. Tab. p. 302.
ann.

Nasturtium sylvestre tenuiter incisum, fructu
minori r. s. *Nasturtium sylvestre osyridis* fo-
lio, floribus alb. cruciform. foliis dissectis vel
Thlaspi angustifol. Fuchs. Icon. Tab. 16. p.
853. ann.

Nummularia major lutea, flore mono-
petalo rotato f. *Lysimachia humifusa*, folio rotun-
diore r. Pfennig- Kraut / Igel- Kraut / in feuchten
Wiesen. Ic. 3. Tab. p. 1261. perenn. Nummu-
laire.

Nymphaea major, flore albo rosaceo,
folio subrotundo. f. *Nymphaea alba major* r.
Herr- Wurzel / weisse See- oder Wasser- Lilien. Ne-
nufar blanc, ou Lis d'Etang. Icon. 1. Tab. pag.
1117. perenn.

Nymphaea lutea major r. gelbe See- Blu-
men. Nenufar jaune. Icon. 3. Tab. p. 1118. pe-
renn.

Nymphaea alba minima C. B. flore al-
bo

bo tripetalo folio asari s. Morsus ranae Tab.
Froschbiß / in Wassern. Icon. p. 1131. perenn.

Oenanthe aquatica T. radice bulbosa; flo-
sculis albis rosaceis umbellatis s. Filipendu-
la aquatica. Wassersteinbrech / Wasser-Kraut / in
feuchten Gräben. Icon. 1. Tab. p. 421. perenn
Petite perle.

Oenanthe aquatica bulbulis carens s.
Filipendula aquatica non bulbosa. Wasserstein-
brech / beyhm vorigen / in feuchten Gräben. Icon. Lob.
perenn.

Ophioglossum vulgatum T. s. officinar. flo-
ribus carens Matter Zünglein. Langue de serpent.
Icon. Tab. p. 1232. perenn.

Orchis muscam referens major T. folio læ-
viore, flore grandiusculo. grosse Mücken prä-
sentirend. Stendel. Wurzel / in ausgestockten Höl-
zern / und anderen trocknen grasichten Orten. Icon.
2. Tab. pag. 1050. Orchis semblent une grande
mouche.

Orchis muscae corpus referens minor T. galea
& alis herbidis. klein Fliegenstendel. Wurzel / in
trocknen Orten. Icon. 1. Tab. p. 1050. Orchis
semblent une petite mouche.

Orchis muscam referens lutea T. gelb Stendel.
Wurzel. Ic. 1. Tab. p. 1050. Orchis à mouche
jaune. perenn.

Orobanchè radice dentata albicante
major, floribus subpurpureis hirsutis, mo-
nopetalis personatis. Anblatum flore ex rufo
can-

candicante s. Anblatum Cordi T. Ohnblate Schup-
pen. Wurzel / St. Georgen. Wurzel / in duncklen
bergichten Orten. Icon. Tab. p. 1231. Oroban-
che avec la racine dentelé. perenn.

Orobanchè major caryophyllum olens T. flo-
re & caule luteo fusco. Orobanchè. Ervens
Wurzel / Sommer. Wurzel. Icon. Tab. 1062.
unter denen Erbsen und anderen Orten mehr. Oro-
banchè à un agreable senteur. perenn.

Orobis sylvaticus, foliis oblongis. T. & ner-
vosus, flosculis rubentib. papilonac. radice
tuberosa. grosse Waldwicken. Orobe. Astraga-
loid. J. B. 2. 334.

Papaver argemone dictum, capitulo bre-
viore hirsuto ac rotundo, flore purpureo ro-
saceo. s. *Papaver erratic. capite oblongo hispido*. T.
in denen Frucht. Acker. Ic. 1. Tab. p. 83. ann.

Papaver argemone dictum, capitulo
longiore spinoso, flore purpureo rosaceo s.
Papaver erraticum capite longiore. T. Argemo-
nien. Köpfelein / in denen Sand. Feldern. Icon. 2.
Tab. p. 83. ann.

Papaver erratic. majus T. flore puniceo
rosaceo. rothe Korn. oder Klapper. Rosen. Pavos
rouge ou Coquelicoq. Icon. 1. Tab. p. 966. ann.

Papaver erraticum minus. T. fleiner wilder
Mohn / auf steinichten Aekern. Petite coquelicoq.
Icon. 2. Tab. p. 966. ann.

Idem foliis non dissectis T.

Parietaria vulgaris s. officinarum T. flore her-
baceo apetalò, folio hirsuto, Glas. Kraut / in
schat-

schattichen Drien und Mauren. Parietaire. Icon. Tab. p. 939. ann.

Pastinaca latifolia sativa T. florib. luteis Pasteney oder Pest. Nügel / in den Gärtnern. Feldern. Panais ou Pastenade. Icon. 1. Tab. p. 198. ann.

Pastinaca sylvestris latifolia T. floribus luteis rosaceis umbellatis albis, foliis latioribus dissectis. wilde Pastinacke. Pastenade ou Panais sauvage. Icon. 2. Tab. p. 198. ann.

Pastinaca sylvestris tenuifolia, puncta in medio rubra s. *Daucus officinar.* T. vel vulgaris, flosculis rosaceis albis umbellatis. Vogel-nest / wilde Möhren / auf den Wiesen. Carotte sauvage. Icon. Tab. p. 195. perenn.

Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea, floribus rosaceis umbellatis s. *Daucus sativus radice lutea*. T. gelbe Möhren oder Ruben. Carotte jaune. Icon. 1. Tab. p. 192. ann.

Eadem radice alba. T. weisse Möhren oder Pest. Nügel. Carotte blanc. ann.

Pastinaca tenuifolia sativa, atro rubente radice s. *Daucus sativus radice atrorubente*. T. rothe Ruben / oder Ranan. Icon. 2. Tab. p. 192. Carotte rouge. ann.

Pepo s. Melo pepo compressus. T. sive non multo major rotunda, flore luteo campaniformi monopetalo. Psaffen-Hütlein. Icon. 6. Tab. p. 857. ann.

Pepo oblongus T. s. major oblong. vel maximus oblong. Tab. grosse gemeine lange Kürbisen / hin und wieder auf den Gärtnern Feldern. Icon. 8. Tab. 857.

Pepo

Pepo vulgaris. T. s. Cucurbita foliis asperis, flore luteo monopetal. campanif. grosser runder Kürbis / mit gelben Blumen und rauhen Blättern. Courge.

Peucedanum germanicum T. flore luteo rosaceo umbellato, foliis angustissimis divis. Sausenichel / Haarstrang. Queue de pourceau ou Fenouil de porc. Icon. 1. Tab. p. 163. perenn.

Phaseolus vulgaris T. s. Smilax hortensis flore papilionaceo, foliis ternis ex uno pediculo caules scandente, absque capreolis. Haricot ou Fevrolles. Bessche. Bohnen. Icon. Tab. p. 876. ann.

Pro coloris varietate, plures sunt species. uti ex praxi videre est. ann.

Polygala vulgaris major, flore anomalo coerulesco monopetalo personato, folio longo angusto. s. *Polygala major* T. Acker-Biolle oder Kreuz-Blumen. Ic. 2. p. 1212. hin und wieder auff trockenen Wiesen. perenn.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpureo.

Polygala vulgaris T. s. *Polygala coerulesca* Tab. gemeine blaue Kreuz-Blumen.

Eadem alba.

Eadem purpurea.

Polygonum angustissimum & acutum vel gramineo folio, minus repens s. *Alchimilla supina* gramineo folio, flore minore T. *Polygonum minus polycarpum* Tab. Ic. p. 1215. St. Johannis-Blut / auf umgebaute trockenen Erdrich. perenn.

G 2

Poly-

Polygonum gramineo folio majus erectum f. minus alterum Tab. vel *Alchimilla erecta* gramineo folio, minore flore T. kleiner Wegtritt. Ic. Tab. p. 1217. perenn.

Polygonum minus f. *Herniaria glabra* T. vel officinarum repens, flosculis apetalis staminibus luteis. Bruch- oder Harn-Kraut/ in sandigen feuchten Orten. Ic. Tab. p. 1219. *Herniole* ou *Turquette* perenn.

Polygonum minus f. *Herniaria hirsuta* T. prioris est varietas.

Potamogeton folio rotundiore lato, flore cruciformi spicato purpureo f. *Potamogeton rotundifolium* T. Sam-Kraut/ in Teichen und andern stillstehenden Wassern. Epideau. Icon. 1. Tab. 1117. perenn.

Potamogeton foliis latis splendentibus T. s. *Potamogeton* aquis immersum, folio pelucido late oblongo atque acuto. Samkraut/ mit breiten Blättern/ beyhm vorhergehenden. Ic. J.B. 3. 778. perenn.

Potamogeton foliis crispis f. *Lactuca ranarum* T. Froeschlattich. Ic. Clus. hist. CCLII. perenn.

Pyrola rotundifolia major T. flore viridi rosaceo, folio rotundo crenato. Apfel-Wintergrün / Waldmangold / in feuchten Wäldern/ Pyrole. Ic. Tab. p. 1139. perenn.

Pyrola folio mucronato serrato T. Birn-Wintergrün.

tergrün. Clus. hist. sub nomin. secund. tene-rior. CXVII. perenn.

Quinquefolium erectum flore luteo rosaceo, foliis profunde sectis, subtus argenteis, f. *Quinquefolium folio argenteo* T. groß Fünfffinger-Kraut. Quinte feuille, auff durren auffgeworfenen Hügel. Ic. Tab. p. 351. perenn.

Quinquefolium palustre rubrum, foliis superne viridibus, inferne cinereis ferratis, floribus purpureis rosaceis, f. *Pentaphylloides palustre rubrum* T. Wasser-Fünfffinger-Kraut. Quinte feuille rouge. Icon. 12. Tab. 354. perenn.

Quinquefolium sylvaticum procumbens, flore luteo rosaceo, folio dissecto, *Tormentilla sylvestris* T. Ruhr- Wurzel. Tormentille. Ic. Tab. p. 360. perenn.

Ranunculus palustris folio serrato T. vel *Ranunculus lanceatus serratus* Tab. Wasser-Nahnen-Fuß / in fließenden Wassern. perenn. Ic. 19. Tab. p. 112.

Rapa sativa oblonga T. s. *Rapa longa* flore cruciformi luteo. lange Winter-Rübe/ auff denen Gärtners Feldern. Rave. Icon. Tab. p. 791. ann.

Idem & minus. Aetne Stoppel-Rüben.

Rapum sativum orbiculatum majus, grosse Scheib-Ruben / beyhm vorhergehenden. Icon. Tab. 3. p. 790.

Idem & minus. kleine Scheib- oder Früh-Rüblein. Icon. Tab. 4. p. 791. ann.

Rapa sativa rotunda radice candida t. s. *Rapum vulgare*. Tab. Icon. 1. p. 790. gemeine Runde Ruben. ann. Rave commune.

Rapunculus nemorosus, angustifolius parvo flore, coerulesco monopetalo campaniformi. s. *Campanula nemorosa angustifolia* parvo flore t. Wald. Rapunkel. Icon. 7. Tab. p. 795. perenn.

Reseda vulgaris t. flore rosaceo subluceo. Feld. Rauchen / an denen Wegen und Straßen. Resede. Icon. Tab. p. 320. perenn.

Rosmarinus spontaneus folio latiore t. s. Fruticosus coronarius ignobilior, floribus monopetalis labiatis subcoeruleis, foliis latioribus oblongis atro virentibus, subtus incanis, wilder Rosmarin, Romarin sauvage, perenn. in Gärten.

Rosmarinus hortensis angustiore folio t. Garten Rosmarin. Romarin. Ic. Tab. p. 311. perenn.

Rubcola vel Rubia arvensis parva repens, flore purpureo campaniformi. s. *Aparine supina pumila* flore coerulesco t. In denen Korn, Feldern. ann. Icon. J. B. 3. 719.

Rubia pratensis erecta quadrifolia latifolia laevis, floribus albis monopetalis campaniform. foliis acutis, caule quadrato rufescente gemulato, semine subaspero rotundo. s. *Cruciata alpina latifolia laevis*. T. Groß Stern Meger. Kraut / in Wäldern und Büschen, perenn. Ic. J. B. 3. 716.

Rubia

Rubia Tinctorum sativa t. flore albo campaniformi diviso, foliis stellatis, radice rubra, Färber. Røthe. Garance. Icon. 1. Tab. p. 1178. ann.

Rubia sylvestris monspessulana major t. floribus luteis, foliis asperis. Wilde Färber. Røth. Ic. 2. Tab. p. 118. perenn.

Ruta canina f. *Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris*. t. flore monopetalo labiato purpureo, folio dissecto. Ruë des Chiens. Hunds. Raute / in sandigen Orten am Rheinstrom. Icon. Tab. p. 412. perenn.

Sagitta aquatica major, folio latiore, flore rosaceo albicante. f. *Ranunculus palustris folio sagittato maximo* t. Groß Pfeil. Kraut / in stillen Wassern. Queue d'aronelle. Icon. 1. Tab. p. 1121. perenn.

Sagitta aquatica minor latifolia f. *Ranunculus palustris, folio sagittato minore*. t. Klein Pfeil. Kraut / beyh vorhergehenden. Icon. 2. Tab. p. 1121. perenn.

Sagitta aquatica minor, angustifolia f. *Ranunculus palustris, folio sagittato angustiore* t. gar klein Pfeil. Kraut. Icon. 3. Tab. pag. 1121. perenn.

Salvia major an sphacelus Theophrasti t. flore monopet. labiat. purpur. grosse oder breite Salbey. Icon. 1. Tab. 760. Grande Sauge. perenn.

Salvia major, foliis ex luteo & viridi
G 4 varic-

variegatis H.R.P. gemahlte oder Froschen-Salbey.
Sauge Franche, perenn.

Salvia minor aurita & non aurita T. Edel
oder spitzer Salbey / Creutz-Salbey. Icon. 2. Tab.
761. Petite Sauge. perenn.

Samolus Valerandi T. f. *Anagallis aqua-*
tica, folio rotundo non crenato, flori-
bus albis rotatis multifidis, pediculis longis
insidentibus in feuchten sumpfichten Orten.

Sambucus vulgar. fructu in umbella nigra T.
flore albo monopetalo rotato diviso, foliis
alatis. gemeiner Holderbaum. Sureau. Icon. 1.
Tab. p. 1440.

Sambucus, fructu in umbella viridi T. s. fru-
ctu albo. Holderbaum mit weissen Beeren / hin und
wieder in denen Höfen.

Saponaria major lævis, flore exalbido
purpurascente rosaceo, folio glabro s. *Lychnis*
sylvestris, qua *saponaria vulgo*. T. Seiffen-
Kraut / hin und wieder an denen Strassen. Sapo-
naire. Icon. Tab. p. 1115. perenn.

Saponaria s. *Lychnis sylvestris* purpu-
rea, staminibus violaceis nigris ac amplis,
nondum descripta. An verschiedenen Orten in Hes-
sen. perenn.

Scabiosa capitulo globoso T. foliis in minutis-
simas lacinas divisiss. *Scabiosa tenuifolia*,
flore coeruleo, composito flosculoso. Apo-
stem. Kraut / auf trocknen grasichten Orten. Sca-
biouse. Ic. 21. Tab. p. 445. perenn.

Scab-

Scabiosa folio integro hirsuto glabro T. *Succisa*
dicta, flore purpureo composito radice præ-
morsa. Teufels Abbiss. Succise Morsure, du diable.
Icon. Tab. p. 452. perenn.

Succisa folio integro glabro flore coeruleo. T.

Scorzonera angustifolia, floribus com-
positis subcoeruleis. s. *Scorzonera angustifolia*
subcoerulea T. aut elatior 4. Clus. hist. schmahl-
blättrichte Scorzonner / mit blaulichten Blumen / in
Gärten und Feldern. Scorzonaire. ann.

Scorzonera humilis latifolia nervosa. T. s. Pan-
nonica Tab. floribus composit. semistofcu-
los. luteis. breitblättrichte Scorzonera / in Gärten.
Icon. 2. Tab. p. 995. Scorzonaire. perenn.

Scorzonera humilis angustifolia T. s. Panoni-
ca 3. Clus. hist. schmahl. blättrichte Scorzonera.
Icon. 6. Tab. p. 996. perenn.

Scorzonera laciniatis foliis T. *Tragopogon*
pratense laciniatum, flore composito luteo
pallido majus. Bocksbart / Habermarg / mit groß-
sen gelben Blumen auf den Wiesen. Barbe de bouc,
Icon. 1. Tab. p. 994. perenn.

Scorzonera latifolia sinuata T. s. major Hi-
spanica 1. Clus. hist. gemeine Scorzonera / in
Gärten und Gärtners Feldern. Icon. 5. Tab. p.
996. Scorzonaire. perenn.

Scrophularia aquatica major T. foliis beto-
nicæ, flore monopetalo anomalo, subpur-
pureo auriculato, radice fibrosa s. *Betonica*
G 5 Tab.

Tab. Icon. p. 934. Scrophulaire, Braunnurzel/
mit Betonien, Blättern / an denen feuchten Orten
und Wassern. perenn.

Scrophularia palustris non fetida s. aquatica
minor r. vel foemina Matth. Icon. p. 867. weisse
Braunnurzel / an den Wasser, Gräben. perenn.

Scrophularia perennis radice nodosa al-
ba foetida, flore monopetalo subpurpureo
auriculato. s. *Scrophularia nodosa fetida*. T.
Braunnurzel / an feuchten Orten. Icon. Tab. p.
930. Scrophulaire. perenn.

Secale hybernum majus T. flore stamineo
folio graminis. Roggen oder Korn. Seigle. Icon.
Tab. 586. ann.

Secale vernum vel minus T. s. aestivum
Dod. descript. Sommer, Roggen. ann.

Securidaca dumetorum major, flore
vario, papilionaceo, siliquis articulatis. s.
Coronilla herbacea, flore vario. T. Purpur, braune
Peltischen/Vogelwicken. Ic. 4. Tab. p. 902. peren.

Sedum minus teretifolium album T. flore al-
bo rosaceo, folio longiusculo. weisse Rachen-
Träublein / auff alten Zäckern und Mauern. Icon.
2. Tab. p. 1226. perenn.

Sedum minimum luteum non acre, T. flo-
sculis luteis, foliis vermiculatis insipidis s.
Sempervivum minus vermiculatum insipi-
dum, ungeschmackte kleine Rachen-Träublein / oder
Mauer, Pfeffer / auff alten Mauern und steinichten
Aeckern. perenn. J. B. 3. 695.

Sedum

Sedum minus, flore luteo folio acuto
f. *Sedum minus luteum, folio acuto*. T. kleine gelbe
Rachen-Träublein / auff steinichten brachliegenden
Feldern. Triguemadame. Ic. 1. Tab. p. 1226.

Sedum parvum acre vel causticum,
flosculis luteis, foliis vermiculatis acris.
f. *Sedum parvum acre, flore luteo* T. Rachen-Träub-
lein / auff steinichten ungebauten Aeckern. Pain de
Oyseau. Ic. 3. Tab. p. 1225. perenn.

Sedum palustre, flore rubente, calice
subrubro, succulento foliolo longiusculo
subhirsuto f. *Sedum palustre subhirsutum*. T. Reth-
sumpfigte Rachen-Träublein / in feuchten Orten.
Ic. Clus. Hist. LX. perenn.

Sedum parvum montan. luteum f. *Se-*
dum minus vj. f. *Alpinum* 1. Clus. Hist. LX.
Bergkachen-Träublein. perenn.

Serpillum vulgare majus repens, flore purpu-
reo T. monopetalo labiato, Feld-Quendel/ oder
Kümmel / auff durren Hügeln. Serpolet. Icon. 4.
Tab. & 5. p. 749. perenn.

Idem flore albo.

Serpillum minus f. *Vulgare repens*, Clus.
Hist. Ic. 7. p. 748. kleiner Feld-Quendel.

Solanum vesicarium f. *Alkekengi offic-*
nar. T. repens, flore candido monopetalo
rotato, diviso, bacca rubra. Juden-Kirschen/
Schlitten / in Weinbergen und andern Orten mehr.
Coqueret ou Alkekenge. Ic. Tab. p. 976. peren.

Solanum vesicarium, foliis moschum
olea-

olentibus. Wohlrüchender Nachtschatten. *An nova species, vel differentia hac aut odor non à loco natali qui in dumetis umbrosus est, dependeat, ulterius considerandum relinquo.*

Sonchus asper laciniatus, folio dentis leonis, f. *Sonchus laciniatus spinosus*, folio dissecto. Sau. Distel mit eingeschnittenen Blättern. Icon. Tab. I. p. 494. ann.

Sonchus asper non laciniatus t. flosculis compositis luteis, foliis in ambitu non dissectis, caule fistuloso. Gänse- oder Sau- Distel. Laitron. in denen Gärten und Kraut-Feldern. Ic. I. Tab. p. 498. ann.

Sparganium ramosum t. flore staminea, in globulum digesto albo, fructu echinato, folio, gramineo triangulari. Igels- Knospen/ Kiedegraß/ Degene Kraut. Sparganium. Icon. I. Tab. p. 559. in sumpfsichten Oreen und Weihern. perenn.

Sparganium non ramosum t. beyhm vorhergehenden. Icon. Joh. B. 2. 541. perenn.

Sparganium minimum t. Icon. J. B. p. 2. 541. perenn.

Sphondylium vulgare, foliis hirsutis t. s. Branca urtina flosculis albis rosaceis. Wären- Tag/ auff den Wiesen. Berce. Icon. Tab. p. 280. perenn.

Idem floribus purpureis. t. perenn.

Stachys palustris foetida, flore monopetalo verticillato labiato purpureo. s. Galeopsis

leopsis palustris betonica folio, flore variegato. t. Brunnenvasser Andorn/ in feuchten Gräben. Ic. 3. Tab. p. 767.

Stachascitrina angustifolia. t. s. *Elichrysum angustifolium*, floribus monopetalis, foliis incanis. Rhein- Blumen/ Ragenpfölein/ Zimmerschön. Immorſelle ou Amarante jaune. Ic. I. Tab. p. 778.

Stoechas citrina latifolia s. *Elichrysum latifolium*. Zimmerschön. Immortelle à feuilles larges. Icon. 3. Tab. p. 778.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, flore albo rosaceo s. *Tamariscus Germanica* t. Tamariscen / hin und wieder auf denen Sandbäncken in dem Rhein. Icon. I. Tab. p. 1354. Tamaris.

Thalictrum majus florum staminibus purpurascens. s. *Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata*. t. Wiesen Raute / auf grasichten Heyden. Icon. I. Tab. p. 120. Rue des prez. perenn.

Thymus vulgaris folio latiore t. flore monopetalo candicante verticillato labiato. Thymian / in Gärten. Thim. ann.

Idem folio tenuiore. gemeiner Thymian / beyhm vorhergehenden. Icon. Tab. p. 742.

Tithymalus characias rubens germanicus C. B. s. *Tertius austriacus* Clus. Hist. Wolsfmilch. Tithymale. perenn.

Tithymalus characias angustifolius. s. Myrsinites tertius angustifol. Tab. p. 988. Perenn. Tithy.

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. floribus monopetalis campaniform. globosis divis. Icon. 12. Tab. p. 990. perenn.

Tithymalus foliis pini, forte *Dioscoridis Pityula* s. *Cupressinus* 1. Tab. p. 990. perenn.

Tithymalus foliis rotundis non crenatis T. s. *Esula* rotunda vel *Peplus* Tab. p. 993. runde Wolfsmilch / in Gärten / Neben / und Zäunen. ann.

Tithymalus myrsinites angustifolius T. s. secundus Tab. Myrten Wolfsmilch. Icon. 8. Tab. p. 989. auff durren Wenden. perenn.

Tithymalus helioscopius T. vel *solis equus*, foliis majoribus, subrotundis crenatis vel *Esula* solis equa. Sonnenwendende Wolfsmilch. Icon. 11. Tab. p. 990.

Tithymalus myrsinites fructu verrucæ simili T. s. verrucosus. Warzen Wolfsmilch. Ic. J. B. 3. p. 671. perenn.

Tithymalus myrsinites latifolius T. s. legitimus Clus. breitblättriche Myrten Wolfsmilch. Ic. 7. Tab. p. 989. perenn.

Tithymalus palustris fruticosus. f. *Esula* palustr. grosse Wolfsmilch / in sumpfigen Orten. Ic. 1. Tab. p. 987. perenn.

Tithymalus sylvaticus, lunato flore T. toto anno folia retinens, immergrünende Wolfsmilch. Ic. J. B. 3. 673. in Wäldern. perenn.

Tribuloides vulgare aquis innascens T. flore fæco articause fructu subrotundo aculeato s. *Tri-*

Tribulus aquaticus C. B. weisse Wasseroder Stachel-Nüsse Jesutter-Mäusen / in stillstehenden Wässern.

Tragopogon purpureo coeruleum porrifolio T. vulgo *Artifi. Dock*. Hart oder Artseifen / mit schmalen Blättern und Purpur-blauen Blumen / in Gärten und Gärtnersfeldern. *Artifi.* Icon. 2. Tab. p. 994. ann.

Trifolium arvense echinatum, fructu minore, flore lut. papilion. s. *Medica echinata hirsuta* T. hin und wieder / an rauhen grasigten Orten. Klein-Zgeltlee.

Trifolium arvense humile spicatum f. *Lagopus* T. flore papilionaceo spicato. Raßen-Pfötlein / auff sandigen Feldern. *Pied de Lievre.* Icon. Tab. p. 908. perenn.

Trifolium falcatum aut *cornutum* f. *Trifolium filiqua cornuta & falcata*. T. aliàs *Lens major repens*, grosse kriechende Linsen / hin und wieder auff durren grasigten Orten. Icon. 3. Tab. p. 888. Luserne. perenn.

Trifolium montanum purpureum majus T. folio & spica brevior. Rother Berg-Klee / in Bergichten Wäldern. Ic. Clus. Hist. p. CCXLV. perenn.

Idem minus.

Trifolium montanum spica longissima rubente T. f. *Trifolium purpureum majus*, folio & spica longiore. J. B. 2. 375. grosser Berg-Klee. perenn.

Trifolium spicatum, spica subrotunda rubra T. 3.

t. s. *Lagopus maximus* spica purpurea, folio & facie trifolii pratensis, grosser Hasenflees in Hölhern. Pied de Lievre. ann.

Triticum hybernum spicis carens t. floribus apetalis stamineis. Winter. Watzen. Froment ou Blé d'hyver. Icon. 1. p. 597. ann.

Triticum aristis longioribus, spica alba. t. Welscher oder gepaarter Watzen. Ic. Tab. p. 597. & Theatr. Bot. C. Bauh. p. 374. Blé loca. ann.

Triticum trimestre f. *Aestivum*, spica longiore crassiore, aristis hord. similibus granis magis rotundis C. B. p. Blé de Mars. Sommer. Watzen. ann.

Triticum typhinum, simplici folliculo t. f. 4. Tab. p. 598. Welscher Watzen. Blé barbu. ann.

Veronica aquatica angustiore folio t. f. Anagallis aquatica angustifolia scutellata, flore coeruleo monopetalo rotato diviso. schmalblättrichte Bachungen/ in Brunnen. Wassern. Ic. vid. Icon. J. B. 3. 791. ann.

Veronica aquatica major folio subrotundo t. flore monopetalo coeruleo rotato, f. Beccabunga officinar., Bachung/ in feuchten Orten. Beccabunge. Ic. 4. Tab. p. 1094. perenn.

Eadem minor. Klein Bachung. Ic. 1. Tab. p. 1094.

Veronica aquatica major, folio oblongo. t. flore coeruleo f. Beccabunga folio oblongo major grosse langblättrichte Bachung. Ic. 3. Tab. p. 1094. perenn.

Vera-

Veronica aquatica minor, folio oblongo, flore purpurascence, f. Beccabunga minor folio oblongo. Klein Bachung/ mit Polley. Blättern Ic. 2. Tab. p. 1094. perenn.

Vicia annua sylvestris major, flosculis papilionaceis purpureis, siliqua subfusca folio rotundiore acuto s. *Vicia sepium* folio rotundiore acuto, semine nigro t. Sommer. Saatwicken / in denen Frucht. Feldern. Icon. 1. Clus. Hist. p. CCXXXV.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris s. *Aphaca* Lobel. t. florib. luteis papilionaceis. gelbe Wicken / in fetten Weizen. und Korn. Aeckern. Icon. 3. Tab. p. 1092. ann.

Vicia sativa vulgaris semine nigro t. flore papilionaceo foliis pinnatis. Feld. Wicken / Tauben. Wicken / in denen Aeckern. ann.

Eadem alba/

Viola lunaria major siliqua oblonga flore cruciformi purpureo s. *Lunaria major* siliqua longiore t. Mondveil / Silber. Platt / Bulbonac. in Bergen/ Ic. 2. Tab. p. 696. perenn.

Viola montana alba grandiflora t. flosculo polypetalo albo, grosse weisse Berg. Viole. Violette de Montagne. perenn.

Viola montana coerulea grandiflora H. R. P. s. *Melanium montan.* Lugd. 1204. blaue Berg. Viole.

Viola montana tricolor, flore variegato. t. bunte Berg. Viole.

H

Viola

Viola montana lutea grandiflora. T. s. *Viola montana* 3. aliud genus Clus. hist. 310. gelbe Berg. Viole.

Virga aurea angustifolia ferrata flore luteo radiato, s. Jacobaea alpina foliis longioribus ferratis T. Heydnisch Wundt Kraut. Icon. 4. Tab. p. 946. perenn.

Virga aurea angustifolia minus ferrata, s. Virga aurea vulgaris latifolia & officinar. Steingünsel / auff steinigten umgebauten Orten. Verge d'orée. perenn. Icon. J. B. 2. 1062.

Virga aurea latifolia ferrata T. folio, hirsuto. breitblättricht gekerbt Heydnisch Wundt Kraut / in bergichten Wäldern. Ic. Tab. 1260. perenn.

MENSIS

JVLIVS & AVGVSTVS.

Absinthium ponticum f. Romanum officinar. T. folio latiore, floribus luteis flosculosis, f. Absinthium vulgare majus. Gemeiner Wermuth. Absinte ordinaire. Ic. 1. Tab. p. 1. perenn.

Alsine scandens baccifera, f. repens major Clus. geniculata, floribus caryophyllæis herbaceo candidis, baccis nigris, radice fibrosa alba longa f. *Cucubalus*. T. in trocknen Buschichten Wäldern und Hecken / Busch-Hünerdarm. perenn. Ic. J. B. 2. 175.

Alsine palustris rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus, binis ex aduerso nascent-

Tab. II. lit. c. pag. 115.



g. g. Seipel. sc.



nascentibus, flosculis virescentibus rosaceis
f. *Portulaca aquatica* Ger. Emac. Wasser. Bur-
hel/ in sumpffichten Orten. perenn. Tabul. II. lit. b.

Alfne palustris minor serpillifolia T. cauli-
culo nodoso reflexo, foliis serpilli similibus
flosculis albis parvis coeruleis rosac. in feuch-
ten Orten. Bocc. rar. plant. 48. perenn.

Alfne palustris minor, folio oblongo
repens, flosculis parvis racemi modo junctis
albis rosaceis. Auf sandigem und tieffichtem Erd-
reich / zwischen dem Wasser. C. B. prodr. pag.
118. ann. Tabul. II. lit. c.

Alfne palustris tenuissimis foliis. f. *Sa-
xifraga palustris alfinifolia* Ger. Emac. Ray.
hist. 1032. in sandigem feuchten Boden. ann.

Angelica sativa, floribus luteis rosa-
ceis umbellatis foliis saturate viridibus dis-
sectis. s. *Imperatoria sativa* T. Angelique, oder
Engelwurk / Angelique. Leon. 1. Tab. p. 230. in
Gärten und Bauren. Höfen. ann.

Angelica sylvestris major, floribus al-
bis rosaceis umbellatis, foliis latioribus dis-
sectis f. *Imperatoria pratensis major*. T. wilde An-
gelique / auff feuchten Wiesen und andern dunckel-
nassen Orten. Ic. 2. Tab. 230. Angelique sau-
ge. ann.

Anisum semine majori, flosculis alb.
rosaceis umbellatis, foliis imis integris sub-
rotundis, in ambitu nonnihil serratis, su-
perioribus vero profunde dissectis. s. *Apium*

anissum dictum semine suaveolente majore T. Anisß
in Gärtners Feldern. Anis. Ic. Tab. p. 171. ann.

Idem *semine minori* T. gemeiner Anisß.

Apium hortense s. *Petroselinum* T. foliis la-
tis dissectis, floribus rosaceis albis, Peterlein.
Perfil. Icon. 1. Tab. p. 264. ann.

Idem *crispum* s. *multifolium* Tab. Ic.
2. Tab. p. 264. ann.

*Apium aliis Sium maximum latifoli-
um*, floribus albis rosaceis umbellatis s. *Sium
latifolium*. T. Wasser. Peterlein / in Wasser. Grä-
ben. Berle. Icon. 2. Tab. p. 202. perenn.

Apium montanum, folio ampliore. T. petro-
solino simili, flosculis albis rosac. umbellat.
radice alba, succo lacteo turgente sive *Oreo-
selinum* Clus. hist. Berg. oder Hirschpeterlein/
Hirsch. Eppich / in bergichten Orten. Perfil de Mon-
tagne. Icon. 1. Tab. p. 276. perenn.

Apium palustre paludapium dictum s.
Apium officinar. T. flosculis albis rosaceis um-
bellatis. Wasser. Eppich / in sumpfsichten Orten. Ic.
1. Tab. p. 276.

Apium sylvestre lacteo succo turgens,
flosculis albis rosac. umbell. radice nigra s.
Thysselinum Plin. T. Officinis Olsnitium. Delsi-
nis. Wurzel / in feuchten und schattichten Orten.
Icon. Lobel 711. perenn.

Aristolochia longa vera T. floribus luteis
monopetalis tubulatis s. *Longa* 1. Clus. hist.

Ari-

Aristolochie longue. lange Osterlucen. Ic. 2. Tab.
p. 1141. perenn.

Aster atticus, flore purpureo coeruleo
composito radiato. s. *Aster atticus coeruleus*. T.
Blaustern. Kraut. / in Gärten. Icon. 1. Tab. p.
716. perenn.

Aster canadensis annuus flore papposo
H. R. P. s. *Virga aurea virginiana annua* Zanon.
205. T. potius *Conyza thyrsoides* floribus mi-
nutis ramosa. hin und wieder an durren Orten.

Aster luteus, foliolis ad florem rigi-
dis, foliis per caulem sparsis, mollibus la-
nuginosis candicantibus, vel *Atticus legiti-
mus* s. 1. Clus. hist. Massilioticus Tab. s.
Asteriscus annuus, foliolis ad florem rigidis. T.
Stern. Kraut / Icon. Tab. p. 1245. bey Wäl-
dern am Rheinstrom. perenn.

Aster luteus, hirsuto salicis folio, flore
composito. s. *Quintus Clusij* Hist. plant. in
bergichten Wäldern / und sonst hin und wieder am
Rheinstrom. Icon. 3. Tab. p. 717. perenn.

Aster luteus major foliis succisæ s. 3. Au-
striacus 1. Clus. hist. in Bergen und Wäldern.

Atriplex angustifolia laciniata minor. s.
Chenopodium angustifolium minus laciniatum. T.
Icon. Joh. B. 2. 972. ann.

Atriplex, angusto oblongo folio T. floribus
pallide virentibus stamineis s. *Atriplex vul-
garis cum folliculis* J. B. 2. 973. Melde / hin und
wieder bey Mist. Stätten und aufgeworffenen Grä-
ben. ann.

H 3

Atri-

Atriplex hortensis alba f. pallide vi-
rens, flore stamineo subluteo, foliis latis pin-
guibus mucronatis, weisse Melde. Arroche, Bon-
nes Dames. in denen Kraut-Aeckern. ann.

Atriplex hortensis rubra T. f. folio rubro
rothe Garten-Melde/ hin und wieder in Gärten. Ic.
1. Tab. p. 810. Arroche rouge. ann.

Atriplex sylvestris foetida f. *Chenopodium*
foetidum T. Stinckende Melde. Ic. Tab. p. 812.
an denen Wegen der Mauren. ann.

Atriplex sylvestris folio sinuato satu-
rate virente, spica rubra f. *Chenopodium folio*
laciniato, coma purpurascens T. wilde Melde an de-
nen feuchten Wasser, Gräben und mistigen Orten.
Patte d'oye. Ic. 1. Tab. p. 810. ann.

Atriplex sylvestris latifolia, folio sinua-
to, saturate virente, spica virente f. *Chenopodium folio*
laciniato, coma virente, T. wilde
Melde/ bey der vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 812.
ann.

Atriplex sylvestris latifolia, folio acu-
tiore & ramosiore, f. *Chenopodium Pes anseri-*
nus 2dus Tab. T. Gänse-Fuß / Schweins, Fode. Ic.
Tab. p. 812. ann.

Atriplex sylvestris folio sinuato can-
dicante f. *Chenopodium folio sinuato candicante* T.
hin und wieder bey Mist, Stätten und Aeckern. Ic.
2. Tab. p. 810. ann.

Atriplex sylvestris, Polyspermum di-
ctum.

ctum, f. *Chenopodium betafolio*. T. Icon. Tab. p.
1219. Bléte sauvage. ann.

Bardana major, flore composito flo-
sculoso purpureo folio latiore integro f. *Lap-*
pa major Arctium Dioscoridis T. grosse Kletten/
Erindwurk/ an denen Wegen. Bardane ou Glette-
ron. Ic. 1. Tab. p. 1157. perenn.

Bardana minor, floribus stamineis flo-
sculosis foliis sinuatis f. *Xanthium* T. kleine Klet-
ten, Bettlers, Laufe/ hin und wieder an denen Stras-
sen. Petit Gletteron. Icon. Matth. epit. p. 926.
ann.

Bellis lutea arvensis, floribus compositis
radiatis, foliis profunde incisissimis major, f.
Chrysanthemum folio minus secto glauco, T. vel Se-
getum Lob. Ic. 552. Gold-Blume unter dem Ge-
traide/ Streich-Blumen. ann.

Bistorta major radice magis intorta. T. folio
integro, flore stamineo incarnato spicato
diviso. Natterwurk/ auff feuchten Wiesen. Bistorte.
Icon. 1. Tab. p. 82. perenn.

Bistorta major, radice minus intorta T. foliis
rugiosioribus. Ic. J. B. 3. 538. bey der vorher-
gehenden. perenn.

Blattaria folio oblongo laciniato. T. flore lu-
teo monopetalo rotato, staminulis purpu-
reis, in sandigen Orten. Ic. 5. Tab. p. 959. Her-
be aux mites Blattaire. Schaben, Kraut. ann.

Blitum rubrum majus rectum T. f. Sponta-
neum, flore stamineo spicato rubente, hin

und wieder in Gärten/ rother Meyer. Ic. 1. Tab. p. 827. Blete rouge. ann.

Idem minus T. vel supin. Lob. Ic. Matth. epit. p. 235. ann.

Blitum album majus T. folio subalbido. Blete blanc, weisser Meyer/ in denen Kraut-Aeckern. Icon. 2. Tab. p. 817. ann.

Blitum album minus s. *sylvestre spicatum* T. weiser kleiner / oder spitziger Meyer. Icon. Fuchs. hist. plant. & Matth. epit. p. 237. Blete sauvage. fast aller Orten. ann.

Blitum sylvestre spicatum T. s. *Blitum rubrum minus* Camer. Epit. 235. kleiner rother Meyer / auf feuchten sandigen Orten. ann. Icon. J. B. 2. 967.

Blitum sylvestre spicatum foliis ex albo & viridi variegatis T. subrotundis s. *Blitum album minus*. J. B. 2. 967. gefleckter Meyer / hin und wieder an Mauern und Gärten. ann.

Brunella coerulea flore magno T. monopetalo labiato folio non laciniato. Braunelle/ mit grossen Blumen/ an denen Hügel und Bergen. Brunelle. Icon. 1. Tab. p. 944. perenn.

Brunella folio laciniato T. flore magno purpureo, grosse Braunelle / auf Wiesen und anderen grasigten Orten. Icon. 2. Tab. p. 944. perenn.

Bulbocastanum majus, folio apij T. floribus albis rosaceis umbellatis. Erd. Nüss / Erd. Castanien / auf den Aeckern. Terre noix. Icon. 1. Tab. p. 422. perenn.

Buph-

Bupthalmum Tanacetii minoris folio T. flo-
sculis compositis luteis radiatis s. *Chamaemelum chrysanthemum* Fuchs. Hist. plant. Ochsen / Aug / auff den Wiesen und andern grasigten Orten. Oeil de boeuf. Icon. Matth. epit. p. 651. perenn.

Bupleurum perenne, folio rigido. T. lato integro, flosculis luteis rosaceis umbellatis, Hasen Dohrlein / mit breiten Blättern auff steinigten Bergigten Orten. Icon. 1. Tab. pag. 1258. perenn.

Bupleurum folio subrotundo s. *vulgatissimum* T. umbella lutea. Schmahlblättrichte Hasenohrlein / an denen Rändern der Weinberge. Ic. 2. Tab. p. 1258. perenn.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum T. s. *Perfoliata arvensis* annua, flosculis subluteis umbellatis rosac. Durchwachs / in Aeckern und Gärten. Icon. 1. Tab. p. 1140. Perce feuille. ann.

Calamintha arvensis verticillata T. floribus monopetalis labiatis, foliis hirsutis, an wärschichten Orten. Icon. 1. Tab. p. 737. Pouillot ou Calamente sauvage. Ackermüng. perenn.

Calamintha pulegii odore s. *Nepeta* T. flore minore foliis maculatis s. *Calamintha arvensis* 2d. Tab. Ic. p. 736. Ackermüng. ann.

Calamintha vulgaris vel officinar. Germanic. T. flore magno, foliis pulegii s. *Calamintha*
H 5 vul-

vulgaris montana. Bergmünke. Ic. 1. Tab. p. 733. auff Bergen. Calamente. perenn.

Campanula vulgarior foliis Urticae, seu major & asperior t. flore monopetalo coeruleo campaniformi, quandoque & albo, radice alba nodosa. Zapffen-Kraut/ Hals-Kraut/ grosse Baum-Glocken. Icon. 2. Tab. p. 797. Campanule ou Gands nôtre Dame. perenn.

Campanula pratensis, flore conglomerato t. monopetalo coeruleo campaniformi, klein Hals-Kraut / auff den Wiesen. Icon. 3. p. 796. perenn.

Cannabina aquatica, folio tripartito diviso, flore minus pulchro flosculoso s. *Bidens foliis tripartito divisis* t. Wasser-Dosten/ Foken, Jgel. Icon. 2. Tab. p. 336. Eupatoire bâlard.

Cannabina aquatica, folio non diviso, flore luteo pulchriore odorato s. *Bidens folio non dissecto*. t. Icon. 2/ Tab. p. 336. Wasser-Dosten. perenn.

Carduus arvensis, in avena proveniens repens, aut Vinearum lævicaulis, flore purpureo composito flosculoso, folio sonchi. s. *Cirsium arvense sonchi folio, radice repente flore purpurascente*. t. Haber, oder Acker-Distel in Haber-Feldern. Chardon aux asnes. Icon. Tab. p. 1079. perenn.

Carduus lanceolatus latifolius, flore purpureo t. flosculoso, capitulo majore. Speera Distel/

Distel/ an denen Wegen und Strassen. Ic. Tab. p. 1078. ann.

Idem flore albo.

Carduus Marianus, l. albis maculis notatus t. vel vulgaris, folio ima parte albido lanuginoso, superne viridi, flore purpureo. Märiten-Distel/ hin und wieder auff dem ausgeworffenem Unrath der Gärten. Chardon de nôtre Dame ou Artichaut sauvage. Ic. Tab. p. 1078. ann.

Carduus nutans. t. capitulo magno singulari pendente, flore purpureo suaveolente, tota stirpe spinosus. Stechende Distel mit hangenden Köpfen/ an denen Wegen und Strassen. perenn.

Idem flore albo.

Carduus palustris, capitulo viscoso, foliis atrovirentibus crispis ac sinuosis, per marginem rarioribus spinis cinctis l. *Cirsium pratense polycephalon vulgare*. t. auf den Wiesen/ bey Wäldern. perenn.

Carduus pratensis asphodeli radice latifolius, s. *Cirsium pratense asphodeli radice latifolium* T. Auf feuchten Wiesen Ic. 4. Tab. p. 436. perenn.

Carduus pratensis latifolius flore ex luteo pallente, foliis tenuibus laciniatis s. *Cnicus pratensis Acanthi folio, flore flavescente* T. Wiesen-Kohl/ Wiesen-Distel perenn. auf feuchten Wiesen.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris,

garis, caule crispo, capitulis minoribus purpureis, quandoque & albis s. *Carduus caule crispo* T. Weg-Distel Ic. 1. Tab. p. 1080. an denen Wegen und aufgeworffnen Gräben. ann.

Carduus Stellatus T. foliis papaveris erratici, flore intense purpureo & albo. Stern-Distel auf trocknen Orten. Chardon étoilé. Ic. 2. Tab. p. 1080. perenn.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris T. flore purpureo s. *Acanthium vulgare* flore purpureo & albo. Weg-Distel/ mit Purpurfarbenen Blumen an dörren Orten und an den Straßsen. Chardon commun ou Epine rouge. Icon. 1. Tab. p. 1063. ann.

Carlina acaulos magno flore T. f. radiato sessili. Weiße Ebers. Wurzel. Carline ou Cameleon blanc. Icon. 1. Tab. 1068. auff den Gebürgen. perenn.

Carlina aculos, minore purpureo flore f. *Cirsium acaulos flore purpureo*. T. Kleine Ebers. wurzel/ auff dörren grasichten Orten. Icon. Clus. Hist. CLVI. perenn.

Carlina caulescens, magno flore purpureo T. f. *Chamaeleon albus vulgaris*, Clus. hist. gemeine Ebers. wurz/ auf den Gebürgen. Ic. 2. Tab. p. 1068. Carline noir. perenn.

Carthamus f. *Cnicus sativus* T. flore luteo composito. Safflor/ wilder Saffran/ Safran bâtard ou Graine de perroquet. in denen Feldern. Ic. Clus. Hist. CLII. sub nomin. *Caici vulgaris*. Caryo-

Caryophyllus minimus muralis f. *Lychnis annua minima flore caryophylleo carneo lineis purpureis distincto*. T. zwischen den Steinlein auff sandigen Boden/ bey fließenden Wassern. Ic. Joh. Bauh. 3. 338. ann.

Caucalis arvensis echinata magno flore T. albo rosaceo umbellato; foliis profundius incisis vel dissectis. Kletten. Körfel/ auf brachliegenden sandigen Aeckern. *Caucalis*. Ic. 1. Tab. 290. ann.

Caucalis vulgaris semine aspero, flosculis rubentibus f. *Daucus annuus minor floribus rubentibus* T. an den Zäunen. ann. Ic. J. B. 3. part. 2. 83. sub nomin. Anthrisc.

Eadem flore albo.

Centaurium minus T. flore purpureo monopetalo infundibuliformi diviso. Tausendgülden-Kraut/ auf trocknen Wiesen. Petite Centaurée. ann. Ic. 1. Tab. p. 1166.

Idem flore albo T.

Centaurium luteum perfoliatum T. parvum flore flavo Clus. hist. Gelb Tausendgülden. ann. Ic. 4. Tab. p. 1166.

Cicuta major T. f. vulgaris, flore albo rosaceo umbellato, caule maculoso & non maculoso Schirling/Doll. Kraut in denen Hecken und Zäunen. Cigue Ic. 1. Tab. p. 1170. ann.

Cicuta minor Petroselino similis T. flore albo rosac. umbell. Hundst. oder Bleich Peterlehn. Ic. Tab. p. 273. ann.

Cireca

Circaea solanifolia dicta major, flore dipetalo, petalis bifidis f. *Circaea Lutetiana* T. Circée in feuchten schattichten Büschen / Wald Kleppen Lob. Ic. p. 266. perenn.

Circaea solanifolia alpina minor T. *Circaea minima* T. Bey der vorhergehenden. perenn.

Clematitis sylvestris latifolia dentata, flore rosaceo albo, f. *Clematitis sylvestris latifolia* T. Breit. blättrichter Gänse. Werd / Wald. Neben oder Eichen in Zäunen und Hecken. Herbe aux gueux. Ic. 2. Tab. p. 1289. perenn.

Clematitis sylvestris latifolia, foliis non incis T. s. folio integro. Wald. Neben. Ic. J. B. 2. 226.

Clematis, s. flammula repens T. s. *Clematis* vel *Flammula scandens tenuifolia*, flore albo rosaceo. Eichen in denen Zäunen / Ic. 1. Tab. p. 1273. perenn.

Clinopodium arvense ocyimi facie T. acinos multis, flore monopetalo purpureo verticillato labiato. Ic. 2. Tab. p. 737. Sietn. Polen auf sandigen Aekern. Basilic sauvage. ann.

Clinopodium majus origano simile, flore monopetalo purpureo labiato. s. *Clinopodium origano simile elatius majore folio* T. Wir. bel. Dost / plante de bonne odeur. Ic. 1. Tab. p. 736.

Cnicus sylvestris hirsutior seu Carduus Benedictus T. flore composito flosculoso luteo Cardebenedicten. Chardon benit. Auf denen Gärtners Feldern. ann. Idem

Idem flore albo. perenn.

Cnicus sylvestris spinosior, flore composito luteo s. *Carlina sylvestris vulgaris* T. Drei. Distel / auf dürrem Erdreich Ic. Tab. p. 1076. ann.

Convolvulus minor hederulae folio scandens, flore apetalo, semine triangulo s. *Fagopyrum vulgare scandens* T. Buch. oder Schwarzwinde / auf ungebauten Feldern / Blé noir Ic. Tab. p. 1264. ann.

Cuminum pratense, s. *Carum vulgare*, flosculis albis rosaceis umbellatis, foliis profunde dissectis ac tenuioribus. s. *Carvi* T. Wiesen. Kümmel auf dürrer Wiesen. Carvi Ic. Tab. p. 142. ann.

Cuscuta major T. flore monopetalo campaniformi, ex rubro pallescente, Seiden- oder Glachs. Kraut / an trocknen Orten in den Hecken. Ic. Tab. p. 1302. ann.

Cuscuta minor T. Klein Glachs. Kraut / Thüm. Seiden. Ic. Tab. 743. ann.

Daucus alsaticus, floribus subluteis rosaceis, umbella parva s. *Oreoselinum pratense cicutae folio* T. radice oblonga gelber Vogels. Nest / auf feuchten Wiesen. Ic. C. B. prod. 77.

Daucus montanus apii folio major, floribus alb. rosac. umbellat. alias *Cervaria nigra* s. *Oreoselinum apii folio majus* T. schwarze Hirsch. Wurzel auf den Bergen Persil de montagne Ic. 3. Tab. p. 313.

Dictamnus

Dictamnus albus, flore purpureo polypetalo, foliis pinnatis subrotundis. s. *Franklinella* Ic. Tab. p. 1159. perenn. weißer Dittam auf Bergen.

Digitalis folio virescente latiore, flore monopetal. anomalo tubulato magno luteo patulo, radice incurva fibrosa s. *Digitalis lutea magno flore* T. groß Finger Hütlein. Kraut/in bergichten Wäldern. Digitale jaune. Ic. T. 960. perenn.

Digitalis purpurea T. folio aspero. Große rothe Finger. Hütlein. Digitale rouge. Ic. Tab. p. 960. perenn.

Dipsacus folio laciniato T. floribus compositis albis, weißer Weber. Disteln. Ic. 3. Tab. p. 1071. perenn.

Dipsacus sativus T. s. *Carduus fullonum*, flore albo composito flosculoso, Weber. Kerk/Karten. Distel in denen Feldern / Chardon de foulon. Ic. 1. Tab. p. 1070. perenn.

Dipsacus sylvestris capitulo minore T. s. *Virga pastoris minor*, floribus composit. albis flosculos. Wilde Karten. Distel. Ic. Tab. p. 1071. Petite verge à berger. An denen Wegen. perenn.

Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major T. s. *Labrum Veneris*, floribus compositis flosculosis rubris, große Weber. Distel an denen Straßen. Ic. 2. Tab. p. 1070. Chardon a foulon rouge. perenn.

Dracunculus hortensis, floribus compositis flosculosis, foliis oblongis acrioribus s. *Abrota-*

s. *Abrotanum lini folio acriori & odorato* T. *Estragon* Ic. Tab. 855. perenn. auff Gärtners. Feldern und in Gärten.

Dracunculus palustris sive radice arundinacea Plin. c. 13. vel *Arum aquatic.* flore monopetal. aurito, folio non diviso. Wasser. Aron in stillstehenden Wassern. perenn. Ic. Tab. 1122.

Equisetum foetidum majus sub aqua repens, foliis latioribus. Icon. C. B. prodr. p. 25. stinkender Pferde. Schwanz/ in schleimichten Wassern. perenn.

Eryngium arvense, foliis serræ similibus, radice reptatrice, flosculis albis rosaceis umbellatis s. *Ammi perenne umbellatum* T. Bacillen auff steinichten Aekern. Icon. 4. Tab. p. 300. perenn.

Erysimum vulgare T. flosculis luteis cruciform. Wegsens/ auff durren Orten. Velar. Ic. 1. Tab. p. 840. ann.

Eupatorium Cannabinum T. folio trifido, flore composito nudo flosculoso rubello. Rungundentkraut. Eupatoires. Icon. 1. T. p. 336. perenn.

Euphrasia pratensis lutea flosculis monopetalis personatis s. *Pedicularis serotina lutea* T. gelber Augen. Trost. ann.

Euphrasia pratensis rubra s. *Pedicularis serotina purpurascens*. flore T. monopetal. personato. Brauner Augen. Trost/ auff feuchten Wiesen. Ic. Tab. p. 646. perenn.

Faba rotunda oblonga minor s. *Equina alba* T. weiße Bohnen.

Eadem nigra schwarze Bohnen.

Fagopyrum vulgare erectum T. folio hæd-raceo, floribus purpurascensibus apetalis. Heide Korn in denen Feldern. Blé noir. Icon. Tab. p. 646. ann.

Filix rhætica tenuissime dentata. T. s. *Filix palustris maxima* C. B. pr. 150. in dunkeln feuchten Wäldern. perenn.

Filix ramosa non dentata florida. s. *Os-munda vulgaris* & *palustris*. T. *Filix florida* Parckins. theatr. 1038. in feuchten dunkeln felsich-ten Bertern. perenn.

Feniculum vulgare germanicum T. foliis ca-pillaceis, floribus rosaceis umbellatis luteis. Fenchel in Gärten. Fenouil. Icon. 2. Tab. p. 147. perenn.

Fru mentum Indicum Mays dictum, flo-ribus apetalis granis luteis, folio lato gra-minco s. *Mays* T. Türkisch Korn. Blé de Turquie. Ic. Tab. p. 617. ann.

Idem granis rubentibus, nigricantibus, coerulefcentibus, ex rubro & luteo variegatis. vid. Theatr. Botan. Bauh. P. I. p. 500.

Fumaria officinar. flore purpureo T. papilio-naceo polypetalo. Erdrauch/ Taubentropf/ Fume-terre. ann. Ic. 1. Tab. p. 82.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore pur-purascens. s. *Urtica aculeata* foliis serratis. Nessel-

Nessel-Hanff/ in feuchten Gräben an den Zäunen. Ic. 2. Tab. p. 936. perenn.

Eadem flore albo.

Gentiana cruciata T. radice pertusa & non pertusa alba longa & amara, floribus purpu-reis monopetal. campanulatis, erectis & cru-ciatim suggestis. Modelgeer-Creus/ oder Bitter-wurz/ auf grasigten Boden. Icon. Tab. p. 1105. *Gentiane croisée*, perenn.

Gentiana palustris angustifolia Pneu-monanthe dicta, flore violaceo, radice lon-ga fibrosa amara s. *Gentiana autumnalis major angustifolia*. T. Lungenblumen/ beyh vorhergehen-den. perenn. Ic. Tab. p. 1176.

Gnaphalium majus angustifolium s. fo-lio oblongo incano, floribus compositis flo-sculosis, juxta caulis longitudinem prodeun-tibus minimis. s. *Elichrysum spicat.* T. groß schmal-blättricht Ruhrkraut. Ic. 3. Tab. p. 780. ann.

Gnaphalium majus vulgare, floribus co-agmentatis compositis, nudis s. *Filago vel Im-pia* r. Feldkaken/ Ruhrkraut/ auf ungebauten Feldern. Herbe á Cotton. Ic. 2. Tab. p. 781. ann.

Gnaphalium minus repens (rectius ere-ctum) s. *Filago minor*. r. Kleine kriechende Feld-Kaken/ auf ungebauten Feldern. Ic. 3. Tab. p. 781.

Gnaphalium medium s. *Elichrysum aqua-ticum ramosum minus, capitulis foliaceis nigris*. T. Klein Wasserruhrkraut. Icon. Joh. J.B. 3. 159.

Gnaphalium supinum longifol. humile
I 2 ramo-

ramosum, capitulis nigris multis simul congestis s. *Filago palustris*, capitulis nigricantibus *supina*, in ausgetrockneten sumpfsichten Orten. ann.

Gnaphalium vulgare tenuifolium s. *Filago vulgaris tenuissimo folio erecta*. T. Acker-Ruhrkraut / auf denen Aeckern / nach vollendter Erndte. Ic. 3. J. B. 3. 159.

Gramen aquaticum paniculat. miliaceum T. s. *Gramen miliaceum*, Ray, Synops. 255. Hirse-Rohr in Gräben. perenn.

Gramen Cyperoides angustifol. spicis sessilibus in folior. alis s. *Cyperoides angustifol. spicis sessilibus in folior. alis* T. in feuchten Wäldern. perenn.

Gramen Parnassi, flore albo simplici rosaceo, folio subrotundo s. *Parnassia palustris* & *vulgaris* T. Leberblumen auf grasichten feuchten Orten. Ic. 2. Tab. p. 527. perenn.

Helleborus albus, flore ex viridi albescente s. *Veratrum flore subviridi* T. Hellebore blanc. á fleur verd pâle. Ic. J. B. 3. 634.

Hesperis petraea vel saxatilis, foliis imis per humum sparsis hirsutis, asperis & sinuatis acriusculis, é principio radices, angustis, ad extremum autem sensim sensimque latioribus, reliquis vero per ramulos oblongis, flosculis cruciformibus ex pallide coeruleo albicantibus, siliquis longis, radice alba lignosa, Stein- oder Mauer-Leucosen / an *Hesperis muralis minor repens* J. B? 2. 880. Tabul. III. lit. d. Variat



Variat hæc plantula ætatis ratione nec non loci, è solo enim primum surgens, folia habet subrotunda ad extremum lata sinuata hirsuta ac aspera, asplenio fere similia, quæ vero cum sit adulta immutat, hancque ad nostram delineationem repræsentat figuram.

Hieracium arvense majus chondrillæ folio latiore & minus profunde dissecto. *Habichttraut* C. Sch. auf den Feldern perenn.

Hieracium arvense Chondrillæ folio dissecto hirsuto, flore luteo flosculoso s. Hieracium Chondrillæ folio hirsutum T. Icon. 11. Tab. 494. *Habichttraut* beyhm vorhergehenden.

Hieracium foliis coronopi T. atro virentibus. s. *Nigrum* Tab. Ic. 3. p. 491. *Buchfohl* perenn. auf sandigen Boden.

Hieracium fruticosum hirsutum angustifolium majus T. s. *Hieracium angustifolium montanum* Berg. *Habichttraut* mit schmahlen wenig geferbten Blättern / an denen Reinen der Weinberge und andern bergichten Orten. Ic. 15. Tab. p. 495. perenn.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum T. parumper dentatum s. *Erinus* Matthiol. in bergichten Wäldern. Icon. J. B. 2. 1030.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro T. s. *Hyoseris angustifolia* Tab. p. 490. *klein Zerkleintraut* auf durren grasichten Orten. perenn.

Hieracium minus, dentis leonis folio subaspero

T. f. Hypocheris porcelia Tab. p. 489. gar klein
Sereleintraut auf den Wiesen. perenn.

Hieracium montan. angustifolium foliis
cichoraceis incanis lanuginosis. s. Dens Leo-
nis foliis canescentibus villosis T. Berg-Habichttraut/
mit schmahlen Wegwart-Blättern / an sonnen-vel-
schen durren Orten. Ic. 17. Tab. p. 496. perenn.

Hieracium montanum majus latifolium gla-
brum T. groß Berg-Habichttraut mit breiten Blä-
tern / beyhm vorhergehenden. Icon. 14. Tab. p. 495.
perenn.

Hieracium murorum, folio pilosissimo T. ma-
culato s. *Pulmonaria gallica mas.* Buchfohl/
hin und wieder auf alten Mauern und in Wäldern.
Ic. 1. Tab. p. 504. perenn.

Hieracium murorum folio minus piloso non ma-
culoso T. laciniato. s. *Pulmonaria gallica fa-*
mina, schmahlblättrichter Buchfohl / beyhm vorher-
gehenden. Ic. 2. p. 504. perenn.

Hieracium murorum laciniatum minus pilo-
sum folio angustiore T. s. *Pulmonaria gallica te-*
nuifolia Tab. Buchfohl / mit schmahlen Blättern.
Ic. p. 505. perenn.

Hordeum distichum. T. Futter- oder kleine Gerst.
Ic. 2. Tab. p. 621.

Hordeum distichum spica brevior & latior
granis confertis. T. s. *Oryza germanica.* Reiss.
Ris. Ic. Tab. p. 653.

Hordeum distichum spica nitida Zea seu Briza
nuncupatum. T. s. *Briza monococco.* Einorn.
Ic. Tab. p. 698. Espeautre, Hor-

Hordeum distichum Zea dicocco vel
major dictum. Spels. Ic. 1. Tab. p. 608.

Hordeum polystichum hybern. T. Winters
Gerste. Ic. 1. Tab. p. 621. Escourgeon.

Hordeum polystichum vernum. T. Sommer-
Gerste. Ic. 3. Tab. p. 621.

Jacea nigra angustifol. vel Lithospermi arven-
sis foliis, caule levi T. Glockenblum. perenn.

Jacea nigra pratensis latifolia T. non laci-
niata, capitulo squamoso piloso, flore com-
posito, flosculoso purpureo. Glockenblum / Wie-
sen-Scabiosen / Jacée. Ic. 1. Tab. p. 436. perenn.

Jacea nigra pratensis vulgaris laciniata
capitulo squamoso, ciliis instar pilosis. s. Ja-
cea cum squamis, ciliis instar pilosis. T. Glockblum / auf
den Wiesen. Jacée noir. Ic. J.B. 3. 28.

Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. T. s.
Scabiosa major capitulis squamatis, flore
purpureo. Große braune Glockenblum. Ic. Tab. 3.
p. 435. auf grasichten Orten bey den Hecken. perenn.

Juncus acutus panicula sparsa T. floribus ro-
saceis. s. *Juncus foliaceus.* Weyher-Wingen / an
feuchten Orten. Ic. 3. Tab. p. 566. Junc. perenn.

Lactuca Sylvestris odore viroso. T. flore luteo
composito semiflosculoso, caule lactesce-
te. Wilder Lattich / an denen Zäunen. Ic. 6. Tab.
p. 807. Laitue sauvage. perenn.

Lactuca sylvestris costa spinosa T. folio laci-
niato. Leber-Distel / Gänse-Zung / auf ungebauten
Orten. Ic. Matth. Epit. p. 300. perenn.

Lamium maximum sylvatic. foetid. flore monopetalo labiato. s. Galeopsis procerior foetida spicata. T. stinckende Wald-Messel / in Hölzern. Galeopsis. Ic. 5. Tab. p. 921. perenn.

Lapathum acutum minimum. T. floribus apetalis, gar kleine Brindwurzel / aufseuchten Frucht- Aekern und Feldern / plus petite patience. Ic. Tab. 4. p. 824. perenn.

Lapathum aquatic. longifolium s. maximum s. Lapathum aquaticum folio cubitali. T. floribus stamineis, grosser Wasser-Ampfer / Bitterkraut / in Wassergräben / plus grande patience aquatique. Ic. 5. Tab. p. 824. perenn.

Lapathum aquaticum minus. T. s. Hydrolapathum minus Tab. kleiner Wasser- oder Weyher-Ampfer / petite patience aquatique. Icon. 6. p. 824. perenn.

Laserpitium foliis latioribus lobatis, T. flosculis rosaceis umbellatis s. Libanotis latifolia altera vel vulgator. Weiße Hirschwurzel / officinis dicitur Gentiana alba, weisser Engstan. Ic. 1. Tab. p. 986. Libanotis, perenn.

Lathyris major s. Tithymalus latifolius Cataputia dictus T. floribus monopetalis campaniform. Springkraut / hin und wieder in Feldern und Gärten. Ic. Tab. p. 986. Epurge. ann.

Lavandula angustifolia T. flore monopetalo coeruleo labiato. Lavendel. Lavande, aller Orten in Gärten. Ic. 3. Tab. p. 755.

Eadem quandoque, flore albo.

Lavan-

Lavandula latifolia T. s. Spica officinar. Spick / Alpic. Deym vorhergehenden. Ic. 2. Tab. p. 755.

Lepidium latifolium T. flosculis subalbicantibus cruciformibus, foliis oblongis, gustus acerrimi, radice alba. Pfeffer- oder Fleischkraut / Passerage. Ic. Tab. p. 847.

Lens major T. flore papilionac. grosse Linse / auf denen Aekern. ann. Lentille. Ic. J. B. 2. 317.

Lens vulgaris semine ex luteo pallido T. weisse Linsen.

Lens vulgaris semine subraso T. s. minor, gemeine Koch-Linsen. Ic. J. B. 2. 317.

Ligusticum s. Levisticum vulgare apii folio odorato, floribus luteis rosaceis s. Angelica montana perennis paludarii folio T. Stebstockel / in Gärten. Leveche. Icon. Tab. p. 206. perenn.

Ligustrum T. flore albo monopetalo infundibuliformi. Hartriegel / Wein-Holz / Troëne, in Hecken und Zäunen. Ic. Tab. p. 1454.

Linaria arvensis minor coerulea erecta, floribus monopetalis personatis. s. Linaria arvensis coerulea T. klein Blaukraut / hin und wieder in den Saam-Feldern. petite linare. Icon. Tab. p. 766. ann.

Linum sylvestre angustifolium flore magno coeruleo T. wild Blaukraut / auf durren grasichten Orten. Ic. 3. Tab. p. 214.

Lingua cervina officinar. T. s. Phyllitis vulgaris

garis floribus in foliorum aversa parte pro-
venientibus. Hirschjung. Langue de Cerf. ou Sco-
lopendre. Ic. Tab. p. 1192. perenn.

*Lithospermum linariae folio germani-
cum*, floribus monopet. infundibul. s. *Thy-
melea linaria folio vulgaris*. T. Spargenzung / auf
steinichten Feldern. Ic. 2. Tab. p. 1212. ann.

Lychnis Sylvestris quae Behen album vulgo T.
s. Been album officinarum J. B. 3. 356. Ic.
Tab. 9. p. 675. Spielspelten / auf Wiesen.

Lychnis Sylvestris quae Behen vulgo album, foliis
angustioribus & acutioribus. T.

Lyfimachia coerulea palustris Tertianaria
dicta, flore monopetalo coeruleo labia-
to s. *Cassida palustris vulgatio*, flore caeruleo T.
Weidrich / bitter Fiebertraut / in denen Hecken und
Zäunen / an feuchten Wassergräben. Toque. Icon.
Tab. p. 766. perenn.

Lyfimachia latifolia Chamenerion di-
cta, flore purpureo monopetalo rotato s. *Cha-
menerion latifolium vulgare* T. grosse Weiderich,
Rössl.

Lyfimachia lutea major quae Dioscorid. t. fo-
liis oblongis, florib. monopet. rotat. divisis,
gelber Weidrich / an denen Wassergräben. Cornu-
eille jaune. Ic. 2. Tab. p. 1237.

Lyfimachia lutea corniculata, flore mo-
nopetalo diviso rotato s. *Onagra latifolia* t. gel-
ber gehörnter Weidrich / hin und wieder an Rhein-
strom. perenn.

Lyfi-

Lyfimachia purpurea spicata, flore
monopetalo rotato diviso. s. *Salicaria vul-
garis purpurea*, foliis oblongis. T. brauner Weidrich /
auf feuchten Wiesen. Salicaire. Icon. 1. Tab. p.
1236.

Lyfimachia filiquosa glabra major, flo-
re purpureo. s. *Chamenerion glabrum latifolium*
majus. T. Herbe St. Antoine. Weidrich. Icon. 6.
Tab. p. 1238. perenn.

Eadem minor. T. kleine Weidrich. Rösslein /
beym Vorhergehenden. Ic. 3. Tab. p. 1237. perenn.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno
flore purpureo rotato. s. *Chamenerion villosum*
magno flore. T. Icon. 4. Tab. p. 1237. perenn.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, parvo flo-
re, s. *secunda* Tab. vel *Chamenerion villosum*
minus, parvo flore. T. Icon. 5. Tab. p. 1237. an
frischen Wasserbächen. perenn.

Malva palustris, folio molli incano, flo-
re albo monopetalo campaniformi. s. *Althaea*
Dioscor. t. Eibisch / an feuchten Orten und aufge-
worfenen Wassergräben. Guimauc ordinaire. Ic.
Tab. p. 1152. perenn.

Marrubium album vulgare T. floribus mo-
nopetalis verticillatis labiatis, folio incano
rugoso, weisser Andorn / an denen Wegen und
Straßen. Marrube blanc. Icon. Tab. p. 925. pe-
renn.

Marrubium aquaticum vel palustre glabrum T.
florib. monopetal. verticillatis labiatis, s. *Ly-*
copus

opus palustris glaber T. foliis hirsutis & in profundas lacinias divisis, caule quadrangulo, Wasser-Andorn / in denen Wassergräben. Marrube aquatique. Ic. Matth. Epit. sub nomine Siderit. 1. p. 746. perenn.

Marrubium Cardiacum dictum T. flore purpureo labiato, Hergespan / Hergtraut / an denen Mauren und Wegen. Agripaume. Icon. 1. Tab. p. 935. perenn.

Idem flore albo.

Marrubium nigrum foetidum s. *Ballote* T. flore monopetalo verticillato labiato purpureo, stinkender oder schwarzer Andorn. Marrube noir ou pûant. Icon. Tab. sub nomine Marrubiastr. p. 926. perenn.

Mentha palustris fol. oblongo T. Icon. J. B. 3. part. 2. 220. sub nomine Mentastri hirsut. wilde Wassermünz / an feuchten Orten. Mente Sauvage. Ic. Lob. 510.

Mentha rotundifolia palustris s. *aquatica major* T. officinis mentha rubra, flore monopetalo labiato, pallide purpurascende, reiche Bach- oder Wassermünz. Icon. 3. Tab. p. 736. Mente aquatique rouge. perenn.

Mentha rotundifolia spicata crispa T. floribus verticillatis labiatis. Krausmünz / trauser Balsam / Mente ou Beaume crespée, in Gärten. Ic. Fuchs. hist. plant. perenn.

Muscus terrestris clavatus repens, *Lycopodium officinar. dictus* s. *Muscus squamosus vulgar.*

vulgaris repens clavatus T. Bärlapp / Truttenfuß / Mouffe terrestre, ou Pied de Loup. in Wäldern. Ic. 3. Tab. p. 1197. perenn.

Myagrum siliqua longa, folio integro, flore luteo minore cruciformi s. *Turritis Leuco* folio T. große wilde Kr. ste / Cameline, in denen Saam-Feldern. Ic. 2. Tab. p. 1252. perenn.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis T. s. *Coronopus repens*, floribus albis cruciformibus, capsulis verucosis, kriechender Wegkreuze oder Krähenfuß. Icon. 4. Tab. p. 302. perenn.

Nicotiana major latifolia T. flore monopet. infundibuliform. diviso, folio molli integro ac unctuos. Tuback / auf denen Gärtners-Feldern. Herbe de la Reine ou Nicotiane. Ic. Tab. p. 971.

Nigella arvensis cornuta T. flore subcoeruleo rosaceo, foliis foeniculaceis, Sanct Catharinen-Blumen / wild Rardentraut / auf Saam-Feldern nach vollender Erndte. Nielle. Ic. Matth. Epit. p. 552. ann.

Onobrychis foliis viciae fructu echinato major T. flore eleganter rubente papilionaceo. Dahnentamm / auf verschiedenen grasigten Orten. Saint foin. Ic. Tab. p. 900. perenn.

Origanum sylvestre, flore purpureo monopetalo labiato. s. *Origanum vulgare spontaneum* T. Wohlgemuth / Dosten / an den Hecken. Origane. Ic. 4. Tab. p. 726. perenn.

Idem flore albo, Ic. 1. Tab. p. 725.

Orui.

Ornithopodium majus T. flore flavescente papilionaceo, radice nodosa folio pinnato. Vogelpfeife / auf den Aekern / nach verrichteter Erndte. Pied d'oiseau. ann.

Idem minus.

Orobanche ramosa floribus caeruleis T. monopetalis personatis. Hanfsinänlein / in den Hanfsäckern. Ic. Clus. hist. 271.

Eadem floribus subalbidis & purpurascens. perenn.

Persicaria angustifolia T. caule rubente laevi ac geniculato, spicis oblongis, floribus pallide purpurascens, auf feuchten sandigen Orten. perenn. C. B. prodr. 43.

Persicaria minor T. s. pusilla repens. Lob. Ic. 316. klein kriechend Blöthkraut.

Persicaria mitis maculata, flore purpureo apetalò diviso spicato s. *Persicaria mitis maculosa* T. Blöthkraut / mit gestreckten Blättern. Persicaire. Ic. 2. Tab. p. 1240.

Persicaria mitis non maculata. Blöthkraut mit Blättern ohne Flecken. Ic. Tab. p. 1240. perenn.

Persicaria mitis minor T. s. pusilla procumbens, flore rubro, klein Wald-Blöthkraut. Icon. 3. Eadem flore albo.

Persicaria salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta. s. *Persicaria salicis folio perennis*. T. Saamkraut / in Teichen / Wassern und Fischgräben. Ic. 2. Tab. p. 1117. perenn.

Persicaria urens s. *Hydropiper* T. floribus ruben-

rubentibus in spicam congestis, folio longo. Wasser-Pfeffer / in feuchten Orten. Courage. Ic. 1. Tab. p. 1240. perenn.

Pilosella major repens, folio angustiore minus piloso, florib. compos. semiflosculos. luteis s. *Dens leonis qui pilosella folio minus villosa* T. an bergichten sonnenreichen Orten. perenn.

Plantago aquatica angustifolia, flore simpl. rosaceo albo. s. *Ranunculus palustris*, folio angustiore plantaginis T. schmalblättrichter Wasserwegerich. Icon. 2. Tab. p. 1112. Plantain d'eau à feuilles étroites, in feuchten Gräben. perenn.

Plantago aquatica latifolia. s. *Ranunculus palustris*, plantaginis folio ampliore. T. Wasserwegerich / beyhm vorhergehenden. Ic. 1. Tab. p. 1111. Plantain d'eau à feuilles larges. perenn.

Polium Lavendula folio T. flore monopetal. labiato albo. s. *Polium recentior*. famina Lavendulae folio Lob. Ic. 488. Polium. Weib. Polium.

Polypodium vulgare T. flosculis subluteis, dorso foliorum exeuntibus, foliis dissectis. Engelsfuß. Ic. 1. Tab. p. 1188. Polipode, an den Felsen / bergen / und an den alten Eichen Bäumen. perenn.

Polygonum vulgare latifolium, flore stamineo rubro & albo. s. *Polygonum latifolium* T. Blutkraut / Weggras. Renonce ou Centinode. Ic. 1. Tab. p. 1214. perenn.

Polygonum brevi angustoque folio T. gar klein Blut

Bluttraut/ auf sandigen Boden/ an denen Wegen. Ic. 2. Tab. p. 1215. perenn.

Polygonum oblongo angustoque folio r. schmalblättricht Weggras / beyhm vorigen. Ic. 3. Tab. p. 1215. perenn.

Porum sylvestre capite gemino r. flore purpureo liliaceo, wilderlauch. Poireau sauvage. Ic. 1. Tab. p. 872. perenn.

Portulaca latifolia sativa vel domestica r. flosculis subluteis rosaceis. Zahnerpurgel/ in Gärten. Pourpier domestique. Ic. 1. Tab. p. 829. ann.

Portulaca sylvestris s. angustifolia r. Sauoder Ackerwinkgel. Pourpier sauvage. Ic. 2. Tab. 830. ann.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini Ray. hist. p. 189. in stehenden Wasserpfudeln. perenn.

Potamogeton foliis angustis & undulatis s. *Tribulus aquaticus minor muscatellæ floribus*. Ger. emac. 824. in Wasserbächen. perenn.

Potamogeton ramosum angustifolium r. flosculis pusillis cruciform. uvæ in modum congestis, in frischen Wasserbächen. perenn.

Raphanus major orbicularis s. rotundus r. flore cruciform. purpur. & alb. Kettich / in Gärten und Gärtners. Feldern. Raifort. Ic. 1. Tab. p. 797. ann.

Raphanus niger r. schwarzer Kettich. Lob. Ic. 202. Winter. Kettich. ann.

Rapunculus hortensis lactescens pyramidalis,

midalis, folio latiore, flore monopetalo campaniformi albo & cœruleo radice lactescente s. *Campanula pyramidata altissima* r. weißse Pyramiden Glockenblumen / in Gärten und Hölzern. Campanule ou Pyramidale. Clus. hist. CLXXII. perenn.

Rapunculus persicifolius, flore monopetalo magno cœruleo campanulato s. *Campanula angustifolia cœrulea*. r. Milchglöcklein mit Pfirsichblättern / in denen Hecken. Icon. Tab. 699. perenn.

Rorella flore monopetalo rosaceo albo, radice pilosa, folio rotundo, in ambitu piloso s. *Ros solis folio subrotundo* r. Sonnenhau / in feuchten mofischen Orten. Ros solis. Icon. 1. Tab. p. 1202. perenn.

Eadem folio oblongo. Lob. Ic. 811.

Scordium foliis Salviæ florib. subluteis monopet. labiat. s. *Chamedrys fruticosa sylvestris melisse folia* r. wilde Salbey / an Bergen. Ic. Tab. p. 761.

Serratula tinctoria, foliis serratis ad radicem integris, reliquis profunde incisis, flore compos. purpureo flosculos. s. *Jacea nemorensis que serratula vulgo*. r. Scharrenkraut / Jarber. Scharren / in Wäldern. Serretta. Icon. 3. Tab. p. 439. perenn.

Eadem flore albo sed rarius.

Variat serratula ratione folior. quandoque enim integra quandoque ineisa profert. uti videre est C.B. p. 235. K

Sedum majus vulgare T. s. Barba Jovis, flo-
reroseo, folio succulento crassiore. Don-
nerbart / grosse Haufwurz / in Gärten und auf den
Dächern der Bauern. Joubarbe. Ic. Tab. p. 1224.
perenn.

Seseli pratense tenuifolium, flore lu-
teolo roseo umbellato. s. *Angelica praten-
sis apii folio*. T. Röß. Fenchel / auf feuchten Wiesen.
Ic. Tab. 160. perenn.

Solanum tuberosum esculentum. T. s. Papas A-
merican. flore albo monopetalo rotato divi-
so. Kartoffeln / Grund-Birn / auf den Feldern. Icon.
Tab. d. 869. perenn.

Idem flore purpureo.

Utrumque & flores quandoque fert ple-
nos.

Solanum vulgare, folio phaseoli floscu-
lis subalbidis racemosis, fibrosa radice, bac-
cis nigris. s. *Solanum officinarum*, vel *vulgare ni-
grum*, acinis nigricantibus. T. Nachtschatten / an al-
len feuchten Orten und Winkeln. Morelle. Ic. 1.
Tab. p. 973. ann.

Solanum vulgare s. *officinar. acinis luteis*
T. folio minori pallide virente. Beim vor-
hergehenden. Sed rarius. ann. Morelle à fruit jau-
nâtre.

Sonchus laevis laciniatus latifolius T. s. minus
spinofus. Hasen-Rohl. Ic. 3. Tab. p. 499. ann.

Sonchus laevis latifolius, sive *sonchus laevis mi-
nor*, paucioribus laciniis, T. wilder Hasen-Rohl / auf
den

den brachliegenden Feldern. Icon. 3. p. 499. Lai-
tron doux. ann.

Sonchus laevis laciniatus, flore sulphureo T. s. *ter-
tius* Tab. In Kraut-Grüchern. ann.

Sonchus laevis laciniatus muralis, par-
vis floribus, s. *Chondrilla sonchifolio*, flore inteo
palescente T. an denen Wegen und Strassen. Con-
drille. Ic. 11. Tab. p. 501. ann.

Thalictrum majus flavum, staminibus luteis,
folio glauco. T. s. Ruta pratensis. 4. Tab. gelbe
Wiesen-Kraute. Rue des prez. p. 501. perenn.

*Tithymalus characias amygdaloides angustifo-
lius*. T. s. *Tithymalo maritimo* affinis lina-
riaefolio, auf den Feldern und Rändern der Aecker /
Wolfs-Milch / mit schmalen Mandelblättern. Titi-
malc. Ic. 6. Tab. p. 988. perenn.

Idem *latifolius* T. Icon. Tab. 5. p. 988. pe-
renn.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus T.
s. *Tithymalus platyphyllos*. Fuchs. potius
Esula arvensis latifolia.

*Tithymalus minimus angustifolius an-
nuus*, foliis acutis oblongis s. *Esula exigua*
T. vel *Leptophyllos* Matth. Epit. p. 966. flei-
neße Wolfs-Milch / in denen Korn-Feldern und an-
dern ungebauten Orten. Icon. 15. Tab. p. 991. pe-
renn.

Verbascum maximum album, s. *Fæmina*
flore subpallido monopetalo rotato diviso s.
Verbascum flore albo T. weiße Königs-Kerzen. Ic.
K. 2 Tab.

Tab. 2. & 3. p. 956. Bouillon blanc. hin und wieder an denen Wegen. ann.

Verbena communis s. officinar. flore cœruleo t. monopetalo labiato, Eisenkraut. perenn. Ic. 1. Tab. p. 380. Verveine mäl.

Veronica angustifolia spicata t. vel 2. erectior angustifol. Clus. hist. caulibus viridibus, flore monopetalo cœruleo rotato multifido, aufrecht stehender Ehrenpreis / auf dürren grasichten Orten. Ic. Tab. 4. & 5. p. 773. perenn.

Veronica angustifolia recta minor s. *Veronica spicata minor* t. gar kleiner aufrecht stehender Ehrenpreis / beyhm vorhergehenden. Icon. Tab. 6. p. 773. perenn.

Veronica spicata longifolia t. s. *Lysimachia spicata major* recta cœrulea, foliis profunde serratis. Ic. Tab. 773. perenn.

Urtica urens maxima t. flore stamineo folio serrato, grosse brennende Nesseln / hin und wieder an denen Bäumen. Grande Ortie. Ic. 2. & 4. Tab. p. 921.

Urtica urens maxima, caule rubente, grosse brennende Nessel mit röthlichen Stengeln. ann.

Urtica urens minor t. klein brennende oder Eiter-Nessel / an denen Wegen und Wänden. Ortie griessche ou petite Ortie. Icon. 3. Tab. p. 921. ann.

MEN-

MENSIS

AVGVSTVS & SEPTEMBER.

Abrotanum campestre caule rubentibus t. s. *Abrotanum tenuifolium inodorum* cauliculo rubro, flosculis compositis luteis flosculosis multifidis inodoris, wilde Stabwurt / Auronne Sauvage, Ic. Tab. 3. p. 51. perenn. auf ungebauten Orten.

Idem caule albis albis t.

Abrotan. mas angustifol. majus t. s. vulgare. Stab oder Schofwurt / in Gärten und Gärtners-Geländen. perenn. Ic. 1. Tab. p. 50.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum t. s. vulgare romanum Camer. folio inferius albo, flore compos. flosculoso subluteo, Pontischer oder Römischer Wermuth. Ic. Matth. Epit. p. 454. perenn.

Aconitum flore saturate cœruleo poly-petalo anomalo galeato, folio dissecto atrovirente s. *Aconitum cœruleum vel Napellus* t. Rappenblum / in Bergen und Gärten. Cappe de moine ou Tuë Loup. Ic. Tab. p. 983. perenn.

Aconitum Lycostanum luteum t. folio plantani, flore luteo pallescente, gelbe Eisen. Hütlein / beyhm vorhergehenden. Ic. 4. Tab. p. 982. perenn. Aconit à fleur jaune.

Alfina spargula facie minor s. *Spergula minor flosculo subcœruleo* t. vel *Spergula purpurea*, flosculis rosaceis purpurascens, foliis tenuibus

K 3

nuibus acutis, in cauliculo circa geniculum
positis, zwischen den Steinlein auf sandigen feuch-
ten Orten. ann. Tabul. IV. lit. e.

Artemisia vulgaris major T. caule ex viri-
di albente, floribus minimis flosculosis, fo-
lio dissecto, Densfuß auf ungebauten Orten. Ar-
moise. Ic. 2. Tab. p. 27. perenn.

Eadem purpurascens Ic. 1. Tab. p. 27.

Arundo vulgaris T. s. palustris, folio ob-
longo acuminato, flore stamineo, gemein
Schiff-Rohr / in Wassergräben, Canne ou Roseau.
Ic. 2. Tab. p. 57. 2 perenn.

Atriplex sylvestris latifolia, folio acu-
tiores flore stamineo diviso s. *Chenopodium* T.
Pes anserinus II. Tab. p. 812. Gänse-Fuß / mit spär-
lichen Blättern / Patte d'Oye, bey den Mist-Stä-
ten und andern aufgeworffenen Grund. ann.


Atriplex sylvestris latifolia s. *Pes anse-
rinus* T. 1. Tab. p. 812. Gänse-Fuß / Sau-Eodt /
mit breiten feilen Blättern / bey dem Vorhergehenden.
ann.

Cannabis erratica, T. s. sterilis femina florib.
apetal. foliis multifidis digitatis. Fruchtbrin-
gender Hanff. Chanvre femelle. ann.

Cannabis sativa T. s. facunda vel mas. gemeiner
Hanff. Icon. 1. Tab. p. 936. Chanvre mâle. ann.

Caryophyllus sylvestris profunde laci-
niatus plumarius, flore inodoro rubro po-
lypetalo s. *Caryophyllus* flore tenuissime dissecto T.
Fede r. Nieschen / auf den Wiesen. Oeillet sauvage des
prez.





prez. 1c. Tab. 10. & 11. p. 667. & seq. perenn.
Idem flore albo.

Conyza major, flore globoso vix radiato. s. *Aster palustris*, parvo flore globoso, r. kleine Stern-Blumen/ Dürrewurzel/ Conise des marais, Icon. 2. Tab. p. 1243. an feuchten Orten. perenn.

Conyza media, asteris flore luteo magno radiato s. *Aster pratensis autumnalis Conyza folio* T. gelbe grosse Stern-Blumen/ Dürrewurzel/ an feuchten Orten. *Aster* des prez. 1c. 1. Tab. p. 1243. perenn.

Gentiana alpina pumila folio brevi r. flore dilute purpurascens & coeruleo elegantissimo, monopetalo campaniformi, kleiner Himmlstengel/ auf grasichten sonnenreichen Bergen/ vel *Gentianella fugax* 4. Clus.

Gentiana alpina pumila, *centaurii minoris foliis* r. flore elegantissimo coeruleo s. *Gentianella fugax* 5. Clus. kleiner blauer Himmlstengel.

Gramen dactylon radice repente r. s. folio arundinaceo majus aculeatum. s. *Legitimum* Clus. CCXVII. in denen Kraut- und Kohl-Gärten.

Gramen dactylon angustifolium spicis villosis r. s. *Ischaemon* II. Tab. p. 534. Blut-Gras/ an rauhen ungebauten Orten.

Gramen dactylon folio latiore r. s. *Ischaemon* *gramen sanguinarium* I. Tab. p. 534. Blut-Gras/ in fettem Erdreich.

Gramen junceum s. *bufoninum* caliculis paleaceis repens s. *Juncus palustris humilior repens* t. Knotten-Graß / auf feuchten Wiesen. Ic. 6. Tab. p. 536.

Gramen nemorosum panicula rufescente molli t. s. *Gramen sylvaticum* vel *nemorosum* l. Tab. p. 537. Wald-Graß.

Gramen palustre aculeatum f. *echinatum* vel minus *germanicum* s. *Cyperoides palustre aculeatum, capitulo brevior* t. Wasser-Graß / mit stehenden Aehren / in sumpffichten Orten. Lob. Icon. 15.

Gramen panicum spica aristis longis armata s. *Panicum vulgare spica multiplici longis aristis circumvallata* t. Jenich-Graß / an denen Wassergräben. Ic. 2. Tab. p. 538.

Gramen panicum spica simplici s. *Gramen geniculatum* Tab. s. *Panicum vulgare spica simplici & aspera* t. Knoden-Graß. Icon. 3. Tab. p. 516.

Gramen typhoides asperum. s. *Gramen spicatum spica cylindracea tenuiore longa* t. s. *Typhynum* l. Tab. Eisch-Graß. p. 531.

Gramen typhoides maximum spica longissima, radice quasi bulbosa. s. *Gramen spicatum, spica cylindracea longissima*. t. Ic. C. B. prodr. p. 10. gar groß Fuchsschwanz-Graß.

Gramen typhoides molle aut alopecurinum l. Tab. s. *Gramen spicatum spica cylindracea molli & densa* t. folio lanuginoso. Fuchsschwanz

schwanz-Graß / an denen Wegen und Straßen. Ic. Tab. p. 520.

Gramen typhoides, spica angustiore longiore rufescente. s. *Gramen spicatum spica cylindracea tenuissima longiore*. t. Klein Fuchsschwanz-Graß. Ic. 9. Lob.

Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono C. B. p. s. *Callitriche Plinii* F. Column. ann.

Linaria annua, folio hirsuto hederaceo flore ex albido flavescente labiato. s. *Elatine folio subrotundo vel Linaria segetum nummularia folio villoso* t. Icon. 1. Tab. p. 1091. *Elatine*, auf denen Frucht-Aeckern / nach vollbrachter Erndte. ann.

Lupulus mas t. floribus stamineis herbaceis. Hopffen in Gärten und Feldern. Icon. Tab. p. 1293. Houblon mâle. perenn.

Lupulus femina t. s. *Sylvestris minor sterilis*, wilder Hopffen / in denen Hecken. Houblon femelle. perenn.

Majorana vulgaris t. folio majore flore monopetalo labiato. Majoran / Icon. 1. Tab. p. 718. Mariolaine, auf den Gärtners-Feldern und in Gärten. perenn.

Majorana tenuifolia t. s. nobilis, Winters oder edler Majoran / beyrn vorhergehenden. perenn.

Milium semine luteo & albo, t. graminifolium, flore staminco, Hirse / Millet. Icon. 1. Tab. p. 656. auf den Aeckern. ann.

Pimpinella sanguisorba major T. florib. monopetal. rotatis divis. rubr. spadiceis, foliis pinnatis serratis, groß Sperben-Kraut / auf den Wiesen / Grande pimprenelle, Ic. 1. Tab. p. 316. perenn.

Polium montanum repens T. flore purpur. & albo monopetalo labiato, klein Berg-Poley / Polium de montagne, Ic. 4. p. 950. perenn.

Saxifraga graminifolia, flosculis tetrapetalis herbidis & mucosis. Pluck. 74. 2. f. *Alfne pusilla graminea flore tetrapetalo* T. locis udis ac arenosis lapidosis.

Sideritis arvensis angustifolia rubra s. *Galeopsis patula segetum flore purpurascente* T. aliàs *Alyssum* Galen. Tab. Ic. 2 p. 928. Korn-Wue / Purpur-roth Alyssen, auf den Feldern. ann.

Eadem flore albo.

Sideritis arvensis latifolia glabra s. *Beonica arvensis annua flore ex albo flavescente* T. Ic. 3. Tab. p. 929. groß Feld-Alyssen. ann.

Sium palustre album foliis serratis T. s. *Cicuta aquatica Gesneri vel Wepferi*, floribus subluteis umbellatis rosaceis, foliis angustis serratis, longis pediculis appensis, caule striato ac geniculato, radice crassa fibrosa. Giff-Kraut / böß Wassermere / Icon. 4. Tab. p. 203. in sumpffichten Orten.

Stachys major germanica T. s. *Fuchsi*, flore purpurascente monopetal. verticillato labiato, riechender Andorn / hin und wieder in denen Heiden / Stachys. Icon. 1. Tab. p. 767. perenn.

Tanace-

Tanacetum vulgare luteum T. flore composito flosculoso, Rheinfarn / Wurm-Kraut / hin und wieder in grasichten Orten. Tanacee. Tab. Ic. 6. p. 28. perenn.

Telephium vulgare s. *Anacampteros vulgo Faba Crassa*, T. flore albo rosaceo, foliis succulent. Sette Henne / Orpin, auf denen Aeckern und andern grasichten Orten. Ic. 1. Tab. p. 1227. perenn.

Thalictrum majus non striatum T. s. *Ruta pratensis major*, 2. Tab. große Wiesen-Kraute / auf durren grasichten Wiesen / Rue des prez. Icon. 2. Tab. p. 120. perenn.

Tormentilla radice repente T. s. *Pentaphyllum viride minus*, flore aureo rosaceo, radículas in terram é geniculis demittens, triehende Tormentill / in Wäldern. perenn.

Verbascum mas s. *officinarum latifolium luteum* T. foliis incanis latioribus flore monopetalo luteo rotato diviso. Wulk-Kraut / Rönigs-Kerzen / auf sandigen erhabenen Orten. Bouillon blanc ou Bon Homme. Ic. 1. Tab. p. 955. ann.

MENSIS

SEPTEMBER & OCTOBER.

Colchicum autumnale latifolium flore purpurascente monopetalo liliaeco s. *Colchicum commune* T. Herbst-Blumen / saule Futen / nachende Huren. Colchique ou mort au Chien. Icon. 8. & 9. Tab. p. 1011. perenn.

Idem

Idem flore albo.

Gentianella angustifolia autumnalis minor flore coeruleo campaniform. quadripartito ad latera pilosos. s. *Gentiana coerulea oris pilosis* T. Blauer Herbsthimmel-Stengel.

Helianthemum Indicum Tuberosum flore luteo compos. radiato foliis latioribus s. *Corona solis parva flore, radice tuberosa* T. Erd-Aepffel / Canadas, pomme de terre ou Taupinambours, an einigen Orten auf Feldern.

Limosella annua, flore albo monopetalo infundibuliformi multifido, fructu ovato unicapsulari, semine foeto exiguo oblongo, in duas partes dehiscente, foliis oblongis planis, longis pediculis insidentibus, radice fibrosa albicante. *Sumpff-Blümlein* in *letrichten feuchten Grunde* / quam aqua quandoque inundare solet. *Ob locum quem amat limosum à nobis Limosella appellata est.* Tab. V. lit. f.

Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis anomalis unilabiatis ex albo purpurascentibus, inferna parte amplis, superna vero angustis ac clausis longis pediculis insidentibus, facile deciduis, foliis anagallidi similibus, capsula oblonga seminibus copiose referta. *Sumpff-Gauchheil* / in *letrichten feuchten Boden.* Tab. V. lit. g.

Hujus plantulae genus nondum ut opinor est descriptum, hinc ob Cyathi inversi analogiam pyxidariam nuncupavimus, quae
vero



lit. g.



vero figura auxilio vitri armati atque scalpelli scriptorii, florem galeatum bipartitum atque unilabiatum clausum exhibet, superficietenus autem exacte canis penem repræsentat.

Sium umbellatum repens, t. floribus albicantibus rosaceis umbelliferis Ger. Emac. 258. Klein kriechend Wassermere / in feuchten grasichten Oreen.

Orchis spiralis alba odorata t. s. Triorchis alba odorata minor, auf durren grasichten Oreen. lc. J.B. 2. 769.

MENSIS NOVEMBER atque DECEMBER.

A Pud nos in producendis Plantis quiescunt, nec ulla his in mensibus rite viget ac floret, exceptis Fungis atque Muscis, quos jam adeo exacte descripsit Vir egregiæ Eruditionis Joh. Jac. Dillenius in suo Catalogo Plantarum sponte circa Gissam nascentium, ut aliquid addere non liceat.

OMISSA.

Carpinus t. s. Fagus sepium, floribus subalbicantibus staminibus, fructu in umbilico foliaceis, foliis serratis. Hagebuchen / Zaunbuchen / Charme, Icon. Tab. 1387. in denen Zäunen und Wäldern. Conyz.

Conyza major vulgaris L. floribus subluteis flosculosis foliis pinguibus hirsutis, grosse Dürnwurz / Icon. 2. Tab. p. 1243. Jul. an rauhen dörren Orten. Conisè.

Cruciata hirsuta T. flore luteo cruciformi, foliis quaternis hirsutis. Gulden Waldmeister / Croiscute jaune, Icon. Joh. B. 3. 717. an denen Bäumen. Maj.

Fraxinus excelsior T. s. Vulgaris ligno candido, floribus subluteo purpureis apetalis, foliis atrovirentibus pinnatis ac crenatis, semine avis linguam exprimente. Eschenbaum. Icon. Tab. p. 1428. Frêne. April.

Salix alba vulgaris arborefcens T. quæ fragilis, floribus luteis amentaceis spicatis, molli- bus in pappum abeuntibus, foliis superne virentibus, inferne candescentibus, utrinque hirsutis vix serratis cortice cineraceo, Saux, Pfahl oder Baum-Weiden / auf feuchten Wiesen und an den Strassen. Icon. J. B. 1. 212. April.

Salix aurita & non aurita, folio amygdalino utrinque virente T. cortice purpureo, quæ latifolia sylvestris Tab. Breitblättriche Seil, oder Korb-Weiden / Icon. 1. Tab. p. 1452. an frischen fließenden Wasser-Bächen. April.

Salix aquatica vel *Caprea latifolia* Tab. five *Salix folio ex rotunditate acuminato* T. breit- blättriche Dohle- oder Kägel-Weiden. Mart. Icon. 2. Tab. p. 1452.

Salix humilis capitulo squamoso T. & fragilis folio

folio minore utrinque glabro subcœruleo crenato. Kleine Sumpff- oder Rhein-Weiden. Ic. J. B. 1. 213. April.

In hujus salicis foliis, ut plurimum Vesciculæ conspiciuntur subrubentes, quales ferme Ulmus producere solet, ut & in ramulorum capitulis lanuginosis candidis.

Salix fragilis T. s. spontanea folio lato splendente auriculato, cortice candido. Bruch- oder Glas-Weiden / hin und wieder an den Wassern. C. B. prodr. 198.

Salix latifolia repens T. vel pumila. Kleine niedrige Erd-Weiden / an feuchten Orten. Icon. 5. Tab. p. 1453.

Salix oblongo incano acuto folio. T. Salix foliis angustis & longissimis crispis subtus albicantibus, cortice atro rubente. Spth-Weiden / an den Wassern. Icon. J. B. 1. 212.

Salix vulgaris nigricans, folio non serrato T. quæ & rubra flexilis, folio longo angusto, subtus nonnihil candicante argutis denticulis undique crenato, roshe Band-Weiden / (seynd nebst den gelben die besten.) Ic. J. B. 1. 215.

Salix sativa lutea, folio crenato. T. s. Vitellina aut *Vimineæ angustifolia sylvestris*, cortice luteo, nostratibus *Salix vulgarissima*, gelbe Band- oder Kiefer-Weiden / Ic. 2. Tab. p. 1452. werden hievon ganze Dörfer besetzt und gepflanzt.

Stellaria aquatica f. *Alfina aquis innatans*, flosculis subviridibus, foliis longiusculis

feulis J. B. 3. 777. Ic. 6. Tab. p. 187. Wasser-
Tenchel/ in stülstehenden Wasser Wächlein.

Viola tricolor hortensis repens r. flore poly-
petalo anomalo s. Jacea tricolor vel Flos tri-
nitatis, Dreyfaltigkeit-Blum/ Freysam-Blum/ in
Gärten und auf den Feldern. Pro soli diversita-
te coloris ratione, multum variat. per totam
æstatem. Icon. Tab. 690. Penſees.

Et hæc est Plantarum Divino sub Auspicio
provenientium ac florentium, brevis ac genuina de-
lineatio, quasque Herbarium meum, ut ita lo-
quar Vivum, manu propria decerptas atque colle-
ctas, Exoticis exceptis, in se continet. Fateor
quidem multas superesse species, quæ addi potuissent,
sed cum non curvis adire contingat Corinthum, ita
& mihi tempus non concessit omnes telluris late-
bras pervadendi, eundem in finem non potui nec
volui circumscribere in Alsatia exactam plan-
tarum historiam, quam forsitan ex honora-
tioribus Collega quidam, si Diis placebit, For-
tunaque optatis respondebit in omnium admiratio-
nem ac gaudium, brevi erudito Orbi sit editurus.
Interim venia erit Lectori, si quæ addenda vel
corrigenenda sint, aquanimo iudicio emendet mihi-
que ubi hallucinatus fuerim, pro sua Benevolentia
viam in posterum monstrat exactiorem, Deo interim
Botanicorum summo Botanico pro viribus concessis
sit Laus Honor & Gloria.

FINIS.

INDEX



INDEX MENSTRVVS.

I Anuarius.	1	Julius.	114
Februarius.	2	Augustus.	149
Martius.	4	September.	155
Aprilis.	12	October.	155
Majus.	24	November.	157
Junius.	61	December.	157

INDEX ALPHABETICVS.

A	A.	Acer campestre	12
Bies alba	24	Acer montan.	11
fæmina	ibid.	Acetosa crispa	12
mas	ibid.	lanceolat.	25
picea rubr.	ibid.	pratensis	12
Abrotan. campestre	149	rotundifol.	61
linifol.	129	vulgaris	12
mas	149	Acetosella	23
vulgare	ib.	Aconitum cœrul.	150
Abfinth. pontic.	114	lycocton. luteum	150
pontic. tenuifol.	149	racemosum	25
roman.	114	unifolium	2
vulgare	ibid.	Acorus	25
Acacia germanic.	19	Adiantum album	61
Acanthium vulgare	124	aureum	ibid.
		L	Adian-

INDEX

Adiantum filicis fol. 76	Alfina aquatica media 63
nigrum 61	chamædryfol. 12
Agrarium 57	fontana ibid.
Agrimonia officin 62	hæderul. fol. ib.
odorata ibid.	hirsuta 13
Alcea vulgaris 91	media ibid. & 26
rotundifol. ibid.	minor capitul. lini 64
Alchimilla erecta 100	multicaul. ib.
linar. fol. 40	montana ibid.
montana minim. 19	palustris major 63
supina 99	min. longifol. 115
vulgaris 62	rotundifol. 114
Alga filamentosa 62	serpillifol. 115
vulgatissim. ibid.	tenuiss. fol. ib.
Alliaria 17	uliginos. locis.
Alliopræsum 63	proveniens 25
Allium campestre junci- fol. ibid.	petræa 64
tenuifol. ibid.	portulacæ fol. 26
juncifol. 63	pratensis grami- nifol. amplior. 14
montan. angustifol. 62	angust. ibid.
latifol. ibid.	scandens baccifer. 114
lativum 62	serpillifol. 26
sylvestre 25	spergula maj. ibid.
Alkekengi 107	minor 150
Alnus nigra 25	triphyllus 13
rotundifol. 12	verna glabra ibid.
Alfina altissim. nemor. 63	Alfina
aquatica major ib.	

ALPHABETICVS.

Alfina veronica fol. ibid.	Anonis spinosa 64
vulgaris ibid.	non spinosa ibid.
Althæa 139	Anserina 47
Alyssum luteum maj. 57	Anthyllis leguminos. 64
min. ib.	Antirrhin. arvens. maj. 27
polygon. fol. 2	min. 88
segetum 94	Aparine montana latifol. 27
vulgare 2	angustifol. 54
Ammi perenn. 129	supina pumila 102
Amygdal. amar. 14	vulgaris 27
dulc. 13	Aphaca 113
Anacampteros 155	Apium hortense 116
Anagallis alba 26	crispum ibid.
aquatic. 112	latifol. ibid.
carneo flore 26	maximum ibid.
cærulea ibid.	montan. 116
Intea ibid.	officinar. ib.
phanicea ibid.	palustre longif. 65
rotundifol. 104	officinar. 116
Anblatum Cordi 97	suaveolens 115
Anemone sylvestr. alb. 26	sylvestre 116
Anethum vulgare ibid.	Aquifolium 38
Angelica montana 137	Aquilegia sylvestris 27
pratens. apii fol. 146	Arctium Dioscorid. 65
fativa 115	Argemone 54
sylvestr. major ib.	Aristolochia longa 11
minor 64	Arnica 74
Anisum majus 115	Artemisia vulgar. 150
minus 116	Artifi. 111
	Arum

INDEX

Arum aquatic.	129	Attriplex angustifol. lacin.	117
maculat.	ibid.	angusto oblongo	fol. ibid.
non maculat.	ibid.	foetida	118
vulgare	ibid.	hortensis alba	ib.
Arundo vulgar.	150	rubra	ib.
Asarum	14	sylvestris latifolia	folio acuto ib.
Asclepias	27	latifol.	150
Asparagus	65	sinuat. spica rubr.	ibid.
Aster arvens. cœrul.	72	virid. ib.	folio sinuat. cand.
atticus cœrul.	117	ibid.	polyspermum ib.
austriac.	ibid.	vulgaris	117
autumnal.	151	Avena vulgar. alba	65
canadensis	117	nigra	ibid.
incanus verbasco. fol.	72	B.	
luteus foliis ad flor.	117	Ballote Matthiol	140
rigid.	ibid.	Balsamina lutea	65
major	ibid.	Barba caprin. florib. com.	66
succisæ	ibid.	paët.	oblongis ib.
salicisfol.	65	Jovis	146
hirsut.	117	Barbarea	33
maximus	81	Bardana major	119
montan. lut.	65	minor	ibid.
palustris flore glo.	151	Beccabunga	112
bos	151		Becc.
laciniatus	72		
Asteriscus annuus	117		
Astragalus luteus pro-	65		
cumb.	65		
Attractylis	127		

ALPHABETICVS.

Beccabunga longifol. ib.	138	Brassica alba crispa	28
Been album	28	f. viridis	29
Bellis cœrulea	119	arvensis	ib.
lutea	119	campestris per fol.	4.
sylvestris major	28	capitata alba	29
min. alb.	4	rubra	ib.
purpur.	ib.	cauliflora	ib.
Berberis	66	fimbriata	ib.
Beta alba	ibid.	gongylodes	ib.
rubra	ibid.	fativa	29
Betonica alba	ibid.	sylvestris	66
aquatica	ibid.	vulgar.	29
arvensis ann.	155	Briza monococc.	135
purpurea	66	Brunella cœrulea magno	120
Betula	28	flore	122
Bidens fol. divis.	122	flore purpur.	ibid.
non divis.	ib.	folio lacinar. pur-	122
Bistorta major	119	pur.	alb. 67
minus intorta	ib.	major alb.	ib.
Blattaria lutea	ibid.	rubr.	ib.
Blitum alb. majus	120	vulgaris	ib.
minus	ibid.	Bryonia alba	30
polysperm.	65	aspera	29
rubr. majus	119	lævis	29
minus	120	nigra	29
spinach. facie	28	Bubonium luteum	65
sylvestre spic.	120	Buglossum angustifolium	67
variegat. ib.	108	majus	67
Bonus henricus	28	L 3	Bu.
Branca ursina	108		

INDEX

Buglossum arvense ann.	Calaminth. humilior.	17
89	montan.	122
sylvestre minus 67	puleg. odor.	121
vulgare ibid.	vulgar.	ib.
Bugula alba 31	Calceolus mar.	82
cinerea ib.	Caltha palustris	14
cœrul. ib.	Campanula angustifol.	
sylvestris villosa 31	cœrul.	145
Bulbocastan. maj.	arvens. min.	67
120	esculent.	53
Bupleurum latifol.	hortens.	68
121	minor rotun-	
rotundifol. ib.	difol.	ibid.
vulgatiff. ib.	nemoros. an-	
Buphthalmum tanac. mi-	gustifol. flore magn. ib.	
nor. fol. ibid.	parvo ibid.	
Bursa pastor capsul cord.	persicæ fol. ib.	
4	pratens. flore	
maj. fol. fin. 4	conglomer.	122
non fin. 5	pyramidal.	145
media 5	repens	68
minima 2	urticæ fol.	122
minor 5	vulgar.	ib.
filiquos. 23	Cannabina aquatic. folio	
Butomus 85	divis.	122
Buxus arborese.	folio non divis. ib.	
5	Cannabis fœmin.	151
foliis pict. ib.	mas	ibid.
vulgatiff. ib.	Caprifol. german.	48
C.	Cardamine flore maj.	43
Cacalia fol. glabr.	Car-	
67		
hirsut. ib.		
Calaminth. arvens.		
121		

ALPHABETCVS:

Cardamine flore plen.	Caryophyllus arvens. gla-
ibid.	ber flore minore ibid.
pratens. ib.	umbellatus 13
Cardiaca 140	holosteus ibid.
Carduus avenar.	122
122	montan. alb. 68
benedict.	126
caule crisp.	124
fullon.	128
lanceat. alb.	122
purpur. ib.	
marian.	123
nutans ibid.	
palustris ibid.	
pratens. ibid.	
latifol. ibid.	
spinossiff. ibid.	
stellatus 124	
tomentos. ibid.	
vinear.	122
Carlina acaulos flor. ma-	
gno ibid.	
minor ibid.	
caulescens ibid.	
sylvestr.	127
Carpinus 158	
Carthamus officin.	124
Carvi 127	
Caryophyllata aquat.	14
vulgar. ib.	
Caryophyllus arvens. gla-	
ber flore majore 14	
	L 4
	Carya
	13
	125
	150
	40
	69
	68
	138
	30
	ibid.
	ibid.
	125
	ibid.
	ib.
	125
	ibid.
	70
	69
	63
	69
	70
	63
	63

INDEX

Cepa vulgar. alb.	69	Chamæner. latifol.	138
oblonga	70	villosum flo-	
rotunda	69	re magn.	139
rubra ibid.		parv.	ib.
Cerasus major	15	Chamæpyth. vulgar.	71
pumila	ib.	Chamæschænos	84
sylvestris	ib.	Chamæspartium	78
Ceræfolium fativ.	31	Chelidon, maj.	31
Cervaria nigra	127	minus	5
Chærophyll. sylvestr. ci-		Chenopod. angustif.	117
cutæ folio	43	betæfol.	119
geniculat.	94	foetid.	118
Chamæbalanus	39	fol. sinuat, can-	
Chamæcerasus	15	dicant.	115
dumetor.	30	laciniat. purp. ib.	
Chamædryas frutescens	15	viresc. ib.	
maj. repens	70	latifol.	ib.
minor repens	ib.	pes anserin. ib.	
palustris	ib.	triangul. fol.	28
spuria major	15	Chondrilla sonchifolia	
minor	30	major	85
Chamaæxon vulgar.	124	minor	86
Chamæmel foetid.	70	Chrysanthem. seget.	119
inodor.	ib.	Christophoriana	2
luteum	ib.	Chrysosplenium	9
miniat.	ib.	Cicla	66
vulgare	50	Cichorium angustifol.	71
Chamæner. glabr. latifol.		crispum ibid.	
maj.	139	latifol. ibid.	
min.	ibid.	montan.	82
		Cicho-	

ALPHABETICVS.

Cichorium pumilum	ib.	Cnicus fativus	124
fativum	71	sylvestr. hirsut.	126
sylvestre	ibid.	spinosior	
Cicuta aquatica	155	luteus	127
major vulgar.	125	Colchicum commune	155
minor	ibid.	Consolida major	56
Cicutaria foetid.	71	media	Gene.
palustr. latifol.		vensis coerulea	31
alb.	72	rubra	ibid.
rubr.	ib.	pratensis	ibid.
tenuifol.	ib.	alba	regalis 72
Circæa lutetian.	126	Convolvul. hæderul.	fol.
minima	ib.		127
Cirsium acaulos	124		maj. alb. 73
arvense sonchi-			min. arvenf.
fol.	122		ibid.
montan.	31	Conyza aquatic.	serrat. 72
pratens. aspho-		coerulea. acris	ibid.
del. rad.	123	incano fol.	ibid.
polyceph.	ib.	linar. fol.	88
singul. cap. ib.		major globos.	151
Clematis daphnoid.	15	vulgar.	158
repens	126	media	151
Clematidis latifol.	126	thyrsoides	117
folio		Coriandr. maj.	73
integrò	ibid.	Cornu cervin.	ibid.
Clinopodium ocymi fa-		Cornus hortens.	mas 3
cic	ibid.	sylvestr. mas	ibid.
origani fa-		famin.	32
cic	ibid.	Core-	

INDEX

Corona solis parvo flore	156	Cupressus mas	6
Coronilla	106	Cuscuta major	127
Coronopus repens	141	minor	ibid.
fativus	73	Cyanus seget.	32
Corylus fativ. fructu alb.	2	Cydonia fructu oblong.	rotund. ib.
oblong.	2	vulgaris	ibid.
go albicante	ibid.	Cymbalaria	73
rubente	ibid.	Cynoglossum majus	32
rotundo	3	Cyperoides angustifol.	132
maximo	3	latifol.	36
vulgaris	2	spica rufa ib.	tereti 80
sylvestris ib.	32	lilifolium	37
Cotonea sylvestris	32	nemorens.	16
Cotula foetida	70	nigr. lut. maj.	15
inodora	ibid.	minus ib.	
Cracca major	60	panicula	sparsa
minor	ibid.	major	80
Crataegus	42	minor	ibid.
Crista galli	47	palustre	aculeat.
Cruciata alpina	102		152
hirsuta	158	spica di-	
palustris	77	visa	80
Cucubalus	114	polystachion	ib.
Cuculi flos	40	D.	
Cucumis fativ.	32	Damasonium	74
Cucurbita vulgar.	99	Daucus alsatic.	127
Cuminum	127	annuus	125
Cupressus samina	8	montan. apii fol.	127
		Dau-	

ALPHABETICVS.

Daucus montan. multi-	74	Echium scorpioid. arvens.	74
fid. fol.	74	palustre	ibid.
officinar.	98	majus	ibid.
fativus	ibid.	minus	75
vulgaris	ibid.	Elatine	153
Delphinium seget.	72	Elychrisum angustifol.	109
Dens leonis fol. angust.	33	latifol.	ibid.
latior	16	montan. alb.	36
minim.	33	purpur. ib.	
minor	ibid.	spicat.	131
pilosella dict.	48	Endivia angustifol.	71
villosus	ibid.	crispa	ibid.
min. villosus	143	latifol.	ibid.
Dentaria heptaphyll.	33	fativa	ibid.
Dictamnus albus	128	Equisetum aquat. maj.	75
Digitalis lutea major ib.	81	arvense	6
minima	81	basileense min.	75
purpurea	128	foetidum	129
Dipsacus laciniat. fol. ib.	ibid.	juncum ramof.	75
fativus	ibid.	non ra-	
sylvestr. major ib.	minor ib.	mos.	33
minor ib.		nudum ramof.	75
Doronicum plantag. fol.	73	non ra-	
D.		mos.	33
Dracunculus hortens.	128	palustre brev. set.	75
palustris	129	longior. set. ib.	
pratensis	74	longiss. set. ib.	
Drymopogon	66	Equi-	
E.			
Ebulus	55		

INDEX

Equisetum palustre ma-		Fagopyr. vulg. erect.	130
jus	75	scand.	127
minus	ibid.	Fagus	34
polyperm. ib.		sepium	158
sylvatic.	33	Ferrum equin.	34
Erica	75	Festuca avenac.	79
Eruca palustr. latifol.	33	gramin.	ib.
minor	34	Filago major	131
Eryngium arvens.	129	minor	ibid.
vulgare	76	palustris	132
Erysimum vulgare	129	vulgar.	ibid.
Esula arvens. latifol.	147	Filicula fontan. maj.	76
exigua	ibid.	min.	ib.
officinar.	22	petra	77
palustris	110	saxatil.	76
rotundifol.	ibid.	Filipendula aquat.	96
scabiosa	23	vulgar.	34
folisequa	110	Filix femina	76
Euonymus vulgar.	34	florida	130
Eupatorium canabin.	129	mas	76
odorat.	62	palustr.	130
Euphrasia lutea	121	minor	77
rubra	ib.	querna	ibid.
vulgar.	ib.	ramosa maj.	76
		min.	77
F.		non ramos. dent.	76
Faba crassa	155	min.	77
major	76	rhætica	130
nigra	130	saxatilis	77
rotunda alb.	ibid.	Flammula repens	126
		Flos	

ALPHABETICVS.

Flos trinitat.	160	Genista spartium min. ib.	
Foenicul. aquat. galeric.	93	spinosa maj. ib.	
umbellat. ib.		minor. ib.	
Foenum græcum	76	tinctoria	78
Fragaria steril.	16	vulgaris	35
vulgaris	34	Gentiana Alpina	151
Frangula	25	autumnal.	131
Fraxinella	128	cærul. oris pilos.	156
Fraxinus	158	cruciata	131
Fruent. Indic.	130	Palustris	ibid.
Fumaria bulbos. cava	6	Geranium batrachoid.	78
non cava ib.		cicutæ fol. alb. ib.	
officinar.	130	purpu-	ibid.
G.		reum	ib.
Galeopsis aculeata	130	columbin.	ib.
foetida	136	malvaceum	35
iners	17	robertian.	ib.
lutea	ibid.	Gladiolus minor	ib.
palustris	108	Globular. vulgar.	28
patula seget.	154	Glycyrrhiza sylvestr.	65
Callium alb. latifol.	77	Gnaphalium majusangu-	
minus	ibid.	folium	131
luteum	ib.	vulgare ib.	
montan.	78	medium	ib.
palustre	77	minus repens	ib.
sylvatic.	ib.	montan. alb.	36
Genista angulosa	35	longifol. ib.	
sagittalis	78	rubr.	ib.
scoparia	35	Gna-	
spartium maj.	ib.		

INDEX

Gnaphalium supin.	131	Gramen spica parv.	ibid.
Gramen Alopecurin.	152	sylvar.	ibid.
aquatic. fluitans	79	dactylon angustifol.	152
genicul.	75	latif.	ibid.
lat. spicat.	75	repens	ibid.
junceum	79	echinat.	151
latifol.	75	hirsut. angustif.	80
panicul.	132	Ischamum	152
spicatum ib.		Junceum articul.	80
avenac. mont.	79	spicat. ib.	
cristatum ib.		sylvat. ib.	
busonin.	151	loliaceum	79
caninum	79	miliaceum	132
maj. ib.		montan. caryoph.	16
cyperoid. hirsut.	16	nemorosum	132
latifol.		nodos. avenac.	80
spica rufa	36	palustre aculeat	152
lilifol.	37	echinat. ib.	
min.	80	paniculat. aquatic.	
nemo.	16	latifol.	178
renf.	16	fluitans	79
spica pen-		majus	81
dul.	36	mediu	81
palustre maj.	36	min. ib.	
minus	80	panicum spica	
polystach.	80	multiplici	151
spicis te-		simplici	ibid.
retib. erect.	80	Gramen	

ALPHABETICVS.

Gramen Parnass.	132	Hedera terrestr. min.	ib.
prat. tomentos	37	Hederula aquatic.	88
spicat. spica long.		Hedypnois	33
ibid.		Hedysar. min.	34
longiss. ib.		Helenium vulgare	81
moll. ibid.		Helleboraster maximus	3
tenuiss. ib.		Helleborine latifol.	81
sylvatic.	150	montan. angustifol.	82
pilosum	6	latifol. ib.	
tremul. maj.	81	palustr. angustifol.	
min. ib.		ibid.	
typhoid. asper	153	rotund. flore	ib.
maxim. ib.		Helleborus hippocrat.	7
molle ibid.		Helianthem Indic. tub-	
spic. ruf. ib.		ros.	156
vulgatissim.	81	vulgare	38
Gratiola centaur.	ibid.	Hepatica alba	10
min.	83	cœrulea	ibid.
Grossular. hortens.	non	purpur.	ibid.
spinosa fruct. maj. alb.		Herba paris	9
	37	Herniaria glabra.	100
rubr. ib.		hirsuta	ibid.
nigro ibid.		Hesperis leucosifol.	18
hortens. spinos.	16	petraea	132
vulgatiss.	ibid.	sepiaria	17
H.		Hieracium asper.	82
Hedera arborea	37	chondrill. fol.	133
helix	ibid.	coronop. fol.	ib.
palustris	88	dentis leon. fol.	82
terrestr. maj.	16	Hiera-	

INDEX

Hieracium hirsut. fruti-	Hyperic. minus erect. ib.
cos. angustifol. 133	repens ib.
latifol. ibid.	supin. glabr. ib.
Intybac. 82	vulgare ibid.
maj. erect. ib.	Hypocheris 134
minus dent. leon.	Hyssopifolia 83
fol. oblong. 133	Hyssopus vulgaris 84
sub asper. ibid.	I.
montan. angust. 134	Jacea nigra angustifol. 135
latifol. ib.	latifol. ibid.
majus ib.	squamos. ib.
minus ib.	vulgar. ib.
muror. laciniat. ib.	tricolor. 160
pilos. ib.	Jacobaea palustris 72
non pilos. ib.	suaveolens ib.
Hippocastan. 30	vulgaris altiss. 84
Hippuris arvens. maj. 6	vulgaris ib.
Hirundinaria 27	Ilex aculeata 38
Holosteum petraeum 76	Imperatoria major 84
Hordeum 134	pratens. 115
Hormin. pratens. alb. 38	fativ. ib.
caerule. ib.	Intybus 71
rubr. ib.	Iris palustr. latifol. 38
Hyacinthus stellar. 7	pratens. angustifol.
Hydropiper 142	ibid.
Hyoscyam. vulgar. 83	Isatis fativ. ibid.
Hyoseris angustifol. 133	sylvestr. 39
Hyperic. ascyr. dict. 83	Juncago palustr. 80
bifol. glabr. ibid.	Juncellus inutil. 84
latifol. ibid.	minim. ib.
	Juncus

ALPHABETCVS.

Juncus acut. panicul.	Lactuca fol. oblong. ib.
sparsa 135	maculos. ib.
angustifol. villos. 80	Italica 86
aquat. maxim. 39	montan. maj. 85
capitul. equis ma-	min. ib.
jor. 84	ranar. 100
minor. 85	fativa 86
floridus ibid.	capitat. ib.
lavis panic. spars.	sessilis ibid.
ibid.	sylvestr. 135
spars. ibid.	costa spi-
medius ibid.	ibid.
nemoros fol. arti-	rosa ibid.
culato 8	Lagopus 111
lati-	maxim. 112
fol. 6	Lamium alb. lin. not. 17
Juncus palustris 152	vulgare 18
sylvatic. 85	foliis caulem am-
vulgaris ibid.	bient. 17
Juniperus arborese. ibid.	luteum ibid.
vulgar. ibid.	montan. 39
K.	rubr. longifol. 17
Keiri officin. 18	sylvatic. 136
L.	Lampfana Dodon. 87
Labrum veneris 128	Lappa major 119
Lactuca agnina 23	Lapathum acut. crisp. 87
crispa 86	minim. 136
sabaudic. ib.	planum 87
fol. endiv. ibid.	aquat. max. 136
	min. ib.
	hortense. 87
	M
	Lapa.

INDEX

Lapathum officinar.	87	Leucoj. sylvestre angustifol.	18
sanguineum	ib.	Levisticum	137
sterile	ibid.	Libanotis latifol.	136
Laerpetium	136	Ligustrum	137
Lathyrus maj.	ibid.	Lilac	56
Lathyrus arvens. latifol.		Lilium convall. alb.	40
luteus	39	min. ibid.	
tuberos. ib.		montan. alb.	88
sylvestr.	ibid.	rubr. ib.	
Laureola	7	Limodorum austriac.	44
Lavandula angustifol.	137	Limosella	156
latifol.	ibid.	Linagrostis	37
Lens major	ibid.	Linaria adulterina	40
repens	111	annua hirsut.	159
vulgar.	137	minim.	88
Lentibularia	93	arvens. caerulea	137
Lenticula palustris bifolia	153	capitul. folios.	88
palustris maj. ibid.		hæderul. fol.	73
quadrifol. ib.		montan.	40
trifolca ibid.		pumila	88
vulgaris	ibid.	seget.	153
Lepidium	137	vulgar.	89
Leucanthemum vulgare	3	Lingua cervina	137
Leucoj. bulbos. vulgare		Linum sativ.	89
ibid.		sylvestr. angustifol.	ibid.
trifol.		Lithosperm. arvens.	ib.
lium majus	40	linar. fol.	138
minus	4	maj. erect.	89
luteum vulgare	18	Lotus	

ALPHABETICVS.

Lotus hortens. odora	92	Lythymachia humifus. fol.	26
pentaphyll.	40	lio acuminat.	138
pratens. siliquos	58	lut. cornicul.	138
Lunaria minor	89	major ibid.	
Lupinus sylvestr.	ibid.	spicat purpur	139
Lupulus fæmina	154	siliquos. glabra.	ibid.
mas	153	major	ibid.
Luteola	90	minor	ibid.
Lychnis annua minim.	125	hirsuta major	ibid.
aquat. purp.	41	ibid.	
montan. viscos.	40	minor	ibid.
noctiflora	99	M.	
pratens.	40	Majorana tenuifol.	154
seget. maj.	90	vulgaris	ib.
rubra	ibid.	Mala cotonea major.	32
sylvestr. alb. hirs.		minor.	ib.
ibid.		Malus sylvestr.	41
angusti-		Malva altissima	91
ibid.		rotundif. ib.	
fol.		palustris	139
been. dict.	138	sylvestr. maj.	90
latifol.	90	min.	91
purpur.	104	vulgar. maj.	90
viscosa rubr.		min.	ib.
	41	Martagon sylvatic.	88
Lycopodium	18	Marrubium alb.	133
Lycopus	139	cardiac. dict.	140
Lythymachia chama-		nigrum	ibid.
æer.	138	palustre	139
cærulea	ibid.	Matricaria vulgar.	41
spicat.	148	M 2	Matr-

INDEX

Matrisylva	27	Mespilus sylvestr.	non
Mays.	130	spinof.	ibid.
Medica echinat.	111	Meum vulgare	p. ult.
Melampyr. cœrul.	91	Millefol. aquatic.	93
flore var.	ibid.	cornut.	ibid.
lut. angustifol.	92	flosculos	ibid.
latifol.	ibid.	lenticulat.	ibid.
purpur.	91	pennat.	ibid.
Melanium montan.	113	palustre	ib.
Melilotus alb.	92	vulgare alb.	42
cœrul.	ibid.	purpur. ib.	
vulgar.	ibid.	Milium alb.	154
Melissa humil. latifol.	39	luteum	ibid.
Melo reticulat.	92	folis	89
rotund.	ibid.	Mollugo mont. latif.	77
saccharin	ibid.	Morus fruct. alb.	18
vulgar.	ibid.	nigr.	ib.
Mentha aquatic. maj.	140	Morsus ranæ	95
palustr. longif. ib.		Moschatellin.	9
rotundif. ib.		Muscus capillac. maj.	61
sylvestr. longif. 92		palustr.	88
rotundif. ib.		squamos.	18
Menthastr. fol. rugos	92	terrestr.	clavat.
spicat.	93		140
Menyanthes	58	Myagrum foetid.	94
Mercurial. fæmin.	41	monosperm.	ibid.
mas p. ult.		fativ.	ibid.
montan. fæmin.	18	filiq. long.	141
mas ib.		sylvestre	42
Mespilus sylvestr.	42	Myosotis arvens. hirs.	13
spinof. ib.		Myr-	

ALPHABETICVS.

Myrrhis ann. nodos.	94	Nymphaea alb. min.	99
palustr. latifol.		major alb. ib.	
semen. nigr.	42	lutea ib.	
sylvestr.	94	O.	
Myrtillus	60	Ocimastrum	41
N.		Ocimoides alb.	ibid.
Napellus	150	purpur.	ib.
Napus sativa	19	Oenanthe aquatic.	96
sylvestr.	ibid.	Olsnitium	116
Narcisso leucoj. maj.	4	Onagra	138
min. ib.		Onobrychis	141
vulgare	3	Ophioglossum	95
Nasturtium aquat.	43	Ophris bifolia	44
hortens. crisp.	94	Opulus	55
petraeum	19	Orchis abortiv. fusca	43
pratense	25	violac.	44
Nasturt. filiculof. ann.	95	alba bifol.	ibid.
filiquof.	43	bifolia alter.	ib.
pratens. ib.		herbac.	ib.
sylvestr. osyr. fol.	95	latissim.	ib.
tenuifol.	43	cimic. referens.	44
verrucos.	141	delphin.	46
vulgare	ibid.	fucum refer.	44
Nepeta	121	hircina maj.	ibid.
Nicotiana maj.	141	min.	ib.
Nidus avis	43	latifol. maj.	49
Nigella arvens.	141	militar. maj.	ibid.
Noli me tangere	65	min.	ibid.
Numularia	95	montan.	ib.
Nux juglans	43	minor maculat.	ib.
		Orchis	

INDEX

Orchis minor repens	45.	Orobanche ccerul.	44
morio fæmin.	46	ramos.	142
mas	45	dentata	96
musc. refer. lut.		Orobis sylvat. vern.	19
maj.	96	foliis oblong.	97
min.	ibid.	purpur.	19
palmata maxima	46	Oryza	134
montan. ib.		Osmunda	89
palustr.	47	palustr.	130
angusti-		Oxalis romana	61
fol.	ibid.	Oxyacantha	42
latifol.	46	Oxycoccus	61
rubr.	47	Oxys	23
pratens. angustif.	46	P.	
latifol. ibid.		Palma Christ. macul.	46
maculat. ib.		non macul. ib.	
non macul. ib.		palustr.	47
spiralis	157	Panicum vulgare	152
suaveolens	45	Papas american.	146
trifol. maj.	44	Papaver errat. capit. long.	
Oreoselin.	127	oblong.	97
Origan. alb.	141	hispid.	ibid.
vulgare	ibid.	majus	ib.
Ornithogal. ccerul.	7	minus	ib.
luteum.	7	Parietaria	97
minus ib.		Paris herba	9
ramos. ib.		Pastinaca sativa latifol.	98
Ornithopodium maj.	142	tenuifol. ib.	
min. ib.		sylvestr. latifol. ib.	
Orobanche caryophyll.		Passi-	
olens	97		

ALPHABETICVS.

Pastinaca sylvestr. tenui-		Peucedan. vulgare	99
fol.	98	Phalangium ramos.	48
Pedicularis lutea	47	minus ramos.	ib.
palustris	ibid.	Phaseolus vulgar.	99
pratens.	ib.	Phellandrium	72
purpur.	ib.	Phyllitis	137
serotin. lut.	ib.	Pilosella major repens an-	
purpur. ib.		gustifol.	143
Pentaphylloid. alat. ibid.		hirsut.	48
palustre	101	officinar.	ibid.
Pentaphyllum viride	155	Pimpinella maj. alb.	ib.
Pepo	98	rubr. ib.	
oblongus	ib.	sanguisorb. maj.	154
vulgaris	ibid.	min. ib.	
Peplus	110	saxifrag. maj. alb.	49
Perchepter	19	rubr. ib.	
Perfoliat. arvens.	121	min. ib.	
Periclymen. perfol.	48	Pinus sylvestr.	49
rectum	30	Pistacia sylvestr.	ib.
Persica vulgaris	19	ib.	
Petficaria angustifol.	142	Pisum arvense	ibid.
minor	ib.	hortens.	ibid.
mitis maculos.	ib.	vulgar.	ibid.
non macul. ib.		Plantago angustif. mas	49
salicis fol.	ib.	latifol. glabr.	50
urens	ib.	incan. ib.	
Pervinca	15	aquat. angustif.	143
Petalitis	10	latifol. ib.	
Petroselin. crisp.	116	Pneumonanthe	131
vulgare	ib.	Peeonia fæmin.	50
		mas	ib.

INDEX

Polium lavendul. fol. 143	Porrum sectiv. 39
montan. repens 134	sylvatic. 63
Polygala vulg. maj. alb. 99	sylvestre 144
caerul. ib.	Potamogeton angustif. ib.
purpur. ib.	crispum 100
alba ibid.	flosculos 93
caerul. ibid.	fol. lat. 100
purpur. ibid.	graminifol. 144
vulgar. ibid.	pellucid. fol. 100
Polygonat. latifol. 50	pennat. 93
maj. ib.	ramos. 144
Polygonum angustifol. 99	rotundifol. 100
brevifol. 143	salicis fol.
latifol. ibid.	undulat. 144
graminifol. 100	Primula ver. pratens. 8
minus glabr. ib.	sylvat. ib.
hirsut. ibid.	Prunus damascen. 50
polycarp. 99	sativ. ibid.
oblong. angustifol. 144	sylvestr. 19
vulgare 143	Pulmonar. gallic. femin. 134
Polypodium vulgare. ibid.	mas ibid.
Populago 14	tenuif. ib.
Populus alba maj. 8	Itolor. 9
min. ib.	maculor. ib.
nigra ibid.	non maculor. 10
tremula ibid.	Pulsatilla flore alb. 20
Portulaca aquatic. 115	rubr. 19
sativ. latifol. 144	fol. crass. ibid.
sylvest. angustif. ib.	Pyrola fol. mucron. 100
	Pyro-

ALPHABETICVS.

Pyrola rotundifol. 100	Ranuncul. nemoros. ro-
Pyrus sativa 51	tundifol. 20
sylvestr. ibid.	palustris 103
fruct. maj. ib.	plantag. fol. 143
Pyxidaria 157	sagittat. 103
Quercus mas 51	angustif. ib.
vulgar. ibid.	latifol. ib.
Quinquefol. erect. lut. 101	maxim. ib.
maj. repens 20	min. ib.
minus repens ib.	phragmit. alb. 20
palustr. rubr. 101	purpur. ib.
sylvatic. ibid.	pratens. erect. 2-
R.	cris 21
Ranuncul. aquat. capillac. 51	dulc. 51
circinat. ib.	minor 52
rotundif. ib.	repens ib.
arvens. echin.	tuberos. ib.
anthemid.	tridentat. vern.
fol. 70	alb. 10
chamamel. 71	caerul. ib.
foeniculac. 7	purpur. ib.
lanceolat. ferrat. 111	vernus rotundif. 5
montan. hirsut. 51	Raphanistrum alb. 52
nemoros. alb. 20	luteum 53
baccifer. 9	Raphanus aquat. alter. 52
luteus 21	lut. ib.
purpur. ib.	major oblong. ib.
	min. oblong. ib.
	niger oblong. 144
	rotund. ib.

INDEX

Rapistrum aquat.	52	Rubeola arvens. repens	ibid.
arvens. alb.	ib.	montan.	31
lut.	ibid.	spontan.	102
auricul.	94	Rubia angustifol.	54
Rapum orbic. maj.	101	latifol. lav.	102
min.	ib.	pratens.	ibid.
fativ. oblong.	ib.	sylvestr.	103
rotund.	102	tinctor.	ibid.
sylvestre	21	Rubus Idæus spinos.	54
vulgare	102	minor	ibid.
Rapuncul. alopecur.	53	repens	ibid.
cornicul.	ib.	vulgar.	ibid.
esculent.	ib.	Ruta canin.	103
longifol.	ib.	hortens.	54
nemoros. magn.	68	murar.	61
flor.	ib.	pratens.	147. 155
flor.	ib.	S.	
perficifol.	ib.	Sagitta aquat. maj.	103
pyramidal.	144	min.	ib.
spicatus	53	Salicaria hyssopi fol.	84
Refeda vulgar.	102	Salix alb. vulg.	158
Rhamnus cathart.	53	aquatic.	ibid.
Ribes nigrum	37	aurita	ibid.
officinar.	ib.	caprea	ib.
Rorella fol. oblong.	145	folio acuto	159
rotund.	ib.	fragilis	159
Rosa sylvestr.	53	humilis	158
Rosmarin. hortens.	102	latifolia repens	159
spontan.	ib.	rotunda	21
		Salix	

ALPHABETICVS.

Salix lutea	159	Saxifraga verna ann.	22
nigra	159	Scabiosa glabr.	105
viminea	ibid.	globosa	104
vitellina	ibid.	hirsut.	105
vulgarissima	ib.	maj. squamos.	135
Salvia major	103	pratens. hirsut.	54
minor	104	tenuifol.	104
variegat. fol.	103	Scandix	55
Sambuc. aquat. flor. simpl.	54	Scirpus capit. equis. maj.	84
pleno ib.	54	min.	85
humilis	55	medius	ibid.
montan.	21	omnium minim.	ib.
racemosa	ib.	palustr. altiss.	39
vulgar. fruct. alb.	104	sylvatic.	85
nigr. ib.	ibid.	Sclarea pratens. alb.	38
ibid.	ibid.	cæcul. ib.	ib.
Samolus	154	rubr.	ib.
Sanguisorba maj.	48	Scordium	70
minor	48	salvisfol.	145
Sanguis dracon.	87	Scorodopras.	63
Sanicula officin.	55	Scorzonera angustif. ibid.	ib.
Saponaria maj.	104	humil. angustif. ib.	ib.
violac.	ib.	latifol.	105
Satureja	55	laciniat.	ib.
Satyrion	45	Scrophularia aquat. ma-	
Saxifraga alb.	21	jor	105
aurea	9	minor	106
graminifol.	154	nodos.	ibid.
palustris	115	Secale hybern. maj.	ib.
		Seca-	

INDEX

Secale hybern. min.	106	Sifymbr. aquat. raphani-	
vernum	ib.	fol.	ibid.
Securidaca dumet.	106	erucifol.	33
Sedum maj. vulg.	146	palustre repens	34
minim.	106	Sium palustre alb.	154
minus lut. acuti-		latifol.	116
fol.	107	oblong.	
teretif. alb.	106	fol.	65
palustre rubr.	107	umbellat. re-	
parv. lut. acr. ib.		pens	157
mont.	ib.	Smilax hortens.	99
tridactylit	22	unifol.	40
Semperviv. minus vermi-		Solan. officin.	146
cul.	106	quadrifol.	9
Senecio vulgar.	55	scandens.	56
Serpill. vulgar. alb.	107	tuberos.	146
maj. purp.	ib.	vesicar.	107
min. rep.	ibid.	moschum	
Serratula tinctor.	145	olens	ibid.
Seseli pratens.	146	vulgare	146
Siderit. arvens. angustifol.	154	acin. lut. ib.	
latifol.	155	Sonchus asper. lacin. spi-	
vulgar.	55	nos	108
Sigill. Salomon.	50	non lacin. ib.	
Sinapi Eruc. fol.	22	lavis lacin. latif.	146
rapifol.	55	minor	147
fativ.	ib.	mural.	ibid.
Sifymbr. annuum	43	sulphur.	ibid.
aquat. lacin.	52	sylvatic.	ibid.
		Sophia Chirurgor.	43
		Sorbus	

ALPHABETICVS.

Sorbus aucupar.	56	Thlaspi arvense Gliqu. lat.	57
sylvestr.	ibid.	maj. vaccariae-	
tormental.	42	fol.	56
Spargan. non ramos.	108	drabæfol.	57
ramos.	ib.	in can. maj.	ib.
minim.	ib.	minus	ib.
Speculum Vener.	67	perfoliat. maj.	22
Spergula	26	min. ibid.	
Sphondyl. vulgare	108	vulgatus	56
Spina Cervin.	53	Thymelæa laurifol.	7
Spinacia sterilis	87	linar. fol.	138
vulgar.	ibid.	Thymus vulgar. latifol.	109
		tenuifol.	ib.
		Thysselinum	116
Stachys Fuch.	155	Tilia famina	57
palustris	108	mas	ibid.
Staphylo dendron	49	Tithymal. arvens. latifol.	147
Stellaria aquatica	pag. ult.	charac. amygdal. ib.	
Stizchas citrina angustifol.	109	angustif.	109
latifol.	ib.	latifol.	147
Succisa	105	rubens	109
Symphyt. maj. vulgar.	56	cupressinus	110
maculos. latif.	9	cyparissias	22
non maculos.	10	punctat.	23
Syringua alb.	56	rubens	110
purpur.	ibid.	germanic.	109
T.		helioscop.	ib.
Tamarix	109	latifol.	ibid.
Tamariscus	ib.	minimus	147
Tanacetum vulgare	155	myrsinit.	angusti-
Taraxac. officin.	16	ibid.	ibid.
Taxus	22	latif. ib.	
Telephium vulgare	155	palustris	110
Testiculus hircin.	44	pinifol.	ibid.
Teucrium	15	rotundifol.	ibid.
officia.	30	platyphyll.	147
Thalictrum maj.	109	solis equus	110
flav.	147	sylvatic.	ib.
409 striat.	155	Tithy-	

INDEX

Tithymalus verrucos.	147	Turritis vulgar.	23
Tormentilla repens	155	Tussilago maj.	10
sylvestr.	101	vulgar.	ibid.
Tragopogon cœruleum	11	Typha palustr. maj.	58
luteum	105	min.	59
Tragofelin, alb. maj.	48		
min.	49	Vaccaria	90
rubr.	ib.	Valeriana palustris maj.	23
Tribuloides vulgar.	110	min.	ib.
Tribulus aquat.	ibid.	Valerianella arvensis	24
Trichoman. aquat.	62	præcox	23
Trifol. acetos	23	ferratifol.	24
arvense ecchinat.	111	serotina	ib.
humile spic. ib.		Veratrum	132
cornut.	ibid.	Verbascum alb.	148
falcat.	ibid.	fæmin.	ibid.
fibrin.	98	lut. magn.	ib.
hepatic. alb.	10	mas	156
cœrul.	ibid.	Verbena	148
purpur.	ibid.	Veronica angustif. spic.	148
lupulin. maj.	57	spicata min.	ibid.
min.	ibid.	longifol.	ib.
montan.	58	Veronic. aquat. angustif.	112
spicat. ib.		latif.	148
pratens. alb.	58	maj. fol. long.	ibid.
inodor. ib.		subro-	ibid.
maculat. ib.		tund.	ibid.
purpur. ib.		min.	ibid.
siliquos. ib.		min. fol. oblong.	113
Triorchis alba	157	chamædryfol.	12
Triticum aristatum	112	cymbalar. fol.	ib.
æstivum	ibid.	floscul. caulic. ad-	
hybernum	ibid.	hærent.	13
trimestre	ibid.	pedicul. in-	
typhin.	ibid.	sident.	12
Tunica	68	hæderul. fol.	ib.
Turritis	66	mas f. officinar.	59
leucoy fol.	141	Veronic.	

ALPHABETICVS.


Veronic. aquac. min. rotun-	30	Viola mont. cœrul.	113
difol.	30	lutea	ib.
Veronica pratens. serpillif.	59	tricolor	ibid.
spicata maj.	ib.	tricolor	160
min.	ib.	Virga aurea angustifol. ser-	
rotund. ib.		rat.	114
teucrii fac.	ibid.	min. ferrat. ib.	
verna fol. trifid.	ib.	latif. ferrat. ib.	
Viburnum	59	pastor. maj.	128
Vicia annua maj.	113	min. ib.	
min.	60	vulgar.	141
lutea	113	sanguin.	32
maxima dumet.	60	Vitis alb.	29
multiflora	ib.	Idæa	60
fativa f. vulgar.	113	palustr.	ibid.
segetum	60	rotundifol.	ibid.
sepium	113	Vulneraria rustica	64
sylvestr. spicat.	60	Ulmaria	66
Victorial. longa	62	Ulmus	11
Vinca per vinca	15	Urtica aculeat. alb.	130
Vincetoxicum	28	purpur.	ib.
Viola aquatic.	93	iners	17
arvens. bicol.	24	urens caule rubr.	149
longifol.	11	maxima	ibid.
Viola lunar.	113	minor	ibid.
mart. alb.	11	X.	
purpur.	ib.	Xanthium	110
sylvestr.	ib.	Z.	
mont. alb.	113	Zea	136

Omissis addend.

Mentha aquatica *Pulegium* *Mas dist.* *T. floribus*
monopetalis verticill. subpurpur. foliis origani æmul. gra-
 veolent. *Poleg.* in seuchten Oren. [*Puleg.*] 1c. 3. Tab. 730.
 august. perenn.

Eadem flore albo.

Mentha foliis Anethi *T. s. vulgare*, flore rosaceo um-
 bellato



bellato albo, Bärwurz / Icon. 1. Tab. p. 139. perenn. auf
Wiesen hoher Berge. [Meum] Jun.

Mercurialis testiculata mas. T. Bingelkraut / aller Dr
ten. Maj. Ic. Tab. I. p. 42.

Ranunculus arvensis echinat. T. vel arborum flore
lut. rosaceo, foliis dissectis. Ackerhahnen-Fuß. Ic. 13. & 14.
Tab. p. 110. Mas ann. Jun.

Stellaria aquatica s. Alfine aquis innatans. foliis lon-
giusculis. Ic. J. B. 3. 777. in stillstehenden Wasser. Bächlein.
perenn.

Errata pro lubitu corrigenda.

Lin. 1. pag. 8. leg. Ornithogal. lin. 22. p. 10. leg. crassa
lin. 10. p. 12. leg. pratensis lin. 13. p. 13. leg. glabra lin. 22.
p. 18. leg. squamos. lin. 3. p. 20. leg. coquelourde lin. 11. p. 24.
leg. mucronat. lin. 23. p. 30. leg. chamadrys lin. 26. p. 34. leg.
Icon. lin. 12. p. 44. leg. orchis lin. 23. p. 48. leg. Oreille lin.
18. p. 53. leg. Rapuncul. lin. ultim. p. 53. adde Ic. Tab. 10.
pag. 1495. lin. 21. p. 60. in fine add. omnium minima est.
lin. 23. p. 60. deleatur omnium minima est. lin. 23. p. 78.
leg. geranium lin. 7. p. 109. leg. Immortelle lin. ultim. p.
110. leg. rosaceo albicans. lin. 19. p. 124. leg. aculeos lin.
ultim. p. 126. add. Ic. Tab. 1066. lin. 3. p. 127. post. lus.
add. Atractylis dist.



Stavodruk XVIII 15.

o fresci medicino-
farmakologopisnej

Stuttgart 1727

- Sol
Mg. 18c

